

Le système lymphatique

PLAN :

I-INTRODUCTION :

II-COURANTS LYMPHATIQUES SUPERFICIELS :

III-LYMPHONOEUDS SUPERFICIELS SUPERFICIELS :

I-INTRODUCTION :

Il existe deux systèmes : superficiel et profond :

-Le système profond : sous-aponévrotique, il draine la lymphe des os, articulations et muscles ;

- Le système superficiel : sus-aponévrotique, draine la lymphe des plans de couverture sus-aponévrotiques ; il y a très peu d'anastomoses entre les territoires superficiel et profonds.

II-COURANTS LYMPHATIQUES SUPERFICIELS :

- Au niveau des doigts et de la main : riche réseau lymphatique cutané ;

- Au niveau de l'avant-bras :- Courant radial ventral et dorsal ;
-Courant ulnaire ventral et dorsal

-Au niveau du bras : -Courant lymphatique bicipital médial
-Courant lymphatique basilique médial ;
-Courant lymphatique céphalique latéral

III-LYMPHONOEUDS SUPERFICIELS :

-sus-épicondyliens médiaux;

- Lymphonoeuds du sillon delto-pectoral;

- Lymphonoeuds superficiels dorsaux de l'épaule.

IV-LYMPHONOEUDS PROFONDS : Situés au voisinage des vaisseaux du membre thoracique.

- Lymphonoeuds de l'avant-bras :

- Nœuds radiaux ;

- ulnaires ;

- interosseux.

- Lymphonoeuds du pli du coude :

-Nœud ulnaire proximal ;

-Nœud du sillon bicipital latéral .


LYMPHONOEUDS DU BRAS :

- Nœuds huméraux .

- LE LYMPHOCENTRE AXILLAIRE (FOSSE AXILLAIRE) :

-Groupe nodal axillaire central : Il draine les lymphatiques brachiaux ;

- Groupe pectoral** : Il draine la paroi latérale du thorax , les deux quadrants latéraux du sein et la portion sus-ombilicale de la paroi abdominale
- **Groupe sub-scapulaire** : Il draine la lymphe de la paroi dorsale du thorax , de l'épaule et de la nuque .
- Groupe sub-clavier apical** Il draine la lymphe des autres groupes nodaux et les deux quadrants craniaux du sein.



NŒUDS PROFONDS :

