

Non : Prénom :

Cochez la ou les réponses justes

1) Les indications de l'extraction dentaire :

- sont d'ordre local uniquement
- sont d'ordre local et général
- Peuvent être prothétique ou orthodontique
- l'hygiène du patient et sa motivation peuvent orienter vers une attitude conservatrice ou radicale

2) Les règles d'asepsie concernent :

- le praticien uniquement
- le patient uniquement
- le praticien et le patient
- lieu de travail et les instruments

3) Les règles d'asepsie sont respectées :

- avant l'extraction
- pendant l'ex+ action
- après l'extraction
- quand le patient le demande
- Obligatoirement

4) Les instruments nécessaires pour effectuer une extraction dentaire :

- Un davier
- une curette parodontale
- un syndesmotome
- un élévateur
- une râpe à os

5) Le protocole opératoire d'une extraction dentaire :

- anesthésie_ syndesmotomie_ luxation_ extraction
- Asepsie_ anesthésie_ syndesmotomie_ luxation_ extraction
- Asepsie_ anesthésie_ extraction proprement dite
- Anesthésie_ asepsie_ syndesmotmie_ luxation_ extraction

6) Quand l'extraction dentaire est faite :

- le patient est libéré immédiatement
- l'alvéole doit être révisé
- le patient n'est pas libéré avant d'obtenir une bonne hémostase
- vérifier l'intégrité de la dent n'est pas nécessaire

7) Pour prévenir la douleur postopératoire, on prescrit :

- un antalgique
- un anti-inflammatoire non stéroïdien
- un anti-inflammatoire stéroïdien
- un antibiotique

8) les conseils post opératoire :

- abstention de fumer
- sucer le caillot sanguin
- proscrire les bains de bouche
- maintenir la compression (3-10min)

9) La stérilisation des instruments doit se faire :

- A la chaleur sèche
- A la chaleur humide avec une température de 134° , maintenu au moins 18 minutes.
- D'abord au poupinel puis à l'autoclave
- Toutes les réponses sont fausses

10) La pré désinfection :

- Est encore appelée décontamination
- Permet d'obtenir des instruments en état de stérilisation
- a pour objectif de faciliter le nettoyage en évitant le séchage des matières organiques.
- La durée maximale de trempage est de 15 minutes

11) L'antisepsie

- Est l'action de détruire la croissance des micro-organismes existants sur des surfaces inertes contaminées
- est assurée par l'usage des solutions détergentes.
- l'activité recherchée est bactéricide et fongicide.
- toutes les réponses sont justes

12) Quels sont les patients chez qui nous devons respecter les mesures de précaution standards :

- Les hémophiles
- Les usagers de drogue par voie nasale
- Les cardiopathes
- Les hémodialysés
- Les hypothyroïdiens

13) La vaccination contre l'hépatite B :

- Est obligatoire chez tous les praticiens et personnel soignant
- Est proscrite chez le praticien qui a un membre de sa famille porteur de sclérose en plaque ou d'handicap mental
- La vaccination contre VHC et VIH est obligatoire aussi.

14) Le kyste péri-coronaire d'éruption :

- Est plus fréquent sur les canines de lait en pré émergence
- Le diagnostic différentiel se pose avec l'angiome
- Résulte de l'accumulation de sang qui dilate l'espace autour de la couronne dentaire.
- L'attitude thérapeutique est l'énucléation de toute la paroi kystique

15) Parmi les causes de retard d'éruption d'une incisive centrale nous citerons :

- Un kyste radiculo-dentaire sur l'incisive lactéale sous jacente mortifiée
- Un kyste dentigère développé sur l'incisive lactéale sous jacente
- Une gencive fine, peu fibreuse
- La présence d'un germe surnuméraire

16) Les anesthésiques locaux :

- Bloquent de façon irréversible le flux nerveux
- Bloquent de façon réversible le flux nerveux
- Préviennent la dépolarisation de la membrane nerveuse
- Inhibent le Na^+ entrant

17) Les anesthésiques locaux à fonction amide possèdent :

- Extrémité aromatique
- Extrémité aminée
- Une chaîne intermédiaire porteuse d'une liaison ester
- Toutes les réponses sont justes

18) les vasoconstricteurs sont employés en stomatologie pour :

- leur propriétés d'augmenter la durée d'action de l'anesthésique

- lutter contre l'effet vasoconstricteur de l'anesthésique
- diminuer le saignement per-opératoire
- accélérer la résorption du produit anesthésique

19) les réactions d'hypersensibilité sont dues le plus souvent :

- au Parabène
- aux sulfites
- aux conservateurs
- toutes les réponses sont fausses

20) l'emploi du vasoconstricteur est contre-indiqué chez :

- les patients ayant subi une radiothérapie cervico-faciale
- les patients sous biphosphonates
- les diabétiques type I équilibrés
- les cardiopathes ayant fait un infarctus ancien du myocarde

21) l'anesthésie tronculaire du nerf alvéolaire inférieur :

- est vivement indiquée chez les patients présentant un désordre hématologique
- est contre indiquée chez les patients sous Sintrom®
- se pratique au niveau de l'épine de Spix
- nécessite une aiguille longue et fine

22) l'anesthésie para-apicale :

- est indiquée pour toutes les dents maxillaires
- se pratique en 2 temps vestibulaire et palatin
- se caractérise par un temps de prise rapide au niveau mandibulaire
- toutes les réponses sont justes

23) l'articaine :

- est contre-indiquée chez la femme enceinte
- présente un poids moléculaire très élevée inhibant sa diffusion à travers la barrière placentaire
- présente un effet foeto-toxique
- elle est connue par sa toxicité cardiaque

24) Les complications per opératoires peuvent être :

- Muqueuses, par dilacération et lésion de la muqueuse buccale
- Dentaires, par fracture d'une dent ou d'un apex
- Musculaires, par traumatisme
- Toutes les réponses sont justes