

L'avortement provoqué

❖ INTRODUCTION -DEFINITION

L'avortement provoqué est l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire il y a l'expulsion prématurée du produit de conception, volontairement provoquée, sans indication médicale.

Il peut être assuré par des personnes ayant des connaissances médicales, ou par des personnes non qualifiées, dans des conditions le plus souvent inappropriées pour assurer l'asepsie et la réanimation de la mère en cas d'imprévu

Moyens abortifs

- utilisation produits chimiques ;
- percement de l'œuf par aiguilles ou objets contondants et perçants ;
- utilisation de absorption de plantes;
- prise de grosses quantités de médicaments (nivaquine, aspirine, antibiotiques, etc.);
- coups dans le ventre, chutes et exercices physiques violents.
- Dilatation du col
- Décollement instrumental des membranes et de l'œuf
- Injection intra-utérine de Solutions :l'eau, l'eau de savon, eau de javel , l'eau oxygénée

❖ **Diagnostic de l'avortement provoqué:**

- L'avortement provoqué est le plus souvent le résultat manœuvres directes sur l'utérus, il peut donc exister violences au niveau des organes génitaux, des blessures ou du fœtus de des lésions de de l'œuf
- L'examen externe apprécie :
 - L'existence de signes de grossesse
 - La mesure de la hauteur utérine
 - L'état des organes génitaux externe
 - La présence de lésions de violence.
 - l'état du col,
 - l'écoulement des lochies

❖ **Complications de l'avortement provoqué**

Complications précoces:

- Lésions cervicales :La déchirure du col utérin est une des complications les plus fréquentes. Certaines déchirures particulièrement délabrantes ou hémorragiques nécessitent une suture chirurgicale.
- Lésions au niveau du vagin avec des plaies de cul de sac résultant de la manipulation des instruments et aussi de l'introduction de substances caustiques (exp. Permanganate de Potassium)
- Perforations utérines: avec les risques de blessure d'organes adjacents (intestin, vessie principalement) et l'hémorragie par plaie vasculaire . Parfois on retrouve le corps étranger lui-même (canule, crochet, aiguille à tricoter..), Les substances caustiques provoquent aussi des perforations et s'accompagnent le plus souvent soit d'infections suraiguës soit d'hémorragie interne

- Hémorragies: Les facteurs de risque de la survenue d'une hémorragie sont l'âge gestationnel supérieur à 10 semaines d'aménorrhée (SA) l'âge maternel avancé, la multiparité, et les fibromes utérins. La survenue d'un saignement excessif peut témoigner d'un avortement incomplet, d'une grossesse plus avancée que l'âge gestationnel attendu, une atonie utérine, ou une blessure de l'utérus (déchirure cervicale, perforation utérine)
- Rétentions ovulaires: c'est la conséquence d'une aspiration incomplète de l'utérus
- Infections: (cervicite ,salpingite ,endométrite); leucorrhées malodorantes ou douleurs pelviennes, saignement anormal, température supérieure à 38 °C, à l'examen, douleur à la mobilisation utérine, masse annexielle palpable.
- Synéchies utérines
- Embolies amniotiques
- Décès maternel

Complications à moyen et long terme;

- Fausses couches spontanées
- Anomalies de placentation
- Allo-immunisation foëto-maternelle
- Accouchement prématuré

❖ **Conclusion**

La prise en charge des avortements provoqués passe d'abord par la prévention primaire et secondaire car leur complications sont fréquentes et grave et pouvant même être mortelles.