

# LES POSITIONS TRANSVERSALES ET OBLIQUES (PRESENTATION DE L'EPAULE)

---

Cours présenté par DR.ABES

## A. DEFINITION :

On parle de présentation de l'épaule lorsque l'aire du détroit supérieure n'est occupée ni par la tête ni par le siège foetal.

Ces positions transversales ou obliques sont toujours dystociques, l'accouchement spontané est impossible.

## B. FREQUENCE :

Les positions transversales ou obliques sont rares, elles constituent environ 0,27% des accouchements.

## C. VARIETES DE POSITION :

Le dos du foetus est en avant ou en arrière, les variétés dorso- antérieures sont de beaucoup les plus fréquentes.

Le repère de la présentation étant l'acromion d'où quatre variétés :

- Acromio-iliaque droite antérieur ;
- Acromio-iliaque gauche antérieur ;
- Acromio-iliaque droite postérieur ;
- Acromio-iliaque gauche postérieur.

## D. ETIOLOGIE :

- ✓ La multiparité ;
- ✓ La gemellité ;
- ✓ Hydramnios ;
- ✓ Tumeurs ou placenta praevia ;
- ✓ Briéveté du cordon ;
- ✓ Malformations utérines.

## **E. ETUDE CLINIQUE :**

### **1. INSPECTION :**

L'utérus est développé dans le sens transversale ou oblique,

### **2. PALPATION :**

Les poles foetaux sont perçus ,d'un coté la tete dans la fosse iliaque ou le flanc, de l'autre coté, le siège dans l'hypochondre ou le flanc.

Entre les deux poles, on perçoit un plan résistant du dos plus marqué dans les variété antérieures.

### **3. AUSCULTATION :**

Le foyer des bruits cardiaques foetaux est perçu au- dessous de l'ombilic du coté du pole céphalique.

### **4. LE TOUCHER VAGINAL :**

- PENDANT LA GROSSESSE : l'excavation est vide.
- PENDANT LE TRAVAIL :
  - si les membranes ne sont pas rompues : la poche des eaux est volumineuses, saillante, la recherche des repères foetaux manque de précision.
  - après rupture des membranes, on perçoit l'acromion (le moignon de l'épaule) ; le creux axillaire, au toucher plus profond : le grill costal, l'omoplate.
  - dans certains cas, un membre supérieur du foetus pend dans l'excavation, la main, le poignet tombent dans le vagin et peuvent apparaitre à la vulve, cyanosé, oedématié. Lorsque la paume regarde en haut, le pouce tourné vers la cuisse de la mère de meme nom(droite ou gauche) que l'épaule qui se présente.
  - le TV : doit préciser la variété de position en cherchant la position de la tete ,du siège et du dos. Lorsque la main est hors de la vulve, le signe du pouce confirme le diagnostic.

## **F. EXAMENS PARACLINIQUES :**

L'échographie ainsi que la radiographie confirme le diagnostic.

## **G. MARCHE DE L'ACCOUCHEMENT :**

- L'accouchement du foetus en conduplicato corpore, c-à-d,plié en deux, se rencontre quelque fois lorsque le foetus de petite taille est mort et macéré.

### **a. LES PHENOMENES MECANIQUES :**

- l'amoindrissement par tassement : la tête s'applique contre le tronc et s'y incruste, l'épaule est ramené ainsi au centre du bassin.

-L'engagement de l'épaule qui se met en rapport avec l'une des extrémités du diamètre transverse et descend le long de la paroi latérale du bassin attirant le tronc, mais le cou descend en même temps, attirant la tête vers le détroit supérieur ; l'engagement simultané de la tête et du tronc étant impossible, la progression s'arrête alors : l'enclavement est réalisé.

**b. LES PHENOMENES PLASTIQUES :** la bosse séro-sanguine siège sur l'épaule, parfois sur le cou et le dos. Lorsque le bras pend dans le vagin (épaule négligée), il devient énorme, violacé, la peau desquamée.

### **c. LES PHENOMENES PHYSIOLOGIQUES :**

-la dilatation du col est troublée : le col est oedématisé, épais, le segment inférieur mal amplifié, épais.

-la contraction utérine qui est parfois normale jusqu'à la rupture de la poche des eaux, à partir de ce moment, on note une irrégularité des contractions utérines, hypertonie et hypercinesie puis la rétraction utérine dont les conséquences sont la mort foetale et la rupture utérine.

## **H. PRONOSTIC :**

Le pronostic est amélioré par le diagnostic des positions transversales ou obliques avant le travail ou à son début avant d'arriver à l'épaule négligée.

L'épaule négligée reste grave, l'enfant meurt, avec mortalité et morbidité maternelle élevée.

## **I. CONDUITE A TENIR :**

### **1. Pendant la grossesse :**

-la version par manoeuvre externe peut être tentée chez la multipare afin d'amener la tête ou à défaut le siège foetal au contact du détroit supérieur,

-cette technique est impossible en cas d'utérus malformé chez la primigeste ; une césarienne prophylactique est alors programmée.

-la version par manoeuvre externe est actuellement rejetée vu le taux d'échec élevé.

### **2. PENDANT LE TRAVAIL :**

-la version par manoeuvres internes peut être envisagée chez la multipare à dilatation complète avec membranes non rompues. cette manoeuvre dangereuse n'est plus pratiquée vu le risque de rupture utérine, une césarienne est donc indiquée dès la confirmation de la présentation.