

Dépistage des KC génitaux

1) Le KC du sein :

a) facilité de dépistage par auto palpation

b) 1 mammographie chaque 3 ans après âge de 40 ans (et on l'arrête après 65 ans vue que le risque à cet âge-là devient moindre)

c) devant une mammographie suspecte faire une micro biopsie (écho ou radio guidé)

2) Le KC du Col Utérin :

*Frottis cervicaux vaginale : chaque 2 à 3 ans (si pas de facteurs de risques)

Ps : le KC du col est dû aux MST (surtout HPV)

*FCV : chaque année (si facteur de risque)

***Si FCV anormale : la colposcopie + colorant

```
graph LR; A[***Si FCV anormale : la colposcopie + colorant] --> B[(-) col rose pale (col normal)]; A --> C[(+) Col blanchâtre (col patho)];
```

Ligol

```
graph LR; A[Ligol] --> B[état normal : Col brunâtre (présence de sucre)]; A --> C[Zones blanches (c\'est des zones qui surconsomment le Glycose à cause de leurs activité mitotique) => risque de KC];
```

3) Le KC de l'endomètre :

Tm la + fréquente de la femme ménopausée

*Echographie :

Un endomètre normal chez une femme ménopausée à une épaisseur < 4 mm

Un endomètre chez une femme ménopausée avec une épaisseur > 4 mm =>c'est suspect

4) le KC de l'ovaire :

Difficile à dépister et à diagnostique