Faculté de Médecine de Constantine
Département de Médecine
Enseignement de la 3ème année

1er contrôle de sémiologie : 8 décembre 2015
Nombre de QCM : 50. Durée de l'épreuve : 60 mn

Q01 : La « bosse de bison » peut se rencontrer au cours :
A. de l'obésité androïde
B. du myxoedème
C. de l'hypocorticisme
D. de l'hypercorticisme thérapeutique
E. de l'obésité gynoïde

Q02 : Un amaigrissement avec anorexie peut se rencontrer au cours :
A. du diabète sucré type 1
B. de l'hyperthyroïdie
C. de la tuberculeuse pulmonaire
D. du myxoedème
E. de la parasitose intestinale

Q03 : L'onyxis est :
A. une lésion bactérienne de la base de l'ongle
B. une onychomycose
C. un signe de l'hippocratisme digital
D. une varicosité
E. un périonyxis

Q04 : La fin de la fièvre est marquée par :
A. une vaso-constriction
B. une érection pileuse
C. une confusion avec délire
D. une cyanose
E. une sudation

Q05 : L'œdème cardiaque est :
A. blanc, tendu, indolore
B. douloureux, mou, blanc
C. mou, indolore, blanc
D. violacé, tendu, douloureux
E. violacé, tendu, indolore

Q06 : Une osmolarité à 340 mOs/l peut témoigner :
A. d'une hémodilution
B. d'une déshydratation intracellulaire avec natrémie à 145 Meq/l
C. d'un état d'hyperglycémie à 8 g/l
D. d'une hypoglycémie
E. aucune de ces réponses

Q07 : La cyanose des extrémités :
A. est plus marquée au cours de l'anémie chronique
B. se remarque au cours de l'insuffisance respiratoire chronique
C. s'accompagne de polyglobulie quand elle est aiguë
D. témoigne d'une oxygénation exagérée du sang
E. s'accompagne d'un ictère des extrémités

Q08 : L'état de maigreur sévère se définit par :
A. un BMI égal à 18
B. une hypertrophie musculaire
C. un BMI < à 18
D. une hypertrophie du pannicule adipeux
E. des vergetures rouges

Q09 : Quel est le signe précoce qui caractérise la déshydratation intracellulaire ?

A. La soif intense
B. Le pli cutané
C. L'anurie
D. L'hypotonie des globes oculaires
E. L'hypotension artérielle

Q10 : La boulimie est un signe de :

A. diabète sucré type 1
B. hyperthyroïdie
C. parasitose intestinale
D. anoréxie mentale atypique
E. grossesse

Q11 : La mélanodermie est spécifique :

A. de l'hypercorticisme d'origine périphérique
B. de l'hypocorticisme d'origine périphérique
C. de l'insuffisance rénale
D. de l'hépatopathie avec ictère
E. de l'hémochromatose

Q12 : Le purpura est une lésion :

A. de type 2
B. qui s'efface à la vitro-pression
C. due à un phénomène de vaso-dilatation
D. rencontrée dans les intoxications par les médicaments anti-vitamines K
E. due à une vaso-constriction artériolaire

Q13 : L'érythème de type morbilliforme :

A. ne s'efface pas à la vitro-pression
B. se rencontre au cours de la rougeole
C. disparait en passant par les stades de la biligénie
D. est dû une à vaso-constriction
E. est une lésion de type 3

Q14 : Au cours du syndrome de Cushing chez la femme, on peut rencontrer les signes suivants sauf :

A. des vergetures pourpres
B. des vergetures blanches
C. une amyotrophie
D. un hirsutisme
E. une obésité abdominale

Q15 : Au cours du Cœur Pulmonaire Chronique, on peut rencontrer les signes suivants sauf un. Lequel ?

A. Un œdème blanc, indolore
B. Une cyanose
C. Un œdème violacé, douloureux
D. Une ascite
E. Une turgescence des veines jugulaires

Q16 : Le syndrome infectieux de type viral, se caractérise par les signes suivants , sauf :

A. splénomégalie
B. leucopénie
C. syndrome pseudo-grippal
D. myalgies
E. fièvre

Q17 : La compulsion est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par :

A. une polyphagie pour les aliments salés
B. une envie de grignotage
C. une envie brusque d'un aliment plutôt sucré
D. une boulimie pour les aliments sucrés
E. une anorexie mentale

Q18 : En cas de stérilité du couple, la prise de la courbe de température matinale chez la femme sert à :

A. rechercher une infection vaginale
B. déterminer si le cycle est ovulatoire ou non
C. déterminer si la femme est stérile ou non
D. déterminer si la femme est enceinte ou non (à la place du test de grossesse)
E. déterminer la pré-ménopause

Q19 : Au cours de la consultation, la présence d'une tierce personne est obligatoire pour :

A. un handicapé mental
B. un enfant de plus de 16 ans
C. une personne âgée
D. une femme enceinte
E. un non voyant

Q20 : Quelles mesures permettent d'évaluer l'obésité ?

A. Le BMI
B. La taille
C. Le tour de la poitrine
D. Le périmètre abdominal
E. L'adipomètrie

Q21 : Le syndrome d'épanchement pleural liquidien se caractérise par :

A. une augmentation de l'ampliation hémithoracique
B. une matité.
C. une abolition des vibrations vocales
D. un souffle cavitaire
E. une abolition du murmure vésiculaire

Q22 : Le terme utilisé pour désigner le syndrome clinique d'épanchement pleural est :

A. triade de Virchow
B. triade de Beck
C. triade de Trousseau
D. triade de Charcot
E. triade de Ménard

Q23 : Le terme utilisé pour désigner le syndrome clinique d'épanchement gazeux est :

A. triade de Widal
B. triade de Galliard
C. triade de Fontan
D. triade de Rigler
E. triade de Caroli

Q24 : Le syndrome de condensation pulmonaire se caractérise par :

A. une matité
B. une exagération des vibrations vocales
C. un tympanisme
D. un souffle amphorique
E. des râles crépitants

Q25 : Parmi les signes radiologiques suivants, lesquels sont rencontrés au cours d'une atélectasie de tout un poumon ?

A. Opacité de tout le poumon
B. Attraction de la trachée et du médiastin
C. Déviation de la trachée et du médiastin
D. Pincement des espaces intercostaux
E. Ascension hémi-diaphragmatique

Q26 : La lecture de l'intradermoréaction à la tuberculine se fait au bout de :

A. 30 minutes
B. 01 heure
C. 24 heures
D. 48 heures
E. 72 heures

Q27 : Chez un sujet vacciné, l'intradermoréaction à la tuberculine est dite positive si le diamètre de l'induration est :

A. ≥5mm
B. ≥8mm
C. ≥10mm
D. ≥12mm
E. ≥15mm

Q28 : A l'état physiologique, la quantité de mucus secrétée par l'ensemble de l'arbre trachéo-bronchique est d'environ :

A. 25 ml/24h
B. 50 ml/24h
C. 100 ml/24h
D. 150 ml/24h
E. 200 ml/24h

Q29 : Le thorax en tonneau se définit comme :

A. une augmentation du diamètre antéro-postérieur du thorax
B. une diminution unilatérale de la mobilité d'un hémithorax
C. une diminution du diamètre transversal de la partie inférieure du thorax à l'inspiration.
D. une dépression inspiratoire des espaces intercostaux
E. une respiration abdominale paradoxale

Q30 : Parmi les pathologies suivantes, quelle est l'étiologie la plus fréquente de hémoptysie chez une patiente opérée récemment pour une césarienne ?

A. Hypertension artérielle pulmonaire primitive
B. Embolie pulmonaire
C. Tuberculose
D. Cancer bronchique
E. Hémorragies alvéolaires

Q31 : La respiration périodique de Küsmaul traduit :

A. une embolie pulmonaire
B. une lésion cérébrale grave
C. une insuffisance respiratoire sévère
D. une insuffisance cardiaque décompensée
E. une acidose métabolique

Q32 : Quels diagnostics vous évoque une dyspnée inspiratoire ?

A. Une épiglotite
B. Une dilatation des bronches
C. Une laryngite
D. Un asthme
E. Une broncho-pneumopathie chronique obstructive

Q33 : Selon l'échelle de Sadoul, une dyspnée à la marche normale sur terrain plat correspond au stade:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Q34 : Quelles sont les signes qui font partie du syndrome cave supérieur ?

A. Ptosis
B. Circulation veineuse collatérale thoracique
C. Myosis
D. Enophtalmie
E. Bouffissure du visage

Q35 : A quel diagnostic faut-il penser en premier chez un patient qui consulte pour une douleur médio- thoracique accentuée par la position penchée en avant ?

A. Une péricardite
B. Un infarctus du myocarde
C. Une paralysie diaphragmatique
D. Une pleurésie
E. Une pneumopathie

Q36 : Au cours du syndrome pleural liquidien de moyenne abondance, l'auscultation pulmonaire peut retrouver tous les signes suivants sauf un. lequel ?

A. Une abolition du murmure vésiculaire
B. Un souffle pleurétique
C. Une égophonie
D. Un frottement pleural
E. Une pectoriloquie aphone

Q37 : Au cours de la pneumonie franche lobaire aiguë et a sa phase d'état, l'auscultion peut retrouver tous les signes suivants sauf un. Lequel ?

A. Une abolition du murmure vésiculaire
B. Un souffle tubaire
C. Une pectoriloquie aphone
D. Des râles crépitants
E. Une bonchophonie

Q38 : A la phase de début de la pneumonie franche lobaire aiguë, tous les signes suivants peuvent êtres objectivés, sauf un. Lequel ?

A. Une toux sèche
B. Une polypnée superficielle
C. Unefièvre en plateaux
D. Un crachat hémoptoïque
E. Une douleur thoracique

Q39 : Tous ces mécanismes peuvent expliquer une disparition totale du murmure vésiculaire, sauf un. Lequel ?

A. Un arrêt de la ventilation au niveau du territoire ausculté lors d'une atélectasie
B. Une interposition d'un épanchement liquidien
C. Une inversion du rythme respiratoire
D. Une interposition d'un épanchement aérien
E. L'apparition de bruits surajoutés au cours d'une condensation pulmonaire

Q40 : Lesquels de ces signes peuvent se voir au cours de l'infarctus pulmonaire ?

A. Une toux
B. Une fièvre
C. Une cyanose
D. Une tachycardie
E. Une dyspnée

Q41 : Au cours du syndrome d'atélectasie pulmonaire de tout un poumon secondaire à une obstruction bronchique tous ces signes radiologiques peuvent être observés sauf un. Lequel ?

A. Opacité de tout un hémothorax
B. Pincement des espaces intercostaux
C. Horizontalisation des côtes
D. Ascension hémidiaphragmatique
E. Attraction de la trachée et du médiastin

Q42 : Au cours de l'abcès du poumon à sa phase de désertion, l'hyperclarté observée à la radiologie :

A. est de forme arrondie ou ovalaire
B. comportant un niveau hydro-aérique
C. est rétractile
D. est entourée d'un liserée plus ou moins épais
E. est de dimensions variables

Q43 : Au cours de l'emphysème pulmonaire toutes les assertions suivantes sont justes, sauf une. Laquelle ?

A. Le thorax est distendu en tonneau
B. L'indice de Hirtz est diminué
C. L'ampliation thoracique est augmentée
D. Le cycle respiratoire est inversé
E. La radiographie standard objective une hyperclarté des deux poumons

Q44 : Au cours de la bronchite chronique au stade obstructif, toutes les assertions suivantes sont justes, sauf une. Laquelle ?

A. La cyanose est de type mixte
B. L'auscultation retrouve une diminution du murmure vésiculaire
C. La palpation retrouve une exagération des vibrations vocales
D. Il existe une hépatomégalie
E. On retrouve un signe de Harzer

Q45 : Concernant le lavage broncho alvéolaire, lesquelles de ces assertions sont justes ?

A. Est réalisée au cours d'un examen endoscopique
B. Consiste à instiller du sérum physiologique stérile et à le recueillir ensuite
C. Le liquide recueilli sert au dosage biochimique spécifique
D. Est indiquée de préférence dans la dilatation de bronche
E. Peut êtreutilisé pour la recherche microbiologique

Q46 : L'étude des gaz du sang renseigne sur :

A. la pression partielle en oxygène du sang artériel
B. la pression partielle en gaz carbonique du sang artériel
C. la saturation en oxygène de l'hémoglobine
D. le rapport de gaz inspiré ou expiréà chaque mouvement respiratoire
E. le pH sanguin

Q47 : Au cours de l'hémoptysie de moyenne abondance, toutes les assertions suivantes sont justes, sauf une. Laquelle ?

A. Elle est précédée de prodrome type chaleur rétro sternale
B. Le sang rejeté est rouge, aéré et pur
C. La radiographie pulmonaire n'y est pas indiquée
D. Elle s'accompagne de signe d'anémie aiguë
E. La quantité diminue avec le temps et se termine par des crachats noirâtres

Q48 : Au cours de la dyspnée par corps étranger intra bronchique, la dyspnée a les caractéristiques suivantes :

A. elle est inspiratoire
B. elle est d'installation aiguë
C. son évolution est paroxystique
D. elle s'accompagne de tirage sus sternale, sus claviculaire et intercostale
E. elle s'accompagne d'un sifflement

Q 49 : En ce qui concerne la cyanose centrale, toutes les assertions suivantes sont justes, sauf une. Laquelle ?

A. Intéresse la langue
B. Epargne les extrémités
C. S'accompagne de refroidissement des membres
D. Peut se voir au cours des insuffisances respiratoires aiguës et chroniques
E. Le séjour en altitude peut l'aggraver

49: A --> C

Q50 : Une radiographie standard de face du thorax doit être prise dans les conditions suivantes sauf une laquelle ?

A. Debout, tête droite en position frontale
B. La face antérieure du thorax est appuyée sur la plaque
C. Bras et avant bras légèrement écartés du corps
D. Mains en pronation forcée
E. **Cliché pris en expiration forcée et respiration momentanément suspendue**