Faculté de Médecine
Département de Médecine
Contrôle N°2 de Parasitologie 2017-2018 Durée : 45mn

1) Quelles sont les deux mycoses susceptibles de donner des complications mortelles au cours du SIDA

a- candidose superficielle
b- Cryptococcose neuroméningée
c- Dermatophytose
d- Malasseziose
e- Pneumocystose

2) Au cours de la Cryptococcose

a- Le diagnostic repose sur la recherche de l'agent responsable dans les selles, squames et cheveux.
b- Le diagnostic repose sur la recherche de l'agent responsable dans LCR, LBA, urines, pus et biopsie.
c- Le pronostic est réservé en absence de traitement précoce.
d- L'atteinte principale est une méningo-encéphalique chez les sujets immunocompétents.
e- Des localisations cutanées à type de cryptococcomes peuvent s'observer.

3) Le kyste mature de *Pneumocystis jirovecii*

a- Possède 04 noyaux.
b- Est un protozoaire opportuniste.
c- Est la forme infestante de la maladie.
d- Présente une fluorescence directe aumicroscope à UV.
e- Est mis en évidence par les colorations argentiques spécifiques.

4) Les nématodes sont des helminthes

a- acœlomates
b- hermaphrodites
c- à corps mou
d- à croissance discontinue
e- pseudocœlomates.

5) L'ankylostomose est une maladie

a- professionnelle chez les mineurs
b- due à un ver de l'ordre des Strongylida
c- contractée suite à l'ingestion d'œufs mûrs
d- transmise par la piqûre de vecteurs culicidés
e- diagnostiquée sur la présence de larves dans les selles fraiches.

6) La marche pieds nus expose au risque de contracter une des parasitoses suivantes ; laquelle

a- trichinellose
b- Strongyloïdose
c- Trichiurose
d- Necatorose
e- distomatose

7) Durant la phase d'invasion, l'ankylostomiase se manifeste par

a- des épigastralgies
b- de l'anémie
c- l'hyperéosinophilie sanguine
d- des mélaenas
e- des signes broncho-pulmonaires.

8) *Histoplasma capsulatum* est un champignon dimorphique

a- responsable de l'histoplasmose africaine
b- agent des histoplasmoses africaine et américaine
c- fréquent dans les régions boisées d'Europe du nord
d- responsable de la maladie de Gilchrist
e- classée parmi les Basidiomycètes.

univ.ency-education.com

9) la maladie de Darling ou histoplasmose américaine est une mycose
a- dite à « petites formes »
b- diagnostiquée sur la présence de grandes levures à l'ED
c- due à un champignon fortement opportuniste
d- très grave, même chez le sujet immunocompétent
e- contagieuse, évoluant par épidémies interhumaines.

10) Les sphérules sont les formes de diagnose retrouvées à l'examen direct des produits pathologiques prélevés sur des patients atteints de
a- sporotrichose
b- blastomycose nord-américaine
c- paracoccidioïdomycose
d- d-coccidioïdomycose
e- maladie de Posadas & Wernicke.

11) la « gale filarienne »
a- est un prurit cutané dû à *Onchocerca volvulus*
b- est un prurit cutané intense dû à Loa loa
c- correspond à des « onchocercomes »
d- se rencontre au cours de la Dracunculose
e- se rencontre au cours de la Wuchereriose

12) la loase peut être caractérisée cliniquement par
a- des phlyctènes
b- une diarrhée glaireuse
c- une héméralopie
d- des Eléphantiasis
e- des signes cutanés

13) A propos de la Dracunculose
a- La prophylaxie est basée sur le contrôle sanitaire de l'eau de boisson
b- La prophylaxie est basée sur l'épandage des insecticides
c- Les microfilaires sont recherchées dans le sang
d- Les microfilaires sont recherchées par biopsie cutanée exsangue
e- Le diagnostic sérologique est primordial

14) L'ascaridiose est une parasitose
a- pulmonaire bénigne
b- pouvant être compliquée d'occlusion intestinale
c- liée au péril fécal
d- d-fréquente chez les enfants
e- dont la contamination est due à l'ingestion d'œufsnon embryonnés

15) la lutte contre le péril fécal est une des mesures préventives contre
a- la trichocéphalose
b- la trichinellose
c- la pediculose
d- la dracunculose
e- la loase

16) Le syndrome de loeffler peut se manifester au cours de
a- l'ascaridiose
b- la trichinellose
c- l'onchocercose
d- l'oxyurose
e- la pédiculose

17) Concernant l'oxyurose
a- la ponte des femelles a lieu trois mois après le contage humain
b- l'auto infestation est le mode de contamination le plus fréquent
c- la fièvre est constante
d- le cycle évolutif est hétéroxène
e- le ver adulte est hématophage

univ.ency-education.com

18) Parmi les arguments en faveur de la trichocéphalose ; figure

a- le prurit anal diurne
b- la présence d'œufs à l'examen des selles
c- la fièvre en plateau
d- une importante Hyperéosinophylie
e- une sérologie positive

19) A propos de *Trichinella sp*

a- l'enkystement des larves dans les muscles se fait à partir du 3ème mois d'infestation
b- le diagnostic se fait par la découverte des œufs dans les selles
c- l'adulte femelle pond des œufs dans la marge anale
d- le parasite est en impasse chez l'homme
e- la trichinellose peut être mortelle

20) Concernant la gale, la ou (les) proposition(s) juste(s) est ou(sont)

a- le cycle de vie du parasite se déroule chez le même hôte
b- b-l'agent responsable est un acarien microscopique hématophage
c- l'acarien en cause est un vecteur de germes
d- la fièvre est le maitre symptôme
e- la FNS montre une hyperéosinophilie élevée

21) Les anoploures possèdent les caractéristiques suivantes

a- sont des endoparasites
b- sont hématophages à tous les stades
c- sont dépourvus d'antennes
d- se développent par le phénomène de mues successives
e- sont responsables d'une affection prurigineuse

22) Par définition, un acarien est

a- un arthropode chélicérate
b- un animal dont le corps est composé d'une tête, thorax et abdomen
c- un métazoaire possédant quatre paires de pattesà l'état adulte
d- un métazoaire possédant des pattes articulées
e- un arthropode exclusivement holométabole

23) Le traitement des lésions circinées dermatophytiques, utilise

a- un antifongique local
b- un antibiotique
c- un anti-inflammatoire
d- un antifongique par voie générale
e- une association antifongique et corticoïdes

24) Les aspergilloses sont des affections

a- Opportunistes
b- Toujours à localisation pulmonaire
c- Dues le plus souvent à Aspergillus fumigatus
d- Traitées par chirurgie
e- Cosmopolites

25) Le dosage des IgE antiaspergillaires trouve un intérêt dans

a- L'aspergillose pulmonaire invasive
b- L'aspergillome
c- L'asthme aspergillaire
d- La maladie de Hinson
e- L'otite aspergillaire

26) les champignons microscopiques

a- Sont des procaryotes
b- Sont dépourvus de chlorophylle
c- Sont tous pathogènes pour l'homme
d- Se développent par des hyphes toujours unicellulaire
e- Sont hétérotrophes

univ.ency-education.com

27) la pathogénicité du champignon Aspergillus fumigatus est due à

a- La petite taille de ses spores
b- Sa thermo-intolérance
c- Sa capacité de sécrétion des toxines nécrosantes
d- L'incapacité d'adhérence à la membrane basale
e- Son tropisme vasculaire

28) Le diagnostic indirect est utile dans

a- la scabiose
b- la trichinellose
c- l'oxyurose
d- la pediculose
e- la malasseziose

29) La présence d'œufs à l'examen parasitologique des selles permet de poser le diagnostic de

a- l'ascaridiase
b- l'anguillulose
c- la trichinellose
d- la candidose intestinale
e- la dracunculose

30) Parmi les signes suivants, quels sont ceux retrouvés au cours d'un mycétome fongique

a- fistules peu nombreuses
b- grains de couleur rouge
c- larges géodes sur la radiographie en cas d'atteinte osseuse
d- des lésions cutanées en chapelet
e- un éléphantiasis

Bon Courage.

univ.ency-education.com