# EXAMEN DE PHARMACOLOGIE SUJET -B- N° 3 – 3éme année- 2010/ 2011

**1/Les principaux anti rétroviraux utilisés dans le traitement du SIDA sont :**

- [x] les inhibiteurs de la fusion
- [x] les inhibiteurs de la transcriptase inverse
- [x] les inhibiteurs de l'intégration
- [x] les inhibiteurs de la protéase

**2/ La thérapie par les uricosuriques chez l'insuffisant rénal:**

- [ ] Est contre indiquée
- [ ] est strictement parentérale
- [ ] entraîne une lithiase chez l'hyper sécréteur
- [ ] est associé à une diurèse alcaline

**3/ Le risque mortel induit par le Chloramphénicol :**

- [ ] l'allergie
- [ ] le choc endotoxinique
- [ ] la pan cytopénie
- [ ] la dépression de la moelle

**4/ Les anti H1 ont une action:**

- [ ] préventive sur l'histamino-libération
- [ ] sédative
- [ ] bradycardisante
- [ ] anesthésiante

**[redacted]**

- [ ] de la xanthine oxydase
- [ ] de la réabsorption active de l'acide urique
- [ ] du catabolisme de l'acide urique
- [ ] de l'afflux leucocytaire

**6/ Les règles de prescription d'une bonne antibiothérapie sont**

- [ ] la durée du traitement
- [ ] le terrain sous jacent
- [ ] l'urgence
- [ ] les caractéristiques cinétiques de l'antibiotique

**7/ Dans le traitement de l'ulcère les analogues de la prostaglandine sont :**

- [ ] Des inhibiteurs irréversibles de la pompe à protons
- [ ] Proscrits chez la femme enceinte
- [x] Des inhibiteurs compétitifs des récepteurs H2
- [ ] Sont utilisés comme des pansements gastrique

**8/ Les anti métaboliques agissent au niveau:**

- [ ] de la phase S
- [ ] de la phase G1
- [ ] de la phase M
- [ ] de la phase G2

**9/ Les corticoïdes ne sont pas impliqués dans l'aggravation de:**

- [ ] Un syndrome cushingoïde
- [ ] Un diabète sucré
- [ ] Un ulcère gastro-duodénal
- [ ] Une hyperkaliémie

**10/ L'amiodarone « CORDARONE » agit par :**

- [ ] Augmentation de la période réfractaire et diminution de l'excitabilité myocardique
- [ ] Effet bradycardisant par diminution de la conduction
- [ ] Réduction de la phase 3 du potentiel d'action
- [ ] Action sympatholytique bêta sélective

1/Les agents intercalents dans le traitement du cancer agissent au niveau de la :

- [ ] DNA transcription
- [ ] RNA duplication
- [ ] Synthèse DNA
- [ ] mitose

2/ Lors d'association thérapeutique les antirétroviraux présentant le moins de risque d'interaction sont :

- [ ] les anti protéases
- [ ] les inhibiteurs nucléosidiques la transcriptase inverse
- [ ] les inhibiteurs de la fusion
- [ ] les inhibiteurs non nucléosidiques la transcriptase inverse

3/ Le mode d'action des antidiabétiques oraux sur le pancréas sont :

- [ ] La metformine
- [ ] Les inhibiteurs de l'α glucosidase
- [ ] Les glinides
- [ ] Les incrétines

4/ 7/ Le traitement par MAALOX + TETRACYCLINE aboutit:

- [ ] une augmentation des effets secondaires
- [ ] une synergie potentialisatrice
- [ ] un échec thérapeutique
- [ ] l'apparition de mycoses

5/ La lidocaïne « XYLOCARD » agit par :

- [ ] augmentation de l'espace QT
- [ ] augmentation de la durée du potentiel d'action
- [ ] augmentation de la période réfractaire
- [ ] augmentation du rapport période réfractaire / potentiel d'action

6/ La résistance des germes aux aminosides se manifeste par:

- [ ] diminution de l'affinité pour l'ARNm (ribosome)
- [ ] hydrolyse bactérienne (lyse)
- [ ] inhibition de la synthèse protidique
- [ ] gêne de la pénétration cellulaire

7/Les inhibiteurs de la pompe à protons sont :

- [ ] des anti acides
- [ ] sans relation avec le stimulis histaminergique
- [ ] des inhibiteurs enzymatiques
- [ ] contre indiqué pendant la grossesse

8/ Les recommandations sur la prise en charge en charge du diabète type II sont :

- [ ] Co-morbidité
- [ ] l'âge du patient
- [ ] Le poids
- [ ] Le risque cardiovasculaire HTA

9/ L'association d'un aminoside et d'une bêtalactamine a pour but:

- [ ] d'inhiber les effets secondaires
- [ ] activer une synergie additive
- [ ] provoquer une potentialisation
- [ ] palier à une résistance probable

10/ L'administration du glucagon est contre indiqué en cas d'hypoglycémie sévère induite par un antidiabétique oraux type:

- [ ] biguanide
- [ ] sulfamides
- [ ] glinides
- [ ] glitazones