40 mn Corrigé Type

1. **Voies d'administration possibles d'un contraceptif**
   a. orale
   b. intraveineuse
   c. intramusculaire
   d. intra-utérine
   e. rectale

2. **Principal mécanisme des contraceptifs progestatifs microdosés**
   a. inhibition de l'ovulation
   b. interruption de la nidation
   c. épaississement de la glaire cervicale
   d. altération de la muqueuse utérine
   e. inhibition de la croissance folliculaire

3. **En cas d'oubli de 14 heures du 18eme comprimé d'une forme combinée de contraceptif**
   a. prendre immédiatement le comprimé
   b. prendre le prochain comprimé à l'heure habituelle
   c. utilisation d'une autre méthode contraceptive les 10 prochains jours.
   d. supprimer l'intervalle libre entre les plaquettes
   e. utilisation obligatoire d'une contraception d'urgence

4. **Les antihistaminiques H1**
   a. Sont efficaces dans l'anaphylaxie
   b. Sont indiqués dans le mal de transport
   c. Sont spécifiques pour les récepteurs H1
   d. Provoquent des effets centraux
   e. Peuvent être associés aux dépresseurs du SNC

5. **Les antihistaminiques sont contre indiqués dans**
   a. Les torsades de pointes
   b. L'adénome de prostate
   c. Le glaucome
   d. L'hypothyroïdie
   e. La lithiase biliaire

6. **Parmi ces molécules lesquelles peuvent être utilisées en cas de grossesse :**
   a. La Cétirizine
   b. La Fexofénadine
   c. La Dexchlorphénamine
   d. L'Hydroxyzine
   e. La Prométhazine

7. **La lévothyroxine injectable**
   a. Est un traitement de fond de l'hypothyroïdie
   b. Est indiquée dans le coma myxœdémateux
   c. Peut être utilisée en cas de cardiopathie décompensée
   d. Est contre indiquée en cas d'insuffisance coronarienne
   e. Peut être associée avec les topiques gastro-intestinaux

8. **Parmi ces médicaments le (s) quel (s) interfère (nt) avec l'exploration de la fonction thyroïdienne :**
   a. Les produits de contraste
   b. L'amiodarone
   c. La théophylline
   d. Les antihistaminiques
   e. Les antalgiques

9. **Quels effets indésirables peuvent être provoqués par les thioamines ?**
   a. La neutropénie
   b. L'ictère
   c. Les douleurs articulaires
   d. L'hyper calciurie
   e. L'hyperglycémie

10. **Concernant les B-lactamines :**
    a. L'aztréonam (AZACTAM) est un monobactam
    b. L'imipénème (TIENAM) est un monobactam
    c. L'acide clavulanique est un inhibiteur des β-lactamases associé à l'amoxicilline
    d. L'amoxicilline est une pénicilline M
    e. L'imipénème (TIENAM) est une ureidopénicillines.

11. **Parmi les antibiotiques suivants, lequel n'appartient pas à la famille des ß-lactamines ?**
    a. La céfalothine
    b. L'aztréonam
    c. La josamycine
    d. La méropénème
    e. La céfotaxime

univ.ency-education.com

Corrigé Type

12 .Concernant les macrolides :
a. Ils agissent par perturbation de la synthèse des protéines
b. L'érythromycine en fait partie
c. Ils ne sont actifs que sur des bactéries à Gram négatif
d. Ils peuvent être utilisés dans le traitement d'infection de la sphère O.R.L.
e. Ils ne peuvent être administrés que par voie parentérale

13.Parmi les propositions suivantes à propos de la vancomycine, laquelle est inexacte?
a. C'est une bêta-lactamine
b. Elle est néphrotoxiques
c. Elle n'est pas absorbée par voie digestive
d. Elle agit sur la synthèse du peptidoglycane
e. Elle a un spectre antibactérien essentiellement Gram positif

14. Les aminosides :
a. Sont des antibiotiques bactéricides
b. Sont inactifs sur les bactéries anaérobies stricts
c. Sont actifs sur les mycobactéries
d. Ne sont pas néphrotoxiques
e. Peuvent être administré en association avec le furosémide sans danger.

15.Une souche de staphylocoque "meti R" :
a. Est résistante à la vancomycine
b. Est sensible à l'oxacilline
c. Est sensible à la vancomycine
d. Est sensible à la pénicilline G
e. Est résistante à l'ampicilline

16. Approche thérapeutique de l'asthme :
a. Les agonistes β1 adrénergiques
b. les anticholinergiques
c. Les corticoïdes
d. Les leucotriènes
e. la théophylline

17. Au sujet des agonistes β2-adrénergiques :
a. Le Formotérol présente une durée d'action courte
b. La Terbuteline présente une durée d'action courte
c. Ils stimulent les récepteurs β2 couplés à la protéine Gi
d. Ils présentent des propriétés myorelaxantes utérines utilisées en thérapeutique
e. Peuvent donner une hyperkaliémie

18. Médicaments anticholinergiques utilisés dans le traitement de l'asthme :
a. Sont parasympatholytique
b. Induisent une broncho dilatation
c. Seuls peuvent être utilisés dans le traitement de la crise d'asthme
d. Sont plus efficace sur tous les types d'asthme
e. Les effets indésirables liés a un passage systémiques ont important

19. Dompéridone :
a. Antagoniste dopaminergique
b. Antagoniste sérotoninergique
c. Stimule la motricité digestive
d. Anti diarrhéique
e. Antihistaminique

20. Le traitement de la constipation se base sur :
a. Ralentissement du transit
b. Elimination de la bactérie ou du virus en cause
c. Rétablissement de l'équilibre hydro électrolytique
d. Diminution des sécrétions intestinales
e. Stimulation du péristaltisme

21. La glycérine est un laxatif :
a. Osmotique
b. Purgatif
c. De Lest
d. Rectal
e. Lubrifiant

univ.ency-education.com

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER - Constantine 3
Faculté de médecine de Constantine

Département de Médecine de Constantine-Epreuve de Pharmacologie--A3-C3 LE 21-07-2019

Date de l'épreuve : 18/07/2019

Corrigé Type

9 question(s) retirée(s) - Barême par question : 0.95238095 (au lieu de 0.67)

N°	Rép.
1	ACD
2	C
3	ABD
4	BD
5	ABC
6	AB
7	BDE
8	ABC
9	ABC
10	AC
11	C
12	ABD
13	A
14	ABC
15	CE
16	BCE
17	BD
18	AB
19	AC
20	E
21	D
22	X
23	X
24	X
25	X
26	X
27	X
28	X
29	X
30	X

DEROUICHE
Maître-Assis
En Pharmac

univ.ency-education.com