MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FACULTE DE MEDECINE CONSTANTINE - CLINIQUE DE MEDECINE INTERNE

EXAMEN DE RATTRAPAGE DE SEMIOLOGIE 3ème année – 2 septembre 2013

corrigé type

1. L'œdème aigu du poumon :

A. Se manifeste par une détresse respiratoire aiguë
B. Est une manifestation d'insuffisance cardiaque droite
C. Peut s'accompagner d'hémoptysie
D. Se traduit par des râles crépitants à l'auscultation pulmonaire
E. Se traduit par des râles sous crépitants à l'auscultation pulmonaire

[ACD]

BD

2. L'orthopnée :

A. Survient à l'orthostatisme
B. Survient à l'effort
C. Survient en décubitus
D. Est un signe d'insuffisance cardiaque gauche
E. Est un signe d'insuffisance cardiaque droite

[CD]

B

3. Lesquelles de ces modifications électriques caractérisent l'infarctus du myocarde ?

A. Microvoltage diffus
B. Allongement de la durée de l'onde P
C. Onde Q profonde et large
D. Sus décalage du segment ST
E. Arythmie complète par fibrillation auriculaire

[CD]

B

4. Devant une tachycardie régulière à QRS fins, quels diagnostics doivent être envisagés ?

A. Tachycardie sinusale
B. Fibrillation auriculaire
C. Flutter auriculaire
D. Tachycardie supra ventriculaire
E. Tachycardie ventriculaire

[ACD]

C

5. Parmi les affections suivantes, lesquelles sont à l'origine d'une mono arthrite métabolique ?

A. Hémochromatose
B. Arthrite réactionnelle
C. Maladie de Wilson
D. Polyarthrite rhumatoïde
E. Goutte

[ACE]

BC

6. Parmi les modifications radiologiques suivantes, lesquelles évoquent une arthrose ?

A. Ostéophytes
B. Rareté de la trame osseuse
C. Respect de l'interligne articulaire
D. Lyse osseuse
E. Condensation de l'os sous chondral

[AE]

B

7. A l'examen statique du rachis chez un sujet sain, on observe :

A. Une gibbosité.
B. Une lordose légère cervicale et lombaire
C. Une cyphose cervicale et lombaire
D. Une cyphose légère dorsale et sacrée
E. Une Scoliose

[BD]

C

8. Le signe de Lasègue est :

A. Recherché en cas de lombo-radiculalgies
B. Identique au signe de Léri
C. Positif en cas de déclenchement d'une douleur radiculaire lors du soulèvement du membre inférieur
D. Positif en cas de déclenchement d'une douleur radiculaire chez un patient examiné, en décubitus ventral.
E. Fait partie de l'examen sémiologique du rachis.

9. Au cours du syndrome pyramidal, il y a :

A. Une paralysie spastique, un signe de Babinski bilatéral, une atrophie musculaire
B. Une paralysie spastique, un signe de Babinski unilatéral sans atrophie musculaire
C. Une paralysie spasmodique, un signe de Babinski, une atrophie musculaire
D. Une paralysie spasmodique, un signe de Babinski sans atrophie musculaire
E. Toutes les réponses sont fausses

10. Le fond d'œil trouve son indication dans le diagnostic :

A. D'une atteinte vestibulaire
B. D'une atteinte cérébelleuse
C. D'une atteinte de la sensibilité profonde
D. De l'hypertension intra-crânienne
E. Toutes les réponses sont justes

11. La paralysie du nerf oculomoteur commun peut comporter :

A. Une chute de la paupière supérieure
B. Une dilatation de la pupille
C. Une abolition du réflèxe photomoteur
D. Un strabisme convergeant
E. Une baisse de l'acuité visuelle

12. Une instabilité en position debout aggravée par la fermeture des yeux (signe de Romberg) s'observe dans :

A. Le syndrome cérébelleux
B. Syndrome parkinsonien
C. Syndrome cordonal postérieur
D. Syndrome pyramidal
E. Syndrome myogène

13. Quels sont les éléments qui vous font évoquer un syndrome myogène ?

A. Le déficit moteur est asymétrique
B. Le déficit moteur prédomine à la racine des membres
C. Les reflexes ostéotendineux sont présents
D. Le signe du tabouret est positif
E. La marche s'exécute à petit pas

14. Le kala-azar se manifeste par :

A. Une toux productive
B. Une splénomégalie
C. Une fièvre tierce
D. Des arthralgies
E. Une anémie

C

[B E]

15. Les réticulocytes sont :

A. Des globules rouges jeunes
B. Des globules blancs jeunes
C. Colorés en bleu par le méthylène
D. Des fragments d'hématies
E. Des blastes

BC

[A C]

16. Le purpura thrombopénique a les caractéristiques suivantes :

A. Est nécrotique
B. Ne touche jamais les muqueuses
C. Est diffus
D. Est pétéchial ou ecchymotique
E. Est influencé par l'orthostatisme

AD

[C D]

17. L'acromégalie est :

A. Due à un une hypersécrétion tumorale hypophysaire de thyréostimuline
B. A l'origine d'une organomégalie
C. Caractérisée par un prognathisme
D. A l'origine de vergetures pourpres
E. Parfois compliquée de troubles de la vision des couleurs

BC

[B C E]

18. Une hypoglycémie peut survenir au cours :

A. Du syndrome de Cushing
B. D'une insuffisance hépatique
C. D'une insuffisance antéhypophysaire
D. De l'hyperthyroïdie
E. De l'insuffisance surrénale périphérique

ABD

[B C E]

19. Dans l'hyperthyroïdie, on ne retrouve pas de :

A. Macroglossie
B. Tachycardie
C. frilosité
D. Peau parcheminée de ridules
E. Thermophobie

ACD

[A C D]

20. La diarrhée chronique par syndrome de malabsorption :

A. S'accompagne de signes carentiels par troubles de l'absorption des protéines et des vitamines hydrosolubles
B. Est la conséquence d'une augmentation de la vitesse du transit intestinal
C. Est toujours secondaire à un agent infectieux
D. Ne dure habituellement que 10 jours
E. Cède avec la prise des ralentisseurs de transit

ADE

[A]

28. Une jeune patiente consulte pour fièvre, œdèmes pédieux, protéinurie à 2,5 g/24h, hématurie et hypertension artérielle. Lequel des syndromes suivants vous retiendrez :

A. Une pyélonéphrite aiguë
B. Une Glomérulonéphrite aiguë
C. Une néphrite tubulo-interstitielle
D. Un syndrome néphrotique
E. Une pyélonéphrite chronique

[B]

29. Le dépistage précoce d'une néphropathie chez un sujet diabétique fait appel à quel examen ?

A. Le dosage de la créatinine sanguine et urinaire
B. Le dosage de la protéinurie des 24 heures
C. Une chimie complète des urines
D. La recherche d'une micro-albuminurie
E. La détermination du débit de filtration glomérulaire

[D]

30. Laquelle de ces formules est la plus performante pour l'évaluation de la fonction rénale ?

A. U.V / P
B. MDRD (*Modification of the Diet in Renal Disease*)
C. De Cockroft & Gault
D. Rapport créatinine sanguine / créatinine urinaire
E. Rapport albumine/créatinine urinaire

[B]