UNIVERSITE CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE

CONTROLE DE PARASITOLOGIE RATTRAPAGE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/21

COCHEZ LA OU LES REPONSES JUSTES :

A- 1-Le cycle évolutif parasitaire est ou peut être monoxène pour
- a- *Hymenolepis nana*
- b- *Fasciola hepatica*
- c- *Enterobius vermicularis*
- d- *Echinococcus granulosus*
- e- *Toxoplasma gondii*

2-la consommation de viande mal cuite peut transmettre :
- a- *Hymenolepis nana*
- b –*Fasciola hepatica*
- c –*Enterobius vermicularis*
- d –*Echinococcus granulosus*
- e- *Toxoplasma gondii*

3-Au cours de la phase de migration de la distomatose hépatobiliaire :
- a- le foie est douloureux
- b - l' hypereosinophilie
- c -le diagnostic se fait par la recherche des œufs dans les selles
- d -le ver adulte est retrouvé dans les voies biliaires
- e – A ce stade le parasite est sensible à la Glucantime

B- 4-L'infestation de l'homme par l'œuf de parasite est possible pour :
- a –*Fasciola hepatica*
- b –*Hymenolepis nana*
- c–*Tenia saginata*
- d –*Diphyllobothrium latum*
- e –*Tenia solium*

A- 5-La forme promastigote de Leishmania :
- a) Est retrouvée dans le tube digestif de l'insecte vecteur
- b) Est immobile
- c) Mesure 200 µ à300µ
- d) Mesure 2 à 3 µ
- e) Est intracellulaire chez l'hôte définitif

C- 6-pour traiter les leishmanioses on peut utiliser :
- a) Pénicilline
- b) la chloroquine
- c) l'Ambisome
- d) Niclosamide
- e) Glucantime

univ.ency-education.com

7- Meriones shawi est :

a) le vecteur principal de la leishmaniose cutanée zoonotique en Algérie
b) l'hôte définitif de la Leishmaniose viscérale infantile en Algérie
c) le réservoir principal du Kala azar
d) un canidé réservoir de la leishmaniose viscérale en Algérie
e) Est le réservoir de la leishmaniose cutanée zoonotique en Algérie

8- La leishmaniose viscérale en Algérie est caractérisée par :

a) une diarrhée glairo-sanguinolente
b) des foyers limités dans le Sud du pays
c) une anémie isolée
d) une piqure du Phlébotome femelle
e) une atteinte préférentielle des enfants de moins de 15 ans

9- Parmi les mesures prophylactiques suivantes citez celle qui concerne la leishmaniose :

a) Lutte contre le péril fécal
b) Destruction des gites larvaires des Anophèles
c) Bien laver les crudités
d) Utilisation de crèmes répulsives
e) Eviter la consommation de viande mal cuite

10- la microfilaire de *Wuchereria bancrofti* :

a- a une périodicité diurne
b- a une extrémité caudale effilée
c- possède un noyau interne divisé en trois
d- retrouvée dans les selles
e- est non gainée

11- *Loa loa* est une filaire :

a) à impact lymphatique
b) à impact intestinal
c) est responsable de l'œdème de CALABAR
d) est recherchée dans le sang
e) est recherchée par Biopsie cutanée exsangue

12- une candidose disséminée se définit comme une:

a- septicémie à Candida compliquée d'une atteinte d'au moins 2 organes
b- atteinte d'un seul site stérile avec septicémie à Candida
c- atteinte d'un seul site stérile sans septicémie à Candida
d- atteinte d'un seul site stérile avec ou sans septicémie à Candida
e- septicémie à Candida sans atteinte d'organes

13- Dans l'amoebose intestinale aigue on observe :

a- une hépatomégalie
b- une diarrhée
c- une fièvre
d- une masse abdominale
e- un sub-ictère

univ.ency-education.com

B - 14- Le trophozoite *d'Entamoeba histolytica* a un :
a-Déplacement unidirectionnel
b-Ectoplasme granuleux
c-Endoplasme hyalin
d-Un noyau contenant un gros caryosome entouré d'un halo clair périphérique
e-se retrouve uniquement dans les selles

B - 15- Les vers adultes de schistosomes :
a-sont plats et segmentés
b-vivent en couples dans le système circulatoire
c-sont ronds et segmentés
d-sont ronds et non segmentés
e-femelles sont vivipares

E - 16- La cuisson suffisante de la viande est une des mesures préventives vis-à-vis de la parasitose suivante :
a-Hydatidose
b-Anguillulose
c-Ascaridiase
d-Cryptococcose
e-Trichinellose

E - 17- L'hydatidose :
a-peut être contractée par contact avec un sujet parasité
b-est due à*Echinococcus multimocularis*
c-l'homme se contamine par voie transcutanée
d-l'hôte définitif est le chien
e-la recherche des scolex dans le sang est l'élément clé de son diagnostic

E - 18- Dans l'ankylostomose la contamination de l'homme se fait par :
a- Miracidium
b-Furcocercaire
c-Larve strongyloide
d-Larve rhabditoide
e-Œuf embryonné

A - 19- l'oxyurose :
a-est due à un trématode
b-la contamination se fait par voie transcutanée
c- La symptomatologie est dominée par une diarrhée liquidienne
d-le ver a un cycle hétéroxène
e-l'œuf est embryonné à la ponte

A - 20- parmi les atteintes citées ci- dessous, laquelle peut être due à Malassezia sp :
a-muguet buccal
b-onyxis avec péri onyxis.
c-dermite séborrhéique
d-teigne endothrix
e-épidermophytie circinée

univ.ency-education.com

A- 21- *Histoplasma capsulatum* variété *duboisi* est :
a-est responsable de la Blastomycose Nord-Américaine
b-est un champignon strictement levuriforme
c-est un champignon strictement filamenteux
d-chez l'homme, il se présente sous forme de grandes levures de 8 à 15 µm
e-donne des tubes germinatifs sur milieu PCB

C- 22- pour traiter l'ankylostomiase on peut utiliser :
a-triclabendazole
b-praziquantel
c-Amphotéricine B
d-ivermectine
e- flubendazole

C- 23- une femme enceinte de 6 semaines présente à deux reprises une sérologie toxoplasmique positive avec les taux suivants IgM négatif IgG 20UI
a- il s'agit d'une toxoplasmose ancienne contractée avant la grossesse
b- il s'agit d'une toxoplasmose ancienne contractée pendant la grossesse
c- il s'agit d'une toxoplasmose évolutive
d- un taux IgA est nécessaire pour confirmer le diagnostic
e- une sérologie du liquide amniotique est nécessaire pour confirmer le diagnostic

C- 24- cette femme doit être traitée par :
a- spiramycine 3g par jour pendant toute la durée de la grossesse
b- spiramycine 3g par jour 10 jours par mois pendant toute la durée de la grossesse
c- Doit subir un avortement thérapeutique
d- Abstention de tout traitement
e- Pyriméthamine 50 mg par jour durant le dernier trimestre.

C- 25- La prophylaxie de la toxoplasmose chez une femme enceinte consiste à :
a- Bien laver les crudités
b- Surveiller la femme par des sérologies trimestrielles les femmes séronégatives
c- Avorter la malade en cas de séroconversions
d- Eviter de consommer de la viande congelée
e- Eviter tout contact avec les canidés

B- 26- Le kyste du toxoplasme peut se retrouver dans :
a- Les entérocytes du chat
b- Le système nerveux central
c- Le cœur
d- Le foie
e- Le poumon

univ.ency-education.com

B

27- Lors de la toxoplasmose les IgG :

a- Apparaissent au cinquième jour

b- Disparaissent au bout de trois mois

c- Ne disparaissent jamais

d- Témoignent toujours d'une toxoplasmose ancienne

e- Apparaissent avant les IgM

28- quels sont les parasites qui peuvent se localiser ou transiter par le foie

a- *Toxoplasma gondii*

b- *Entamoeba histolytica*

c- *Ascaris lumbricoides*

d- *leishmania infantum*

e- *Granulosus multilocularis*

29- Quels sont les protozoaires qui ne font pas partie de la classe des FLAGELLES :

a- *Trichomonas intestinalis*

b- *Trypanosoma cruzi*

c- *Balantidium coli*

d- *Leishmania major*

e- *Giardia intestinalis*

30- Les cestodes sont des vers :

a- Plats non segmentés

b- Tous hermaphrodites

c- Possèdent tous des ventouses

d- Vers ronds non segmentés

e- Ont tous un tube digestif complet

univ.ency-education.com