Université Ferhat Abbes Sétif 1
Faculté de Médecine

Sétif le 03/03/2014

Examen N°1 d'Anatomie Pathologique
3ème Année Médecine 2013-2014

Cochez la ou les réponses justes :

1- L'hétérotopie se définit comme :
- a- La présence de tissus normaux adultes de l'organe dans lequel ils se trouvent
- b- La présence dans un tissu d'éléments adultes et normaux d'un autre tissu par inclusion embryologique accidentelle
- c- Une hypoplasie
- d- Une dysplasie
- e- Une agénésie

2- Dans la maladie de crohn , la fibrille amyloïde est de type :
- a- Protéine Ab
- b- Sérum amyloide A
- c- Chaine légère d'immunoglobuline
- d- b_2 microglobuline
- e- Calcitonine

3- La stéatose hépatique de la grossesse est :
- a- Une stéatose microvacuolaire
- b- Une stéatose macro vacuolaire
- c- Exceptionnelle
- d- Bénigne
- e- Grave souvent mortelle

4-Dans le processus inflammatoire la tentative précoce de réparation s'observe au cours :
- a- De la régénération conjonctive
- b- De la détersion
- c- De la phase altérative
- d- De la réaction cellulaire
- e- Des phénomènes vasculo-exsudatifs

5- L'embolie athéromateuse provient d'une plaque d'athérome :
- a- Nécrosée
- b- Fibrosée
- c- Ulcérée
- d- Hémorragique
- e- Calcifiée

6- La dégénérescence cellulaire :
- a- Est un phénomène létal irréversible
- b- Est un phénomène subléthal réversible
- c- Est un phénomène subléthal irréversible
- d- Se traduit toujours par une hypertrophie de la cellule
- e- Se traduit parfois par une atrophie de la cellule

7- Dans la tuberculose, le bacille de koch est abondant dans les lésions :
a- Folliculaires
b- Exsudatives
c- Fibreuses
d- Caséofibreuses
e- Caséofolliculaires

8- L'évolution redoutable des thromboses est :
a- La mobilisation
b- L'organisation
c- Le ramollissement purulent
d- Le ramollissement puriforme
e- La lyse

9- La 1ère phase évolutive de l'infarctus est caractérisé par :
a- Des modifications macroscopiques
b- Des modifications microscopiques
c- Des modifications histo-enzymologiques
d- Des altérations métaboliques
e- Des altérations ultra structurales

10- La plaque d'athérome :
a- Mesure 1-2 cm de diamètre et 2-4 mm d'épaisseur
b- Peut se calcifier
c- Peut s'ulcérer
d- Apparait dès l'âge de 10 ans
e- Succède à la strie lipidique

11- Les lésions macroscopiques élémentaires de la tuberculose sont :
a- Les infiltrations
b- Les tuberculomes miliaires
c- Les ulcérations
d- Les indurations
e- Les cavernes

12- L'évolution d'un foyer hémorragique étendu mal limité est la suivante :
a- La suppuration
b- La formation d'un granulome inflammatoire
c- L'enkystement
d- La résorption sidérophagique
e- La cicatrisation

13- Une thrombose veineuse entraine :
a- Une congestion passive
b- Une congestion active
c- Une teinte tissulaire rouge vive
d- Une teinte tissulaire sombre cyanotique
e- Une gène au retour veineux

14- Dans l'hypersensibilité cytotoxique :
a- L'antigène est circulant
b- L'anticorps est circulant
c- La cellule cible est porteuse de l'anticorps
d- La cellule cible est porteuse de l'antigène
e- La cellule cible est la paroi vasculaire

15- Dans une allogreffe rénale, le phénomène de rejet aigu est caractérisé par :
a- Une infiltration lymphocytaire et macrophagique du rein
b- Une coagulation diffuse de l'arbre vasculaire
c- Un œdème important
d- Une libération des activateurs de la coagulation
e- L'installation d'une fibrose interstitielle

16- L'agammaglobulinémie, maladie héréditaire selon un mode récessif est :
a- Une Immunodéficience humorale
b- Une Immunodéficience combinée
c- Une Immunodéficience cellulaire
d- Une absence de lymphocytes B dans le sang
e- Une aplasie du thymus

17- Une anémie hémolytique peut être à l'origine d'une :
a- Hémochromatose
b- Hémosidérose localisée
c- Hémosidérose généralisée
d- Augmentation du pool fixe de réserve
e- Augmentation du pool labile de réserve

18- Le botryomycome :
a- Correspond à un blastème de régénération
b- Correspond à un bourgeon charnu hyperplasique
c- Correspond à un bourgeon charnu
d- Persiste indéfiniment
e- Récidive après exérèse chirurgicale

19- Un œdème riche en molécules de nature protéique :
a- Caractérise un œdème transudatif
b- Caractérise un œdème exsudatif séreux
c- Caractérise un œdème exsudatif fibrineux
d- Est dû à une augmentation de la perméabilité capillaire
e- Est dû à une augmentation de la pression circulatoire

20- L'athérosclérose peut être impliquée dans l'apparition :
a- De thrombose artérielle
b- De thrombose veineuse
c- De lésions d'ischémie
d- De nécrose de coagulation
e- D'un infarcissement

Corrigé type : ***module anatomie pathologie***

1-B

2-B

3-ACE

4-D

5-C

6-BE

7-E

8-A

9-CDE

10-BC

11-ACE

12-BE

13-ACE

14-BD

15-ACD

16-AD

17-CD

18-BC

19-BCD

20-ACD

Groupe 3 éme année medecine sétif facebook