Sétif le 16/06/2016

UNIVERSITE FERHAT ABBES

FACULTE DE MEDECINE

DEPARTEMENT DE MEDECINE

EMD2 en Anatomie Pathologique

Cochez la ou les réponses justes :

1- Un malade qui se présente en consultation pour une tumeur encapsulée située au niveau de la main sur le trajet d'un nerf, mesurant 3cm de diamètre. Quel est votre diagnostic ?
   A- Un neurofibrome
   B- Un schwannome
   C- Une tumeur desmoide
   D- Un fibraosarcome
   E- Une tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques MPNST.

2- Le medulloblastome est :
   A- Une tumeur plus fréquente chez l'adulte que chez l'enfant faux
   B- Une tumeur gliale
   C- Une tumeur de bon pronostic
   D- Une tumeur rarement observée au niveau de la fosse postérieure.
   E- Aucune réponse n'est juste

3- Un enfant de deux ans consulte au niveau du service de pédiatrie pour des douleurs abdominales, pour lequel une échographie est réalisée. Elle révèle une masse abdominale occupant la totalité du rein et envahissant la surrénale. Quel est votre diagnostic ?
   A- Un neuroblastome
   B- Un carcinome à cellules rénales
   C- Un néphroblastome
   D- Une tumeur surrénalienne
   E- Un séminome

4- Une fois le diagnostic posé (dans la question 03) Quelle est la conduite à tenir thérapeutique ?
   A- Réaliser une biopsie chirurgicale pour confirmer le diagnostic
   B- Commencer par des cures de chimiothérapie
   C- Commencer par des séances de radiothérapie
   D- Exérèse totale de la masse avant tout traitement adjuvant
   E- Associer des cures de chimiothérapie et des séances de radiothérapie

5- Les tératomes sont constitués de :
A- De tissus matures provenant des trois feuillets embryonnaires
B- De tissus matures provenant exclusivement d'un seul feuillet embryonnaire
C- Sont des tumeurs bénignes
D- Sont des tumeurs malignes
E- Peuvent être des tumeurs bénignes ou malignes.

6- Le séminome au niveau de l'ovaire est appelé :
A – Egalement séminome
B- Tératome
C- Germinome
D- Tumeur vitelline
E- Dysgerminome

7- Le stroma tumoral de type adaptatif se voit dans :
A- Les adénocarcinomes
B- Les sarcomes
C- Les tumeurs neuroendocrines
D- Les lymphomes
E- Les gliomes

8- La voie de dissémination métastatique la plus fréquente dans les sarcomes est :
A- La voie lymphatique
B- La voie sanguine
C- Par le biais des filets nerveux
D- A travers les cavités
E- Aucune réponse n'est juste

9- Les éléments de grading des sarcomes sont :
A- Les atypies cytonucléaires
B- Les mitoses
C- La présence de foyers de nécrose
D- Le degré de différenciation de la prolifération tumorale
E- La présence de métastases.

10- Le lymphome de Burkitt est :
A- Un lymphome indolent
B- Un lymphome agressif
C- De bon pronostic
D- De mauvais pronostic
E- Chimiosensible

11- L'ostéoblastome est :
A- Une tumeur osseuse bénigne
B- La taille est supérieure à 2cm
C- La taille est inférieure à 2cm
D- Radiologiquement, la tumeur est radio claire, parfois entourée d'une zone d'ostéocondensation
E- Radiologiquement, la tumeur est radio claire. Elle n'est jamais entourée d'une zone d'ostéocondensation

12- Le chondrosarcome est une :

A- Lésion limitée non destructive

B- Lésion destructive

C- Lésion caractérisée par des nodules riches en chondrocytes atypiques

D- Lésion caractérisée par des nodules comportant de rares chondrocytes atypiques

E- Aucune réponse n'est juste.

13- La conservation de la fonction normale est une des caractéristiques des cellules tumorales, Parmi la liste suivante cochez les propositions justes :

A- Les cellules du carcinome épidermoide élaborent de la kératine.

B- Les cellules du carcinome épidermoide élaborent de la mélanine

C- Les cellules de l'adénocarcinome élaborent du mucus

D- Les cellules de l'adénocarcinome élaborent de la kératine

E- Les cellules de l'adénocarcinome élaborent de la mélanine

14- Une métastase tardive est :

A- Une métastase qui révèle le foyer primitif

B- une métastase qui apparait plusieurs années après le traitement

C- une métastase découverte au moment du diagnostic

D- une métastase qui touche uniquement les ganglions régionaux

E- une métastase qui touche n'importe quelle chaine ganglionnaire

15- Dans le carcinome épidermoide bien différencié et mature:

A- Les cellules sont polyédriques

B- Les cellules sont arrondies

C- Elles s'organisent en amas qui ne sont jamais centrés par des globes cornés

D- Elles s'organisent en amas centrés par des globes cornés

E- Elles s'organisent en structures glandulaires

16- Le cancer insitu est:

A- Une lésion précancéreuse

B- Une lésion cancéreuse

C- Une lésion qui s'observe dans tout type de tissu

D- Une lésion qui s'observe dans les tissus épithéliaux pourvus de membrane basale

E- Une lésion qui s'observe dans tous les tissus épithéliaux.

17- Parmi ces facteurs quels sont les agents carcinogènes promoteurs :

A- Tabac

B- Radiations

C- Hormones

D- Virus

E- Alimentation

18- Le stroma tumoral atrophique est:

A- Riche en fibres de collagène

B- Riche en follicules lymphoides

C- Réduit à des vaisseaux sanguins

D- Élabore des rapports identiques à ceux du tissu normal

E- Aucune réponse n'est juste

19- La cellule de Reed Sternberg est :

A- Une cellule à noyau polylobé

B- Une cellule à noyau monolobé

C- Une cellule qui se voit uniquement dans la maladie de Hodgkin faux

D- Une cellule qui se voit dans d'autres pathologies tumorales.

E- Une cellule caractéristique de la maladie de Hodgkin

20- Les tumeurs malignes sont :

A- Des tumeurs mal limitées

B- Des tumeurs encapsulées

C- Des tumeurs non récidivantes

D- Des tumeurs qui donnent des métastases

E- Des tumeurs agressives

بالتوفيق

EXAMEN DE 3EME ANNEE DE MEDECINE/ ANATOMOPATHOLOGIE EMD2 2015-2016

Date de l'épreuve : 16/06/2016

Corrigé Type

Barème par question : 1,000000

N°	Rép./Alternatives 1&2		
1	B		
2	E		
3	C		
4	B		
5	AE	E	
6	E		
7	C		
8	B		
9	BCD		
10	BDE		
11	ABD		
12	BC		
13	AC		
14	B		
15	AD		
16	BD		
17	CE		
18	C		
19	ADE		
20	ADE		

Dr. S. OUHIDA