UNIVERSITE DJILLALI LIABES DE SIDI BEL ABBES Faculté de Médecine
Module d'Anatomie-pathologie 27 /02/2022

EMD 1- 30 TP : 31- 40

EMD 1-30

1)Quelle est la coloration spéciale qui met en évidence le Bacille de Koch
a. Perls
b. Gordon sweet
c. Trichrome de Masson
d. Ziehl
e. Hématoxyline éosine

2) Le rejet de greffe sur-aigu
a. Se manifeste dans les minutes qui suivent la greffe
b. Est vasculaire
c. Se manifeste dans les heures qui suivent la greffe
d. Est cellulaire
e. Est marqué par une congestion et coagulation de l'organe transplanté

3) Les caractéristiques de l'infarctus blanc
a. S'observent dans les organes à une double circulation
b. Nécrose ischémique exsangue
c. Nécrose ischémique hémorragique
d. Les lésions microscopiques sont nettes dans les 6 premières heures
e. La cicatrice fibreuse se fait après 1 à 2 semaines

4) La congestion passive est
a. Secondaire à une gêne du sang veineux
b. Secondaire à une gêne du sang artériel
c. Les organes sont bleu-violacés
d. Les organes sont rouges
e. les organes sont augmentés de poids

5) Les œdèmes sont
a. Secondaire à une augmentation pathologique des liquides interstitiels
b. Secondaire à une augmentation physiologique des liquides interstitiels
c. Transsudatifs
d. Exsudatifs
e. Généralisés et localisés

6) La tumeur maligne est
a. Mal limitée
b. Non encapsulée
c. Ne donne pas de métastases
d. Donne des métastases
e. Une croissance rapide

7) Les différentes étapes de la carcinogénèse
a. Initiation cancéreuse
b. Néoangiogénèse
c. Promotion du cancer
d. Cicatrisation
e. Progression cancéreuse

8) Les gènes impliqués dans la carcinogénèse
a. Proto-oncogène
b. Gènes suppresseurs de tumeurs
c. Gènes réparateurs d'ADN
d. Gènes destructeurs d'ADN
e. Oncogène

9) La maladie de Bowen est
a. Un carcinome malpighien in-situ
b. Un carcinome malpighien invasif
c. Un sarcome
d. Un lymphome
e. Un adénocarcinome

10) Le condylome est
a. Lié au virus EBV
b. Lié au virus HPV
c. Lié au virus HIV
d. Une tumeur bénigne
e. Risque de dégénérescence

11) Dans quel organe le carcinome épidermoïde ne peut pas se développer
a. Col utérin
b. L'œsophage
c. Estomac
d. Peau
e. Cavite buccale

12) Le lymphome d'Hodgkin se caractérise par

a. La présence de cellules de Reed Sternberg
b. Lié au virus EBV
c. La présence de cellules d'Hodgkin
d. Phénotype B
e. Positivité des anticorps CD 15 et CD 30

13) La nécrose de coagulation est

a. Secondaire à une ischémie
b. Secondaire à des infections à pyogènes
c. Une perte totale de l'architecture tissulaire
d. Une préservation de l'architecture mais fantomatique
e. Caractéristique de la pancréatite aiguë

14) Quelles sont les réponses adaptatives de la cellule et des tissus

a. Métaplasie
b. Dysplasie
c. Nécrose
d. Atrophie
e. Dystrophie

15) L'inflammation

a .Une réaction de l'organisme à une agression
b. Une lésion d'adaptation de l'organisme
c. Son lieu est le tissu conjonctif
d. Son lieu est le revêtement épithélial
e. Est liée seulement à un agent pathogène vivant

16) L'athérosclérose

a. Un épaississement intimal diffus sans dépôt lipidique
b. Une surcharge calcique de la média
c. Un remaniement de l'intima des artères de gros et moyen calibre
d. Un remaniement de l'intima des veines de gros et moyen calibre
e. Une accumulation diverses notamment les lipides, dépôts calciques et de tissus fibreux

17) Un foie de volume augmenté, brun rouillé de consistance dure est en relation avec:

a. Une choléstase
b. Une mucoviscidose
c. Une hémochromatose
d. Une glycogénose
e.une stéatose

18) Les pigment de mélanines

a. des mottes noirâtre intracellulaires et /ou extracellulaires
b. des mottes verdâtres intracellulaires et /ou extracellulaires
c. Leur mise en évidence est effectuée par la coloration de Perls
d. Leur mise en évidence est effectuée en immunohistochimie par l'HMB45
e. Sont observés dans les naevus

19) Parmi les propositions suivantes lesquelles sont des tumeurs gliales

a. Neurofibrome
b .Astrocytome
c .Méningiome
d. Oligodendrogliome
e. Glioblastome

20) Le naevus jonctionnel est de localisation

a .Epidermique
b .Dermique
c.Hypodermique
d. Epidermique et dermique
e .Dermique et hypodermique

21) Un adénocarcinome colique avec une mucosecrétion supérieure à 50% est dit

a.Un adénocarcinome bien différencié
b. Un adénocarcinome peu différencié
c. Un adénocarcinome moyennement différencié
d.Un adénocarcinome mucineux
e. Un adénocarcinome à cellules en bague à chaton

22) Quels sont les marqueurs immunohistochimiques qui sont exprimés par le tumeurs neuro-endocrines

a. CD3
b. Cytokératine
c. Chromogranine T
d. Synaptophysine
e. Chromogranine A

23) un malade qui présente de multiples tumeurs glandulaires bénignes est une

a. Condylomatose
b. Adénomatose
c. Adénome
d. Leiomyomatose
e. Adénomyose

24) La théranostique

a. Une discipline biologique
b. Une discipline clinique
c. Propose une thérapie ciblée
d. Utilise de l'immunohistochimie
e. Utilise de l'histochimie

25) Un tératome est une tumeur

a. Bénigne
b. de malignité intermédiaire
c. Maligne
d. Du blastème embryonnaire
e. Germinale

26) Les lésions précancéreuses

a. Sont des états cliniques associés à un risque de survenue de cancer
b. Sont des anomalies histopathologiques associées à un risque de survenue de cancer
c. Sont détectables avant l'apparition d'un cancer
d. Exemple type est la dystrophie
e. Exemple type est la dysplasie

27) Quelle est la localisation du carcinome insitu

a. Le chorion
b. Le tissu conjonctif
c. L'épithélium
d. Le ganglion
e. Le cartilage

28) La dysplasie

a. Une condition précancéreuse
b. une lésion précancereuse
c. Se voit au cours des tumeurs bénignes
d. Son diagnostique est clinique
e. Se voit au cours de certaines inflammations chroniques

29) Les filaments intermédiaires sont

a. Localisés dans le noyau
√ b. Localisés dans le cytosquelette
c. Visibles en microscopie optique
d. Visibles en immunohistochimie
e. Précisent l'origine de la cellule cancéreuse

30) Selon la composition biochimique, la fibrose est

√ a. Collagénique
√ b. Réticulinique
c. Hyalorinique
√ d. élastique
e. Sclérotique

TP (31- 40)

31) La tumeur bénigne est

√ a. Bien limitée
√ b. Encapsulée
√ c. Une croissance lente
√ d. Ne donne pas de métastases
x e. Donne des métastases

32) Une anisocytocaryose est

a. Une inégalité de la taille des cellules
b. Une inégalité de la taille des noyaux
c. Une inégalité de la taille des cellules et des noyaux
d. Observée en cas de tumeur bénigne
e. Observée en cas de tumeur maligne

33) Le stroma tumoral

a. Est rencontré dans les tumeurs benignes
√ b. Est rencontré dans les tumeurs malignes
√ c. Assure les apports nutritifs des cellules tumorales
d. Pauvre en vaisseaux
e. Se développe de façon synchrone avec les cellules tumorales

34) Un lipo-fibrome est une tumeur de structure composite

a. Mésenchymateuse
b. Épithelio-mésenchymateuse
c. Epithéliale
d. Composée d'adipocytes et de fibres musculaires lisses
√ e. Composée d'adipocytes et de fibroblastes

35) La congestion active

a .Une augmentation de la quantité de sang dans les vaisseaux
x b. Une augmentation de plasma dans les vaisseaux
c. Secondaire à un afflux de sang artériel
d. Se traduit cliniquement par un gonflement
√ e. Se traduit cliniquement par une rougeur locale

36) Citer l'élément qui n'appartient pas au granulome inflammatoire

a .Polynucléaires b. Cellules épithéliales c. Lymphocytes
d. Fibroblastes e .Cellules épithélioïdes

37) Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas une tumeur germinale

a. Seminome b. Néphroblastome c. Tératome
d. Carcinome embryonnaire e. Tumeur vitelline

?**38) Nécrose caséeuse est**

a. Grumeleuse et éosinophile b. Homogène et éosinophile
c. Sans architecture cellulaire ou tissulaire d. Conservation de l'architecture cellulaire ou tissulaire
√ e. Caractéristique de la tuberculose

? **39) Les métastases**

a. Des tumeurs secondaires par contiguïté à la tumeur primitive
b. Des tumeurs secondaires situées à distance de la tumeur primitive
c. Peuvent être révélatrices d'une tumeur primitive méconnue
d. Peuvent être identique à la tumeur primitive
√ e. Sont spécifiques des tumeurs malignes

40) Quelle est la proposition qui n'appartient pas aux formes d'inflammation aigue

a .Inflammation congestive et œdémateuse
b. Inflammation hémorragique
c. Inflammation fibrineuse
d .Inflammation purulente ou suppurée
√ e. Inflammation granulomateuse

Université DJILLALI LIABES de Sidi Bel Abbes
FACULTÉ DE MEDECINE
TALEB MOURAD

atomie et cytologie pathologique, programme d'ex
de : 'EMD', de la : Troisième année Médecine

de l'épreuve : 27/02/2022

Corrigé Type

Barême par question : 0,500000

	Rép.
	D
	ABE
	BE
	ACE
	ACDE
	ABDE
	ACE
	BCE
	A
0	BDE
1	C
2	ABCDE
3	AD
4	ADE
5	AC
6	CE
7	C
8	ADE
9	BDE
20	A
21	D
22	BDE
23	B
24	ACD
25	AE
26	BCE
27	C
28	BCE
29	BDE
30	ABD
31	ABCD
32	CE
33	BCE
34	AE
35	ACE

N°	Rép.
3	S
37	B
38	ACE
39	BCDE
40	E

DELKRALLADI. H
Maître de Conférences "A"
Anatomie Pathologie