Université Badji Mokhtar
Faculté de médecine d'Annaba [Département de Médecine]

1er EMD – 3e année médecine
Anatomie Pathologique

Le 12 Fevrier 2014

1 – Au cours de l'inflammation aigue, le tissu lésionnelle est riche en :

a – Lympho-plasmocytes
b – polynucléaires
c – macrophages
d – vaisseaux congestifs
e – nécrose caséeuse

LIBRAIRIE - PAPETERIE
THE DOCTORS COPIEUR
Cité Zaafrania Bd Med Seddik B/Yahia
ANNABA - R.C: 12 . A . 1856778 - 00/23

2 – Une infiammation dite spécifique :

a – est constituée de cellules épithélioïdes concentriques et de cellules multi nucléées qui entourent parfois un foyer de nécrose.
b – peut évoluer vers des lésions caverneuses
c – Fait intervenir les phénomènes d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire
d – peut évoluer vers la fibrose et la calcification
e – n'est pas spécifique de la tuberculose.

3 – Une lésion granulomateuse tuberculoïde observée sur biopsie intestinale fait évoquer

a – une tuberculose
b – Une maladie de crohn
c – Une sarcoïdose
d – une infection bactérienne à BGN
e – une colite ischémique

4 – Les formes anatomo-cliniques de l'inflammation banale sont :

a – Inflammation tuberculeuse
b – Inflammation aiguë
c – Inflammation subaiguë
d – Inflammation chronique
e – Inflammation réactionnelle à un corps étranger

5 – La métaplasie est :

a – une tumeur maligne, non infiltrante
b – La transformation de tissus donnés en d'autres tissus différents
c – Ne touche que les tissus épithéliaux
d – Ne touche que les tissus conjonctifs
e – Touche aussi bien les tissus épithéliaux que conjonctifs

6 – L'hypotrophie ou l'atrophie

a – Signifie une diminution des cellules d'un tissu ou d'un organe
b – Peut avoir comme cause une stimulation hormonale accrue
c – Peut avoir comme cause une imbibition liquidienne
d – Est liée soit à la diminution du nombres des cellules et/ou à la diminution de la masse fonctionnelle des cellules.
e – Peut être liée à une involution hormonale (exemple l'endomètre ménopausique).

7 – L'infarctus blanc

a – est pâle, bien limité.
b – est hémorragique, infiltré de sang
c – se voit essentiellement au niveau des reins et du cœur
d – est due a une oblitération artérielle
e – est du à l'occlusion d'une veine

8 – Les lésions de l'athérosclérose :

a – se voient uniquement au niveau des gros vaisseaux.
b – se voient dans les artères de moyen et de gros calibre.
c – siègent dans la limitante élastique interne.
d – contiennent des cellules spumeuses.
e – sont favorisées par le vieillissement de la paroi vasculaire.

9 – la plaque athéromateuse simple :

a – apparait tôt dans l'enfance
b – réalise une protrusion linéaire jaunâtre de quelques millimètres à 1cm de grand axe.
c – présente un centre lipidique et une chape fibreuse.
d – s'associe à une modification de la média. (Remodelage
e – s'associe à une destruction de la limitante élastique interne

10 – La plaque athéromateuse peut évoluer vers :

a – une ulcération.
b – une thrombose
c – une embolie.
d – un anévrysme
e – une disparition ou guérison après traitement.

. – Un thrombus

a- est constitué de cellules spumeuses et d'une chape fibreuse.
b- est constitué d'une tête d'un corps et d'une queue.
c- peut faire suite à une lésion de la paroi vasculaire (lésion du revêtement endothélial).
d- atteint plus le système veineux que les artères.
e- peut migrer constituant un embole.

12 – Un processus inflammatoire dit spécifique :

a – est constitué d'un regroupement cellulaire particulier.
b – est de spécificité relative permettant d'évoquer un nombre restreint de diagnostic.
c – peut même se voir en association à des processus néoplasiques tumoraux.
d – peut être défini par la présence d'un agent pathogène identifiable.
e – est le plus souvent représenté par des follicules épithélio-giganto-cellulaires.

13 – Un infarctus rouge :

a – est un territoire de nécrose ischémique par obstruction d'une artère ;
b – est caractérisé par l'apparition d'une inondation hémorragique secondaire
c – touche le cœur
d – touche les poumons
e – est caractérisé par un territoire lésionnel initialement rouge sombre, mal limité,

14 – : La métaplasie est :

a – une transformation d'un tissu en un autre tissu de constitution et de fonction différentes
b – altération d'un tissu ou d'un organe liée à un trouble nutritionnel
c – une anomalie de développement d'un tissu
d – une lésion qui peut être épithéliale ou conjonctive
e – une lésion hautement maligne de haut grade

15 – : L'examen extemporané est un examen :

a – histopathologique définitif
b – basé sur des techniques de congélation
c – qui permet de mettre en évidence un grand nombre de récepteurs et de protéines
d – qui a l'avantage de la rapidité
e – qui permet de guider un geste thérapeutique chirurgical

16 – L'apoptose est :

a – une mort cellulaire programmée
b – un phénomène cellulaire consommateur d'énergie
c – un phénomène régit par des gènes spécifiques
d – une mort cellulaire pouvant être de liquéfaction ou de coagulation
e – souvent invisible sur les coupes histologiques

17 – : La nécrose est :

a – une mort cellulaire brutale et étendue
b – un processus mettant en jeu les caspases
c – toujours associée à une perte totale de l'architecture cyto-histologique
d – une lésion causée soit par des agents exogènes ou endogènes multiples
e – souvent accompagnée d'une réaction inflammatoire

18 – L'amylose est :

a – une substance protéique dont la configuration primaire et secondaire est très spécifique
b – un ensemble de substance ayant en commun une structure bêta plissée
c – un dépôt extra-cellulaire pouvant témoigner de plusieurs maladies différentes
d – la source d'une bi-réfringence jaune verte en lumière blanche après coloration au rouge congo.
e – visible sur les colorations usuelles.

19 – Le processus inflammatoire :

a – peut se dérouler dans n'importe quel tissu de l'organisme.
b – se déroule dans le tissu conjonctif vascularisé.
c – se déroule dans le tissu épithélial vascularisé.
d – est une réponse de l'organisme à une agression.
e – est habituellement bénéfique pour l'organisme.

20 – cocher les réponses justes :

a – Une mauvaise détersion conduit à la chronicité du foyer inflammatoire.
b – La détersion est le rapprochement des berges d'une perte de substance.
c – la coaptation peut être spontanée ou provoquée.
d – une mauvaise vascularisation conduit à la chronicité de l'inflammation
e – une bonne coaptation est nécessaire pour une bonne cicatrisation.

بـــــالتوفيق

Corrigé UP Anatomie pathologique

I

2013/2014

N°	Rep
1	BCD
2	ABCDE
3	ABC
4	BCD
5	BE
6	ADE
7	ACD
8	BDE
9	CE
10	ABCD
11	BCDE
12	ABCDE
13	ABDE
14	AD
15	BDE
16	ABCE
17	ADE
18	BCE
19	BDE
20	ACDE

LIBRAIRIE - PAPETERIE
THE DOCTORS COPIEUR
Cité Zaafrania Bd Med Seddik B/Yahia
ANNABA - R.C: 12 .A. 1856778 - 00/23