INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

CONSTANTINE 05/09/2013

CONTROLE DE RATTRAPAGE DE NEUROLOGIE

Q1 – Les facteurs de mauvais pronostic au cours du syndrome de Guillain barré :

A- Phase d'extension très rapide inférieure à 1 semaine.
B- Atteinte oculomotrice.
C- Début par les membres supérieurs.
D- Signes dysautonomiques.
E- Atteinte myélinique à L'E.M.G.

Q2- La biopsie musculaire au cours des dystrophies musculaires progressives montre :

A- Une inégalité de taille des fibres musculaires.
B- Toutes les fibres sont atrophiées.
C- Toutes les fibres sont hypertrophiées.
D- Des fibres en dégénérescences.
E- Des fibres en régénérescence.

INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

Q3- L'épilepsie à paroxysme ralandique.

A- Est une épilepsie partielle idiopathique.
B- Survenant chez des enfants présentant des lésions cérébrales.
C- Dont l'âge de début est compris entre 2-6 ans.
D- Caractérisée par des crises surtout diurnes.
E- De bon pronostic.

Q4- Les effets secondaires du phénobarbital sont :

A- Ralentissement cognitif.
B- tremblement
C- Chute des cheveux.
D- Rhumatisme articulaire.
E- Hypertrophie gingivale.

Q5- L'accès migraineux dure sans traitement :

A- Une heure.
B- Quelques minutes.
C- Quatre à soixante douze heures.
D- Quinze jours.
E- Trente jours.

Q6- Le tic douloureux de trousseau est :

A- Toujours unilatéral.
B- Toujours bilatéral.
C- Change de côté durant l'accès.
D- Survient souvent dans le territoire du V1.
E- Survient souvent dans le territoire du V1 et V2.

Q7- Le syndrome combiné de la moelle a pour causes :

A- La sclérose en plaques.
B- La maladie de Charcot.
C- Un déficit en cobalamine.
D- Un déficit en vitamine A.
E- L'Anémie de Biermer.

Q8- un test de folstein > à 27 signifie :

A – Qu'il est normal.
B- Une depression.
C- Une démence dégénérative.
D- Une démence vasculaire
E- Un état prédémentiel.

Q9- Les tests pharmacologiques dans la myasthénie sont :

INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

A- A Visée diagnostique.
B- A visée thérapeutique.
C- A visée pronostic.
D- A l'origine d'une amélioration clinique.
E- A l'origine d'une amélioration clinique et électrique.

Q10- Le traitement de fond de première intention dans la dermatomyosite et la polymyosite repose sur :

A- Les corticoïdes.
B- Les immunosuppresseurs.
C- Les corticoïdes et les immunosuppresseurs.
D- Les immunoglobulines.
E- Les échanges plasmatiques.

Q11- le traitement de la poussée au cours de la sclérose en plaques repose sur :

A- Un bolus de methyl prédnisolone à la posologie de 1g/j par voie IV pendant 03 jours.
B- Les immunomodulateurs type interféron Beta 1a.
C- Les immunomodulateurs type interféron Beta 1b.
D- Les immunosupresseurs .
E- Les corticoïdes au long cours par voie orale.

INESSM
Bibliothèque C
Copy Servi

Q12- les critères d'exclusion de la maladie de parkinson sont :

A- Un syndrome parkinsonien akinéto-rigide unilatéral.
B- Un syndrome parkinson tremblant unitéral.
C- Un syndrome parkinson ne répondant pas à une dose suffisante de L dopa.
D- L'apparition d'une démence tardive.
E- L'apparition précoce de fluctuations.

Q13 –Chez un patient de 35 ans présentant un syndrome parkinsonien akinéto-rigide le traitement de choix repose sur :

A- Les anti-cholinergiques.
B- La L dopa.
C- Les agonistes dopaminergiques.
D- Les anti- dépresseurs.
E- La L dopa associée aux anti- cholinergiques.

Q 14- Quel est le délai à respecter pour la thrombolyse par rt PA :

A- L'administrer avant 08h.
B- L'administrer avant 04h.
C- Supérieur à 12h.
D- Supérieur à 24h.
E- Supérieur à 4h30.

Q15- L'accident ischémique transitoire (AIT) est à différencier de :

A- La crise épileptique partielle.
B- L'ictus amnésique.
C- La migraine avec aura.
D- L'hémorragie méningée.
E- Un syndrome confusionnel.

QUESTIONS DE NEUROCHIRURGIE

26-Une tumeur du vermis peut se compliquer d' :

A. une Hydrocephalie tetraventriculaire.

B. un oedème papillaire.

C. un engagement temporal.

D. trouble de la conscience.

E. aucune reponse n'est juste.

INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

27-L'obstruction de l'un des trous de Monro donne une dilatation

A. d'un ventricule lateral.

B. du 3e ventricule.

C. du 4e ventricule.

D. triventriculaire.

E. tetraventriculaire.

28-Une Rhinorrhée post traumatique s'exprime par :

A. une hypertension intracranienne.

B. une meningite.

C. une pneumocephalie.

D. une paralysie faciale peripherique.

E. un deficite moteur controlateral.

19-Au cours d'un hematome intra-parenchymateux post-traumatique ,l'origine du saignement est :

A.les veines corticales.

B.l'artere méningée moyenne.

C.le sinus longitudinal superieur.

D.osseux.

E.les capillaires

20-Une hernie discale foraminale L4-L5, se traduit cliniquement par une :

A. Lombosciatalgie S1.
B. Lombosciatalgie L5.
C. Lombocruralgie L4.
D. Lombosciatalgie L5 et S1.
E. Lombalgie.

1	AD	A
2	ACE	CE
3	ACE	C
4	AD	B
5	C	ABE
6	AE	BD
7	CE	AD
8	E	BE
9	ABDE	E
10	A	B

Dr Lounes
MA N-chit

Département de Médecine de Constantine -
NEUROLOGIE - 4ème Année *09/09/

Date de l'épreuve : 05/09/2013

Corrigé Type

N°	Rép.
1	AD
2	ADE
3	ACE
4	AD
5	C
6	AE
7	ACE
8	E
9	ABDE
10	A
11	A
12	CE
13	C
14	B
15	ABC
16	BD
17	A
18	BC
19	E
20	B

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service