CONTROLE DU MODULE DE NEUROLOGIE

1ère rotation **28/10/2012**

Questions

Q1- Les antiépileptiques indiqués en cas d'épilepsie de type absence sont :

A-le valprorate de sodium
B- Le phénobarbital
C-La lamotrigine
D-La Carbamazépine
E-ethosuximide

Q2- Les effets secondaires du valproate de soduim sont :

A-obesité

B-tremblement

C-induction enzymatique

D-hyperactivité

E-acné

Q3- Les troubles de la conscience caractérisent les crises :

A- toniques

B- myocloniques

C-cloniques

D-Tonico cloniques

E-absences

Q4- Les automatismes peuvent s'obeserver en cas de :

A-crise tonique

B-crise de type absence

C-crise myoclonique

D-crise atonique

E-crise partielle complexe

Q5- Les épilepsies généralisées idiopathiques sont :

A-épilepsie absence de l'enfant

B-épilepsie myoclonique juvénile

C-épilepsie bénigne à paroxysme rolandique

D-épilepsie du lobe temporale

E-épilepsie grand mal du réveil

Q6- le syndrome de lambert Eaton est :

A- une entité clinique de la myasthénie

B- une entité électrique de la myasthénie

C- une forme clinique de la myasthénie

D- une forme évolutive de la myasthénie

E- un syndrome paranéoplasique

Q7-les tests pharmacologiques dans la myasthénie sont :

A- a visée diagnostic

B- a visée thérapeutique

C- des examens complémentaires

D- a l'origine d'une amélioration clinique

E- a l'origine d'une amélioration clinique et éléctrique

Q8-le traitement de la myasthénie repose sur :

A- les anticholinergiques

B- les immunosupresseurs

C- les gamma globulines

D- les anticholinesterasiques

E- la rééducation fonctionnelle

Q9- un test de Folstein > à 27 signifie :

A-qu'il est normal

B- Peut être normal

C- une démence dégénérative

D-une démence vasculaire

E-un état prédémentiel

Q10- parmis les complications qui peuvent se voir au cours du syndrome démentiel :

A-une confusion mentale

B-des crises d'épilepsie partielles

C-des crises d'épilepsie généralisées

D-une marche à petits pas

E-une hypotension orthostatique

Q11-la durée minimale entre 2 poussées au cours de la sclérose en plaques est de :

A- 10 jours

B- 15 jours

C- 30 jours

D- 60 jours

E- 7 jours

Q12- Au cours de la sclérose en plaques :

A- Les signes moteurs sont les manifestations cliniques initiales les plus fréquentes

B- La forme progréssive secondaire est la forme évolutive la plus fréquente

C- La forme rémittente est la forme évolutive la plus fréquente

D- La vitesse de sédimentation est toujours accélérée

E- L'analyse du LCR révèle souvent une hyperalbuminorachie > à 1,5g/l

Q13 - la névrite optique retrobulbaire au cours de la sclérose en plaques :

A- Est souvent unilatérale
B- Est souvent bilatérale
C- S'accompagne toujours d'un œdème papillaire
D- Est associée à des douleurs oculaires ou retro-orbitaire
E- Prédomine sur la vision centrale ou paracentrale

14- Le TRT de première intension dans la dermatomyosite et la polymyosite repose sur:

A- Les corticoïdes.
B- Les immunosuppresseurs
C- Les corticoïdes et les immunosuppresseurs.
D- Les immunoglobulines
E- Les échanges plasmatiques

Q15 - La dystrophie myotonique de Steinert:

A- Est de transmission autosomique dominante.
B- Est de transmission autosomique récessive
C- Est secondaire à une amplification d'un triplet CTG
D- Ne s'accompagne jamais d'atteinte cardiaque.
E- Le déficit moteur est de topographie proximale.
Ne s'accompagne d'une cataracte

Q16- Quelle sont les lésions anatomopathologique caractéristiques observées sur la biopsie musculaire au cours de la dermatomyosite.

A- Présence d'une nécrose musculaire
B- Infiltrat inflammatoire
C- Dégénérescence graisseuse
D- Nécrose capillaire
E- Présence d'inclusions intra cytoplasmiques [illegible]

Q17- La myopathie de Duchenne de Boulogne est de transmission:

A. Autosomique récessive
B. Autosomique dominante
C. Récessive liée a l'X
D. Dominante liée a l'X
E. De transmission maternelle

Q18 – le traitement de la poussée au cours de la sclérose en plaques repose sur :

A- Un bolus de methyl prédnisolone à la posologie de 1g /j par voie IV pendant 3 jours
B- Les immunomodulateurs type interféron Beta 1a
C- Les immunomodulateurs type interféron Beta 1b
D- Les immunosuppresseurs
E- Les corticoïdes au long cours par voie orale

Q 19 – au cours de l'ataxie de Friedreich :

A- Les réflexes tendineux aux membres inférieurs sont habituellement abolis
B- Les réflexes tendineux aux membres inférieurs sont les plus souvents vifs
C- Le taux serique de la vitamine E est effondré
D- On peut observer une atrophie optique au cours de l'évolution
E- Un trouble de la repolarisation (inversion de l'onde T) à l'ECG est souvent observé

Q20 – les critères d'exclusion de la maladie de parkinson sont

A- Un syndrome parkinsonien akinéto-rigide bilatéral et asymétrique
B- Un syndrome parkinsonien tremblant bilatéral et asymétrique
C- Un syndrome parkinsonien ne repondant pas sous une dose suffisante de L-dopa
D- L'apparition d'une démence précoce
E- L'apparition de fluctuations motrices au cours de l'évolution de la maladie

Q21- le traitement de la maladie parkinson repose sur :

A- De fortes doses de L- dopa associée toujours à des agonistes dopaminergiques
B- Les anticholinergiques dans les formes akinéto- rigides
C- La L- dopa dans les formes akinéto-rigides est tremblantes
D- Les inhibiteurs de la COMT associés à la L- dopa de ces formes akinéto-rigides
E- Les anticholinéstérasiques associés à la L- dopa.

Q22- Le syndrome de Guillain Barré peut être précédé de :

A- Un syndrome inféctieux des voies aeriennes supérieures
B- Des douleurs lombaires fixes
C- Des myalgies transitoires
D- Des céphalées diffuses
E- Une vaccination post rabique

Q23- le diagnostic positif du syndrome de Guillain Barré repose sur :

A- La dissociation albumino cytologique présente dés les 1er signes de la maladie
B- La présence de bandes oligoclonales à IgG
C- La démyélinisation à l'EMG précoce et multifocale
D- L'évolution ascendante du déficit neurogène périphérique
E- Une atteinte oculo motrice

Q24- Quel sont les critères indispensables pour le diagnostic d'un accident ischémique transitoire ?

A- Durée des signes neurologiques inférieure à 1 heure

B- Durée des signes neurologiques inférieurs à 24 heures

C- Absence de preuve d'infarctus aigu à l'imagerie

D- installation des signes neurologiques sur plus de 04 minutes

E- présence d'une hypodensité spontanée à la TDM cérébrale

Q25 – Quel est le traitement d'un accident cérébral ischémique constitué à sa phase aigue ?

A- 100mg d'aspirine par voie orale
B- Héparinothérapie
C- Anti vitamine K
D- Fibrinolytiques en IV
E- Association d'une héparinothérapie et d'anti vitamine K

Q26- Quel est le délai à respecter pour la thrombolyse par rtPA (recombinan tissular plasminogène active) ?

A- L'administrer avant 08h
B- L'administrer avant 06h
C- Supérieur à 12h
D- Supérieur à 24 h
E- Inférieur à 4h30

Q27-Quel sont les moyens de surveillance pour détecter et confirmer un vasospasme chez un patient qui présente une hémorragie méningée ?

A- Examen neurologique répété
B- IRM encéphalique
C- Doppler des artères cervicales
D- Angio IRM
E- La prise régulière de la tension artérielle

Q28- le diagnostic de la migraine selon les critères del'IHS est:

A- clinique
B-paraclinique
C- clinique et paraclinique
D- difficile
E- facile

Q29- dans la SLA l'ENMG montre une atteinte de :

A- racines
B- plexus
C- corne antérieure
D- défibres sensitives
E- myéline

Q30- l'accès migraineux dure sans traitement:

A- une heure
B- quelques minutes
C- quatre à soixante douze heures
D-quinze jours
E-trente jours

	1ere Rotation NERUO	2eme Rotation NEURO	3eme Rotation NEURO	4eme Rotation NEURO
1	ACE	A	BDE	BDE
2	AB	C	CE	BD
3	ACDE	BCD	BD	A
4	BE	ADE	BDE	CD
5	ABE	ACE	ABC	C
6	E	AD	BD	BCE
7	ACDE	BDE	AC	CD
8	BD	C	ADE	BCDE
9	BE	AD	BE	B
10	BC	BE	AB	C
11	C	ABE	ABC	A
12	AC	BE	BE	BD
13	ADE	AE	BD	ACD
14	A	A	B	ACD
15	AC	ACE	D	ACD
16	ABC	BC	BC	A
17	C	A	B	BCD
18	A	CD	ABC	ACE
19	ADE	C	D	ABCD
20	CD	BE	CDE	ABCE
21	CD	CDE	ADE	B
22	AE	DE	A	B
23	D	BD	BCE	AD
24	AC	A	ACE	BC
25	D	CD	C	BCE
26	E	AE	BD	BD
27	AD	B	ABCDE	A
28	A	BDE	AB	ABCD
29	C	BC	AE	AB
30	C	D	BE	AE
31	BDE	ACDE	CE	C
32	D	C	C	BE
33	E	ACDE	C	E
34	CE	ACE	BE	BE
35	BCDE	BE	ABCDE	B
36	BD	BE	BC	C
37	D	CE	B	ACE
38	C	A	AD	C
39	CE	B	ABE	DE
40	B	A	CD	CD