

1/ la luxation congénitale de la hanche est traitée à la naissance par :

- d- culote d'abduction
- e- langage en abduction

D E

2/ dans la luxation congénitale de la hanche, la radiographie du bassin est indiquée :

- c- à partir de 04 mois
- d- chez le nourrisson marchant
- e- chez le grand enfant

C D E

3/ Une arthrite aiguë de hanche chez un nourrisson de 18 mois :

- A- Se manifeste par une boiterie douloureuse suite à un traumatisme banal.
- E- Peut se propager en métaphysaire par l'intermédiaire de la synoviale.

A E

4/ une fracture de la pince bimalléolaire:

- C- Génératrice de troubles trophiques.
- D- Peut se compliquer d'un accident thrombo-embolique

C D

5/ Le traitement d'une fracture ouverte de jambe :

- A. Doit être instauré en urgence
- B. Doit éviter l'infection, couvrir le foyer de fracture et stabiliser l'os
- C. Doit comporter une prophylaxie anti tétanique
- E- Le parage chirurgical doit se faire dans les conditions d'asepsie rigoureuse.

A B C E

6/ Dans les fractures ouvertes de jambe :

- A. Le trait de fracture est spiroïde lors d'un mécanisme indirect
- B. les lésions des parties molles sont plus fréquentes lors d'un mécanisme direct

A B

7/ Quelles sont les complications tardives des fractures de l'avant-bras :

- A- le déplacement secondaire.
- B- Syndrome de Volkmann.
- C- Pseudarthrose.
- D- Cal vicieux.
- E- Synostoses radio-ulnaire.

C D E

8/ concernant les fractures bimalléolaires

- A - sont des fractures articulaires
- D -peuvent se compliquer l'algodystrophie

A D

9/ La classification de Cauchoix et Duparc dans les fractures ouvertes de jambe :

- b- Est basée sur l'ouverture cutanée
- d- Est basée sur les lésions vasculaires
- e- Est basée sur les lésions vasculaires et nerveuses

B D E

10/ Le diagnostic d'une luxation congénitale de hanche à la naissance est permis par le constat lors de l'examen clinique :

- b- D'un ressaut de réduction de la tête fémorale

B

11/ Lors d'un mouvement de défense, un individu reçoit un coup sur l'avant-bras. Le diagnostic de fracture de Monteggia est posé. Cela signifie pour vous:

- C. une fracture du cubitus avec luxation de la tête du radius

C

12/ Toutes les affirmations concernant Le syndrome de loge sont vraies, SAUF UNE. Laquelle ?

C. ne sera diagnostiqué que si le pouls artériel de la loge a disparu  
C

13/ A propos des fractures ouvertes, toutes les affirmations suivantes sont vraies, SAUF UNE. Laquelle ?

E. L'embolie graisseuse est plus fréquente dans les fractures ouvertes.  
E

14/ Les fractures de l'enfant sont fréquentes. Quelle est l'affirmation fausse ?

C. se compliquent souvent de pseudarthrose  
C

15/ Les complications précoces des fractures du fémur chez l'adulte sont :

C- Les complications thrombo emboliques.  
E- L'état de choc.

C E

16/ l'exploration radiographique d'un segment diaphysaire fracturé:

A- Comprend au minimum une incidence de face et une incidence de profil  
E- Doit contenir les articulations sous et sus jacentes

A E

17/ La fracture articulaire:

A- Nécessite obligatoirement une réduction anatomique  
D- Expose à l'arthrose

E- Expose à la raideur

A D E

18/ les complications d'une immobilisation plâtré d'une fracture de la jambe :

A. Syndrome des loges

B. Phlébite

C. Escarre cutanée

D. Déplacement secondaire

A B C D

19/ quels sont les signes qui vous orienter à une embolie graisseuse lors d'une fracture de la diaphyse fémorale

A. Détresse respiratoire

B. Syndrome de confusion mentale

C. Pétéchies sur le corps

A B C

20/ Quelles sont les avantages d'un traitement orthopédique par plâtre ?

A. Diminution du risque infectieux

B. Absence d'ouverture du foyer de fracture

C. Respect de l'hématome fracturaire

E. Pas d'ablation de matériel d'ostéosynthèse

A B C E