

- 01/ Quelles sont les avantages d'un traitement orthopédique par plâtre ?
- Diminution du risque infectieux
  - Absence d'ouverture du foyer de fracture
  - Respect de l'hématome fracturaire
  - Pas d'ablation de matériel d'ostéosynthèse
- 02/ les fractures élémentaire ou simple sont : (coche réponse Fausse)
- c- fracture en "T"
- 03/ Une chute latérale de même côté d'un pied bloqué en abduction peut entraîner :
- Une fracture bimalléolaire type I selon DUPARC ALNOT
  - Une fracture isolée de la malléole externe
  - L'équivalent d'une fracture bimalléolaire
- 04/ Les complications de fracture ouverte de jambe stabilisée par un fixateur externe sont :
- La thrombophlébite
  - Les raideurs articulaires
  - Le syndrome de loge
  - La pseudarthrose de jambe septique ou aseptique
- 05/ le dépistage de la luxation congénitale de la hanche :
- est basé sur l'examen clinique à la naissance
  - est facilité par l'échographie des hanches à la naissance
  - impose la répétition de l'examen clinique complété si nécessaire par une échographie à J30
- 06/ la fracture de GERARD – MARCHANT est une
- fracture par compression extension
  - fracture à bascule postérieure et translation externe et détachement de la styloïde cubitale
- 07/ L'examen clinique en médecine physique et réadaptation contient :
- Un Bilan fonctionnel
  - Un Bilan cutanéotrophique
  - Un Bilan neuro-musculaire
  - Un Bilan articulaire
- 08/ Une arthrite aiguë de hanche chez un nourrisson de 07mois :
- Peut se propager en métaphysaire à travers le cartilage de croissance.
  - Peut se propager en métaphysaire par l'intermédiaire de la synoviale articulaire.
- 09/ Le syndrome de loge :
- Peut s'observer aussi bien au membre supérieur qu'au membre inférieur.
  - Peut-être consécutif à une diminution du volume de la loge ou à une augmentation de son contenu
  - Se traduit par une douleur croissante, augmentée par l'étirement du muscle ischémie.
- 10/ La classification de POWELS des fractures du col du fémur utilise comme critère :
- La direction de trait
- 11/ les fracture articulaires :
- Se compliquent souvent d'arthrose
  - Nécessitent une réduction anatomique
  - Exposent l'articulation à la raideur
- 12/ Parmi les complications précoces d'une immobilisation plâtrée on trouve :
- Thrombose veineuse profonde
  - Syndrome des loges
  - Déplacement sous plâtre
- 13/ Dans les fractures ouvertes :
- Le pronostic est dominé par le risque infectieux
  - le fixateur externe est un moyen d'ostéosynthèse utilisable dans ces fractures
- 14/ Une tumeur bénigne se caractérise par :
- L'absence d'envahissement des parties molles
  - La petite taille de la lésion
  - L'intégrité des corticales
- 15/ Le but du traitement de la fracture du col fémoral chez l'adulte jeune est :
- Reduction anatomique de la fracture
  - Réinsertion socio professionnelle
  - Obtenir la consolidation
- 16/ La traduction pratique de l'index radio cubital inférieur :
- le cubitus est plus court que le radius
  - correspond à l'épaisseur du ligament triangulaire
- 17/ l'exploration radiographique d'un segment diaphysaire fracturé :
- Comprend au minimum, une incidence de face et une incidence de profil
  - Doit contenir les articulations sous et sus jacentes
- 18/ Quelles sont les complications précoces (48H) au niveau d'un plâtre circulaire pour fracture diaphysaire fermée ?
- Syndrome des loges
  - Phlébite
  - Embolie graisseuse
  - Déplacement secondaire
- 19/ parmi les types de plâtres suivants lequel n'est pas un plâtre du membre inférieur :
- plâtre DUJARRIER
- 20/ Au cours de la surveillance d'un plâtre, quels sont les signes alarmants ?
- Sensation de chaleur et de strictions
  - Peau violacée
  - Fourmillements et extrémités froides