

- 1/ La classification de Cauchoix et Duparc dans les fractures ouvertes de jambe :
E. Est basée sur l'ouverture cutanée.
- 2/ Devant une déviation vertébrale, quels sont les éléments permettant d'affirmer qu'il s'agit d'une scoliose :
B. Présence d'une gibbosité
E. Rotation des corps vertébraux sur une radiographie de face.
- 3/ Dans l'anatomie des deux os de l'avant bras :
A- Le radius n'est pas rectiligne, qui présente deux courbures, vue de face
E- La membrane interosseuse est une membrane constante, qui joue un rôle important dans la Prono-supination.
- 4/ Dans les fractures de la palette humérale de l'enfant :
E- Le mécanisme le plus fréquemment retrouvé est une chute sur la paume de la main.
- 5/ dans le dépistage de la luxation congénitale de la hanche, quels sont parmi les facteurs de risque majeurs ?
A- antécédent familial de luxation congénitale de la hanche.
D- sexe féminin.
E- présentation de siège.
- 6/ Les fractures bimalleolaires :
B- Intéresse la pince malléolaire.
C- Urgence de prise en charge
D- Le mécanisme lésionnel le plus fréquent est La rotation externe.
E- Menace le devenir fonctionnel du membre inférieur.
- 7/ Dans les fractures du scaphoïde carpien, le type IV selon la classification de SCHERNBERG correspond à une :
C- Fracture transtuberostaire
- 8/ Une scoliose est définie par :
D- Une déformation dans les trois plans de l'espace.
- 9/ dans la luxation congénitale de la hanche la construction d'OMBREDANNE sur la radiographie :
A- permet le diagnostic après 06 mois.
B- aide au diagnostic à partir de 04 mois.
D- n'est pas nécessaire après l'âge de la marche.
- 10/ Une fracture de la rotule
A- Se prête à un traitement chirurgical par hauban
B- Est une fracture instable.
C- Affecte l'extension du genou.
- 11/ Lors du traitement orthopédique :
A- Le risque infectieux est réduit
C- Peut-être utilisé seul ou après réduction
- 12/ Le cotyle est constitué de :
E- Aile iliaque **12 → ABCD**
- 13/ les fractures élémentaire ou simple sont :
B- fracture de la paroi antérieure
C- fracture de la colonne postérieure
D- fractures à trait transversale
E- fracture de la paroi Postérieur.
- 14/ les lésions ligamentaires du genou
B -toute lésions de ligament latérale externe est une entorse grave
C -sont fréquentes dans les sports à pivot
D -peuvent se compliquer d'une luxation du genou
E -une rupture complète d'un ligament est une entorse grave
- 15/ Le traitement d'une fracture ouverte de jambe :
B-Doit être instauré en urgence
C-Doit éviter l'infection, couvrir le foyer de fracture et stabiliser l'os
D-Doit comporter une prophylaxie anti tétanique
E-Le parage chirurgical doit se faire dans les conditions d'asepsie rigoureuse.
- 16/ la classification de POWELS est basée sur :
B- le type du trait.
- 17/ La pseudarthrose :
B- Est la non consolidation du foyer de fracture après avoir dépassé les délais de consolidation
E- Ne peut être traitée que chirurgicalement
- 18/ les fracture articulaires:
A- Se compliquent souvent d'arthrose
B- Nécessitent une réduction anatomique
C- Exposent l'articulation à la raideur
- 19/ Le but du traitement de la fracture du col fémoral chez l'adulte jeune est :
B- Réduction anatomique de la fracture
D- Réinsertion socio professionnelle
E- Obtenir la consolidation
- 20/ Une tumeur bénigne se caractérise par :
A- Les limites floues sans liseré de condensation périphérique
D- L'existence d'une réaction périostée **20 → BCE**