

L 02/09/2013

1) Les fractures du calcaneum sont :

- A. Très souvent extra articulaires
- B. Leur traitement est exclusivement chirurgical
- C. Peuvent se compliquer de pseudarthrose
- D. Leur évolution est trainante
- E. La TDM n'est pas indispensable

2) la paralysie obstétricale du plexus brachial :

- A. Est d'origine congénitale
- B. Survient lors de l'expulsion
- C. Est souvent due à une dystocie des épaules
- D. Est presque toujours une neurapraxie
- E. Son traitement est toujours chirurgical

3) Au niveau de la main, les germes se développent préférentiellement au niveau :

- A. De l'ongle
- B. Du dos la main
- C. Des commissures
- D. De la paume
- E. Des plis

4) Un homme de 45 ans présente, après un accident de la voie publique, une fracture complexe des 02 os de la jambe ouverte de type III sans lésion vasculo-nerveuse, le traitement doit comporter :

- A- Traction extension continue.
- B- Plâtre ferme cruro-pédieux.
- C- Ostéosynthèse par plaque vissée.
- D- Enclouage centromédullaire verrouillé.
- E- Parage et fixateur externe.

5) L'orthèse est un appareil qui vise à :

- A. Suppléer une fonction déficiente
- B. Faciliter le déplacement du patient
- C. Remplacer un segment du membre manquant
- D. Corriger une déformation
- E. Stabiliser une articulation

6) Le bilan en rééducation fonctionnelle a pour but :

- A. Etablir les techniques utilisées dans le traitement
- B. Définir les objectifs de rééducation fonctionnelle
- C. Donner le traitement médical nécessaire
- D. Instaurer une réinsertion socioprofessionnelle
- E. Prescrire le type d'appareillage nécessaire

7) Le syndrome de Volkmann :

- A. Est d'origine ischémique
- B. Se traduit par une extension douloureuse des doigts.
- C. Atteint en premier les muscles extenseurs.
- D. Il peut survenir après traitement chirurgical.
- E. Survient souvent après fractures supra condylienne de l'humérus chez l'enfant.

8) Une paralysie du plexus obstétricale du plexus brachial est fortement suspectée cliniquement sur :

- A. L'existence d'un membre supérieur flasque
- B. L'existence d'une luxation congénitale de la hanche
- C. L'existence d'une mydriase
- D. L'existence d'une fracture du radius
- E. L'électromyographie

9) La classification de DUPARC-ALNOT classe les fractures malléolaires selon :

- A. la position de la cheville lors du traumatisme.
- B. la forme du trait de fracture sur la malléole interne.
- C. le siège du trait de fracture sur la malléole externe par rapport au TPI.
- D. l'intégrité ou non de la membrane interosseuse.
- E. selon le trait au niveau diaphysaire tibial.

10) Devant une déviation vertébrale, quels sont les éléments permettant d'affirmer qu'il s'agit d'une scoliose.

- A- Douleurs vertébrales
- B- Présence d'une gibbosité
- C- Correction de la déformation en antéflexion du tronc
- D- Egalité des membres inférieurs
- E- Rotation des corps vertébraux sur une RX de face

11) Une attitude scoliotique est caractérisée par :

- A. Absence de gibbosité avec présence d'une rotation vertébrale
- B. Présence de gibbosité avec absence rotation vertébrale.
- C. Présence d'une gibbosité et d'une rotation vertébrale.
- D. Absence de gibbosité et de rotation vertébrale.
- E. Aucune réponse n'est juste.

12) une chute laterale du meme cote avec pied bloqué en adduction entraîne:

- A. fracture a trait oblique de la malleole interne et transversal de la malleole externe
- B. fracture bimalleolaire avec diastasis tibio-peronier vrai
- C. fracture isolée de la malleole interne
- D. Fracture de maisonneuve
- E. fracture Intertuberculaire

13) les aides techniques sont des appareils:

- A. lies en permanence avec le corps
- B. permettent de remplacer un segment de member
- C. adjuvant important en reeducation fonctionnelle
- D. facilitent le déplacement
- E. corrigent les attitudes viscieuses des membres

14) parmi les fractures suivantes quelles sont celle qui sont dites instables

- A. fracture en « bois vert »
- B. fractures spiroïdes
- C. fractures en cheveux
- D. fractures engrainée
- E. fractures transversales

15) la courbure physiologique du rachis dorsal est :

- A. une scoliose
- B. une lordose
- C. une cyphose
- D. hyperlordose
- E. une inflexion latérale

Cher Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

N°	Rép.
1	D
2	BC
3	CDE
4	E
5	ADE
6	AB
7	ABDE
8	A
9	C
10	BE
11	D
12	A
13	CD
14	B
15	C
16	D
17	C
18	B
19	AE
20	A

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chale
Copy Service