

Epreuve théorique

1. L'anxiété (cocher la réponse juste)

- a) S'accompagne d'un trouble de la perception
- b) La crainte injustifiée d'un objet ou d'une situation particulière
- c) S'exprime souvent par des idées de suicide
- d) Est toujours pathologique
- e) Est une crainte anticipée d'un danger ou d'un malheur à venir

2. L'anxiété de séparation : (cocher la réponse juste)

- a) L'anxiété qui se manifeste chez les couples qui se séparent
- b) L'anxiété de la mère au moment de l'accouchement (défiance)
- c) Est une détresse excessive chez l'enfant lorsqu'il s'éloigne de ses parents
- d) S'exprime souvent par l'idée obsédante de quitter la famille
- e) Est une anxiété chez l'enfant que ses parents ne se séparent

3. L'agoraphobie est (cocher la réponse juste)

- a) La crainte de consommer des produits agricoles contenant des pesticides
- b) La crainte de consommer de la viande congelée
- c) La crainte de grands animaux non dangereux
- d) La crainte de se retrouver dans des endroits où situations d'où il serait difficile de s'échapper
- e) La crainte d'être atteint par la foudre lors d'un orage

4. Le conflit psychique naît de : (cocher la réponse juste)

- a) L'opposition entre la sphère intellectuelle et celle du fonctionnement
- b) L'opposition entre les parents
- c) L'opposition entre les désirs, les pulsions et les règles, et s'oppose à leur réalisation +
- d) La volonté d'indépendance de l'enfant et le désir de contrôle des parents
- e) Les devoirs et la réalité

5. L'adolescence : (cocher la réponse fautive)

- a) Débute à la puberté
- b) Caractérisée par un développement psychologique et un développement somatique rapide
- c) La période de transition entre l'enfance et l'âge adulte
- d) Caractérisée par le mode de pensée opératoire +
- e) Est une période de fragilité psychologique et de comportement à risque

6. Les anxiolytiques : (cocher la réponse fautive)

- a) Indiquent uniquement une dépendance psychique +
- b) Sont utilisés pour leur action sédatrice et myorélexante
- c) Leur arrêt entraîne un syndrome de sevrage
- d) Leur utilisation au long cours peut altérer la mémoire et la libido
- e) Les molécules les plus utilisées sont celles à vitesse d'action rapide

7. Les opioïdes : (cocher la réponse fautive)

- a) Sont des stimulants du système nerveux central
- b) Ont un syndrome de sevrage sévère
- c) Entraînent une altération de la perception avec hallucinations
- d) Ont des effets de tolérance et de dépendance physique importants
- e) Sont euphorisants, apaisants, analgésiques puissants

8. Le cannabis : (cocher la réponse fautive)

- a) C'est la drogue la plus utilisée dans le monde dérivée du chanvre indien
- b) Le principe actif est constitué par le tétrahydrocannabinol
- c) Ses effets immédiats sont constitués par une sensation d'euphorie, diminution de l'inhibition et de la tension psychique, augmentation de la sociabilité, une distorsion des perceptions
- d) Provoque plus une dépendance physique que psychique
- e) Les effets à long terme sont la diminution de la mémoire, l'agressivité, et quelquefois des troubles de la perception

Epreuve théorique

9. Le sommeil paradoxal :

- a) Constitue 80% de la totalité du sommeil
- b) Il est périodique toutes les 90 minutes
- c) Constitue un état de somnolence c'est le refuge dans le sommeil
- d) Caractérisé par des secousses musculaires
- e) Appelé aussi REM (rapide eye movement)

10. Les dysonies sont des troubles du sommeil caractérisés par :

- a) Des perturbations de la qualité du sommeil
- b) Des troubles qui font intrusion pendant le sommeil
- c) Des troubles qui ne sont pas reconnus par le malade
- d) Des perturbations de l'horaire du sommeil
- e) Une difficulté du maintien du sommeil

11. Tous ces symptômes sont retrouvés dans les états dépressifs sauf en

- a) Une tristesse profonde et durable
- b) Des troubles de l'alimentation
- c) Des troubles de la sexualité
- d) Une excitation psychomotrice**
- e) Des troubles du sommeil

12. Toutes ces molécules peuvent être utilisées dans le traitement d'un état dépressif modéré

- a) Clomipramine (Anafranil) *antidépresseur*
- b) Miansérine (Aplymil)
- c) Paroxétine (lieroxat)
- d) Amitripride (solfax) - antidépresseur**
- e) Sertraline (zoloft)

13. Les psychoses sont :

- a) Des maladies mineures de la personnalité
- b) Peuvent être caractérisées par des idées chaotiques et en contradiction avec la réalité**
- c) Des maladies majeures de la personnalité**
- d) Le sujet est inconscient de ses troubles**
- e) Le sujet est conscient de sa maladie

14. Les névroses sont caractérisées par :

- a) L'existence d'idées délirantes
- b) Un trouble de la personnalité**
- c) L'existence d'un conflit intrapsychique inconscient** ??
- d) La présence de l'angoisse ou de l'anxiété**
- e) La présence de phénomènes hallucinatoires

15. La somatothérapie est indiquée dans : *(avec déliré)*

- a) L'attaque de panique
- b) La mélancolie grave**
- c) Dans la psychose hallucinatoire chronique
- d) La catatonie** *frigi - mutisme*
- e) L'épilepsie

16. La complication majeure des neuroleptiques est :

- a) Un coma
- b) Une sécheresse de la bouche
- c) Une anorexie
- d) Un syndrome malin** +
- e) Une anxiété

paranoïa: déliré ++

schizophrénie dépressive
 déliré dépressif ; paranoïa
 déliré

5x
 - décompensation affective
 - désinvestissement
 - Hs déliré incohérent

Epreuve théorique

17. Parmi les médicaments suivants quels sont ceux qui font partie des anticoagulants :

- a) Haldol
- b) Tencista +
- c) Transone
- d) Noxiain
- e) Anafranil +

18. Les hormonogulateurs sont indiqués dans : *regulateur hormonal*

- a) Le traitement de la névrose
- b) La schizophrénie paranoïde
- c) L'accès maniaque +
- d) La psychose maniaque-dépressive (trouble bipolaire)
- e) L'état limite

19. Le délicé onirique est retrouvé dans : (cocher la réponse juste)

- a) La schizophrénie
- b) L'oligophtalmie
- c) La dépression
- d) La confusion mentale
- e) L'accès maniaque

Confusion mentale

20. L'automatisme psychomoteur est retrouvé dans : (cocher la réponse juste)

- a) La confusion mentale
- b) L'épilepsie +
- c) La schizophrénie -
- d) La sclérose en plaques
- e) L'hyperthyroïdie

21. L'IMR cérébrale est souvent négative dans :

- a) L'hématome sous-dural
- b) L'accident vasculaire cérébral
- c) Les tumeurs cérébrales
- d) Le syndrome subyectif post-commotionnel
- e) Les malformations artério-veineuses

22. Les troubles mentaux des myasthéniques se manifestent par tous ces symptômes sauf un lequel :

- a) Inhibition psychomotrice
- b) Etats confusionnels
- c) Tachypsychie ✓
- d) Etat dépressif
- e) Hétéroïde

23. La dissociation d'un malade psychotique peut être dirigée contre :

- a) La soi-même +
- b) Le personnage -
- c) La famille -
- d) L'entourage professionnel +
- e) Soi-même +

24. Le suicide chez le malade psychotique est :

- a) Une vengeance *✓*
- b) Un chantage
- c) La conséquence d'un délire -
- d) La conséquence d'une dépression -
- e) La conséquence au vécu morbide du traumatisme -

25. Les récidives de la justice sont :

- a) Des psychotiques
- b) Des psychopathes *+*
- c) Des sociopathes *+*
- d) Des névrosés
- e) Des amnésés mentaux

26. Les conditions de vie difficiles du schizophrène le poussent :

- a) Au crime
- b) Au travail
- c) Au trafic de drogue
- d) Au suicide -
- e) A l'émigration

27. Lequel de ces symptômes ne fait pas partie des symptômes positifs de la schizophrénie

- a) Parie d'entendre - *+* *✓*
- b) Idées délirantes
- c) Hallucinations
- d) *Paranoïa* *+* *✓*
- e) Parole désorganisée -

28. La forme catatonique de la schizophrénie se traduit par :

- a) Un hypercatatonisme et une cataplexie *✓*
- b) Des troubles de l'affectivité et de l'humeur
- c) Un syndrome de discordance intellectuel
- d) Une symptomatologie délirante et hallucinatoire
- e) Une personnalité schizoïde et pas de délire

29. La dissociation comportementale se traduit par (une seule réponse juste)

- a) Une stéréotypie, manérialisme et yeux immotivés -
- b) Un saut du coq à l'âne et une pensée floue
- c) Un padding mental et une schizophrénie *partie de l'idée*
- d) Une ambivalence affective et un désintérêt
- e) Une paranoïa et un autisme

30. Dans les formes de début lent et progressif de la schizophrénie, on peut avoir les signes suivants : (une seule réponse juste)

- a) Sujet froid et distant *+*
- b) Symptomatologie obsessionnelle
- c) Hallucinations
- d) Troubles du comportement
- e) Baisse de rendement

Epreuve pratique

Monsieur K, âgé d'une vingtaine d'années est conduit monotté aux urgences de votre hôpital par la police, ce dernier a été interpellé alors qu'il déambulait au dans les rayons d'un grand magasin, il agressait verbalement les vendeuses du rayon parfumerie, les contraignant à ouvrir les flacons de parfum pour ensuite s'en asperger le corps. Dans un grand désordre, il les accusait de vouloir l'empêcher de se parfumer et d'être ainsi responsables de la pire des catastrophes humanitaires.

M K, hurle et vous supplie de le laisser continuer sa mission, son visage exprime de l'angoisse puis il laisse soudainement exploser un fou rire que vous ne comprenez pas ; puis il se calme et vous explique qu'il est là pour parfumer les hommes et les libérer de Satan : « écoutez Dieu, il vous parle, il m'ordonne d'accomplir ma mission. ».

Après un silence ininterrompu de quelques secondes, il se tourne vers vous, et vous accuse d'être complice avec la police et de vouloir lui planter des électrodes dans ses cerveaux pour le séquestrer.

Il s'agit du premier épisode de ce type. Il n'a aucun antécédent psychiatrique particulier, bien inséré socialement il est même étudiant en biologie, bien orienté dans le temps et dans l'espace.

L'examen somatique est normal, sans aucun antécédent médico-chirurgical.

31. Quels sont les symptômes que vous remarquez :
- Une agitation psychomotrice
 - Une activité délirante
 - Une activité hallucinatoire
 - Un autostéréisme mental
 - Une hétéro agressivité
32. Quel est (le) ou les diagnostics (de) ou les plus probables :
- Schizophrénie paranoïde
 - Accès maniaque
 - Bouffée délirante
 - Catatonie
 - Aréole psychotique aiguë liée à une prise de drogue
33. Quel bilan devez-vous réaliser au minimum immédiatement :
- Glycémie + FNS + ionogramme + recherche toxicologique
 - Glycémie + FNS + ionogramme
 - TDM cérébral
 - Hémoculture
 - Sérologie
34. Les examens biologiques demandés en urgence sont revenus négatifs, quel est le diagnostic le plus probable :
- Une bouffée délirante
 - Un moment fécond d'une schizophrénie paranoïde
 - Une confusion mentale
 - Un moment fécond d'une psychose hallucinatoire chronique
 - Un trouble du comportement chez un oligophrénie

35. Quels sont les thèmes délirants :
- a) Délire de persécution
 - b) Délire Hypochondriaque
 - c) Délire Mystique
 - d) Délire mégalomaniac
 - e) Délire de jalousie
36. Quel est votre conduite immédiate :
- a) Donner un bilan en ambulatoire
 - b) Donner un traitement en ambulatoire
 - c) Hospitaliser le malade
 - d) L'orienter vers une consultation de neurologie
 - e) Lui faire une injection puis le courayer avec la police
37. Quel traitement proposez-vous :
- a) Neuroleptique atypique
 - b) Thyrostatique
 - c) Neuroleptique sédatif
 - d) Neuroleptique à libération prolongée
 - e) Neuroleptique désinhibiteur
38. Quels sont les médicaments préconisés :
- a) Risperidol comprimé
 - b) Modécate injectable
 - c) Halopéridol/mazine injectables
 - d) Solian comprimé
 - e) Dogranil comprimé
39. Quelle est la durée du traitement la plus probable :
- a) 01 mois
 - b) 06mois
 - c) 02ans
 - d) 05ans
 - e) A vie
40. Est-ce qu'un neuroleptique à libération prolongé a son indication :
- a) Oui, courte durée
 - b) Non
 - c) Pendant 06mois
 - d) Pendant 02ans
 - e) A vie



aff. ch. age

Département de Médecine de Constantine - Epreuve de Psychiatrie - A5 - R1 - *22.06.14*f.z*

Date de l'épreuve : 25/06/2014

Page 1/1

Corrigé Type

Barème uniforme : 0.5 point(s) par question

N°	Rép.
1	E
2	C
3	D
4	C
5	D
6	A
7	A
8	D
9	BE
10	ACE
11	D
12	D
13	BCD
14	BCD
15	BD
16	D
17	BC
18	CD
19	D
20	B
21	D
22	C
23	ABCD
24	CDE
25	BC
26	D
27	A
28	A
29	A
30	A
31	ABCDE
32	CE
33	A
34	A
35	ACD
36	C

N°	Rép.
37	AC
38	C
39	C
40	B

INSTITUT
2014

Handwritten signature