

1. Le critère principal du délire paranoïaque est :
 - a) la présence d'idées délirantes non bizarres et systématisées.
 - b) la présence d'idées délirantes bizarres et systématisées
 - c) la présence d'idées délirantes bizarres et non systématisées
 - d) la présence d'idées délirantes non bizarres et non systématisées
 - e) la présence d'idées délirantes bizarres et mal systématisées
2. la Personnalité paranoïaque est caractérisée par :
 - a) L'orgueil
 - b) La méfiance
 - c) La tendance au repli
 - d) La psychorigidité
 - e) La fausseté de jugement.
3. Le trouble démentiel est :
 - a) Un trouble congénital de plusieurs fonctions intellectuelles
 - b) Un trouble congénital de la sphère affective
 - c) Un trouble acquis de plusieurs fonctions intellectuelles.
 - d) un trouble exclusivement du à la sénescence
 - e) -comporte un syndrome dissociatif
4. le trouble démentiel
 - a) peut-être réversible et curable
 - b) associe une désorientation temporo-spatiale
 - c) est secondaire à des causes dégénératives
 - d) est toujours représenté par la maladie d'Alzheimer
 - e) présence d'hallucinations psychiques
5. La clinique d'un syndrome démentiel comporte :
 - a) une amnésie constante et précoce
 - b) une désorientation temporo-spatiale
 - c) des troubles du langage
 - d) une dissociation intellectuelle
 - e) des troubles du jugement
6. Les phacomatoses :
 - a) sont des affections dégénératives congénitales
 - b) sont des affections dégénératives acquises
 - c) sont des affections héréditaires et familiales
 - d) touchent les dérivés de l'ectoderme
 - e) s'accompagnent de syndrome délirant
7. la complication majeure des neuroleptiques est :
 - a) Un coma
 - b) Une sécheresse de la bouche
 - c) Une anorexie
 - d) Un syndrome malin
 - e) Une anxiété

8. parmi les médicaments suivants, quels sont ceux qui font partie des anxiolytiques :
- a) HALDOL
 - b) TEMESTA
 - c) TRANXENE
 - d) NOZINAN
 - e) ANAFRANIL
9. Quelle est la forme de la schizophrénie évoluant avec des éléments psychopathiques ?
- a) Hébéphrénie
 - b) Héboïdophrénie
 - c) Schizophrénie paranoïde
 - d) Hébéphréno-catatonie
 - e) Schizophrénie simple
10. Tous ces médicaments sont classiquement utilisés dans le traitement de la schizophrénie sauf un : lequel ?
- a) Haloperidol (Haldol)
 - b) Pipotiazine (Piportil)
 - c) Chlorpromazine (Largactil)
 - d) Diazépam (Valium)
 - e) Lévomépromazine (Nozinan).
11. L'enregistrement électro physiologique du sommeil comprend : _____
- a) Un stade
 - b) Deux stades
 - c) Trois stades
 - d) Quatre stades
 - e) Cinq stades
12. Les insomnies totales sont rencontrées lors :
- a) Les accès maniaques
 - b) Les troubles délirants
 - c) Les troubles confusionnels
 - d) Les troubles anxieux
 - e) Les dépressions réactionnelles
13. Les tumeurs frontales peuvent provoquer :
- a) un syndrome confusionnel progressif 2,4
 - 2 b) un syndrome démentiel
 - 3 c) un trouble bipolaire
 - 4 d) des signes neurologiques type grasping reflexe et anosmie
 - 5 e) uniquement des modifications de l'humeur et du caractère
- Réponse : A = 5 ; B = 1, 2, 3 ; C = 1, 2, 4 ; D = 1, 2 ; E = 3

14. une hyperthyroïdie peut se manifester par :
- 1 a) un état dépressif avec ralentissement psycho-moteur
 - 2 b) une anxiété avec irritabilité et insomnie
 - 3 c) une apathie avec prise de poids
 - 4 d) une instabilité avec amaigrissement
 - 5 e) des crises convulsives
- Réponse : A = 1, 3 ; B = 2, 4 ; C = 4, 5 ; D = 1 ; E = 2, 4, 5
15. Les produits psychodysléptiques sont :
- a) Les benzodiazépines.
 - b) Les tranquillisants.
 - c) Les opiacés.
 - d) Les morphiniques.
 - e) Les amphétamines.
16. L'état de manque à l'héroïne se traduit par :
- a) Une somnolence.
 - b) Une angoisse intense.
 - c) Un état de bien-être.
 - d) Des sueurs profuses.
 - e) Des troubles respiratoires graves.
17. Ces critères de dangerosité sont à rechercher sauf un ?
- a) La notion de toxicomanie
 - b) Les antécédents psychiatriques
 - c) -Le déplacement
 - d) Les antécédents judiciaires
 - e) La possession d'armes.
18. La dangerosité se manifeste dans toutes ces pathologies sauf une laquelle ?
- a) La schizophrénie.
 - b) L'épilepsie.
 - c) La bouffée délirante.
 - d) L'anxiété réactionnelle
 - e) La mélancolie
19. Le symptôme névrotique est considéré comme :
- a) Un trouble de simulation
 - b) Un trouble pour canaliser l'anxiété
 - c) Un trouble pour attirer l'attention
 - d) Un trouble existant en dehors de la maladie névrotique
 - e) Un mécanisme de transformation de la réalité
20. Dans les troubles névrotiques
- a) Une thérapeutique psychologique est associée à une chimiothérapie
 - b) Une prise en charge sociale n'est pas nécessaire
 - c) Les examens para-cliniques sont déconseillés
 - d) Un arrêt de travail prolongé est indiqué
 - e) Les psychotropes sont contre-indiqués

21. Le symptôme hystérique est considéré comme :
- a) Une phobie de la maladie
 - b) Une fuite des responsabilités
 - c) Un chantage
 - d) Fuite de la situation d'insécurité
 - e) Un trouble à investiguer sur le plan somatique
22. Quel est le signe pathognomonique de la confusion mentale :
- a) Troubles mnésique
 - b) L'expression du visage
 - c) La désorientation temporo-spatiale
 - d) L'onirisme
 - e) Le début brutal
23. La psychose puerpéral est caractérisée par :
- a) Accès psychotique qui survient 06mois après l'accouchement *la semaine*
 - b) Accès psychotique dont le délire est essentiellement centré sur l'enfant
 - c) Risque de désorientation temporo-spatiale
 - d) Une récurrence systematique lors de grossesses ultérieures *20%*
 - e) Un potentiel de dangerosité
24. La bouffée délirante est une psychose aiguë caractérisée par :
- a) Un délire riche, flou et mal systématisé
 - b) Une dépersonnalisation
 - c) Un délire opirique
 - d) La présence toujours d'un facteur déclenchant
 - e) Un syndrome d'automatisme mental

Cas clinique

Il s'agit d'un homme de 42ans, admis en psychiatrie la veille pour une tentative de suicide par phlébotomie ; il s'agit de sa troisième tentative de suicide.

La première par défenestration occasionnant des fractures aux membres inférieurs.

La deuxième par ingestion de médicament ayant nécessité son hospitalisation aux urgences médicales.

Le patient apparaît triste, abattu, négligent ses soins corporels, cependant au cours de l'entretien, on note de longs moments durant lesquels le patient semble s'adresser à d'autres personnes. Se lève de son siège puis s'assoit, il dit qu'il ne peut pas contrôler ses actes, qu'il existe une force extérieure qui le menace et le control.

Il dit aussi qu'il entend des personnes même si il se bouche les oreilles, qui disent des choses malveillantes, le concernant et qui en plus lui donnent des ordres, il pense que la seule façon de les fuir c'est de se tuer.

Le patient est connu des services de psychiatrie ou il a été hospitalisé à trois reprises.

Le début de ses troubles semble remonter à l'âge de 37ans et toutes ses hospitalisations sont dues à des rechutes suite à des arrêts thérapeutiques.

Questions :

- Pourquoi l'hospitalisation de ce patient était elle nécessaire
 - Parce qu'il s'agit d'une tentative de suicide par phlébotomie
 - Parce qu'il existe des antécédents de tentative de suicide
 - Parce qu'il existe une symptomatologie dépressive associée
 - Parce que c'est un psychotique
 - Parce que c'est un névrotiqueREP : A=5-3, B=1-2-5, C=4, D=3-5, **E=1-2-3-4**
- La cause principale de sa tentative de suicide peut être :
 - L'état dépressif
 - Les hallucinations
 - Le sentiment d'incurabilité
 - Le délire d'influence
 - L'agitation psychomotriceREP : A= 5, B=4, C=2-3-4, D=1, **E=1-2-3-4**
- Chez ce malade en trouve :
 - Un état dépressif
 - Un syndrome d'automatisme mental
 - Un délire d'influence
 - Un état maniaque
 - L'agitation psychomotriceREP : **A=1-2-3**, B=3-4, C=1-5, D=2-3-5, E=1-4
- Quel serait le meilleur traitement chez ce patient
 - Des antidépresseurs plus des anxiolytiques
 - Des anxiolytiques plus des antiépileptiques
 - Des neuroleptiques sédatifs
 - Des neuroleptiques incisifs
 - Des neuroleptiques sédatifs et incisifs en plus des antidépresseursREP/ **A=1**, B=1-2, C=3, D=2, **E=5**
- Chez ce patient ont peut évoquer le diagnostic suivant :
 - Une psychose hallucinatoire chronique → ~~MEC~~
 - une schizophrénie paranoïde
 - Une psychose manjaco-dépressive
 - Une bouffée délirante récidivante
 - Un trouble d'anxiété généraliséREP : A=1-5, **B=2**, C=5, D=2-4, E=1

Réponses : épreuve théorique

- 1 => A
- 2 => A,B,D,E
- 3 => C
- 4 => B,C
- 5 => A,B,C,E
- 6 => A,C,D
- 7 => D
- 8 => B,C
- 9 => B
- 10 => D
- 11 => E
- 12 => A,B,C
- 13 => C
- 14 => E
- 15 => C,D
- 16 => B,D,E
- 17 => C
- 18 => D
- 19 => B,D
- 20 => A
- 21 => B,D,E
- 22 => C
- 23 => B,C,E
- 24 => B,E

Ministère de l'Éducation
Faculté de Médecine
EHS
Examen de Psychiatrie

Réponses : épreuve pratique

- 1 => E
- 2 => C
- 3 => A
- 4 => E
- 5 => B