

Epreuve théorique

1. A l'adolescence on retrouve les éléments suivants sauf :
 - a) Les changements rapides du corps s'accompagnant d'inquiétude
 - b) Les pulsions s'expriment par l'excitation dans les organes génitaux
 - c) Recherche la présence de pairs du même âge pour se réassurer
 - d) Recherche habituellement la relation sexuelle avec les adultes
 - e) Très angoissé par la possibilité d'éprouver une excitation sexuelle au contact physique avec un parent
2. La psychose maniaco-dépressive de forme bipolaire (cocher la ou les réponses justes):
 - a) Comporte des accès maniaques et dépressifs
 - b) A souvent un caractère familial
 - c) Est sensible à l'action prophylactique
 - d) Débute le plus souvent après 50ans
 - e) Aucune de ces propositions n'est vraie
3. Un arrêt brusque dans le déroulement et l'énonciation de la pensée s'appelle :
 - a) Une phobie
 - b) Une amnésie
 - c) Un coq à l'âne
 - d) Un barrage idéique
 - e) Une obsession
4. Parmi les thèmes délirants suivants, quel est ou quels sont ceux qui évoquent un accès mélancolique :
 - a) Incurabilité
 - b) Mégalomanie
 - c) Négation
 - d) Influence
 - e) Indignité
5. Dans l'arriération mentale profonde ces perturbations relationnelles sont fréquentes sauf :
 - a) L'isolement
 - b) Le retrait affectif
 - c) Les décharges agressives
 - d) L'hallucination
 - e) Les stéréotypies
6. Trois symptômes associés sont évocateurs d'une démence, (parmi ses réponses une ou plusieurs sont justes) :
 - a) L'aphasie+apraxie+agnosie
 - b) L'aphasie+anorexie+agnosie
 - c) L'aphasie+anorexie+apathie
 - d) L'asthénie+apraxie+agnosie
 - e) L'amaigrissement+anorexie+aménorrhée
7. Toutes ces étiologies des démences sont justes sauf :
 - a) Etiologies vasculaires
 - b) Etiologies dégénératives
 - c) Etiologies infectieuses
 - d) Etiologies toxiques
 - e) Etiologies psychiques
8. La mélancolie est :
 - a) Une névrose grave
 - b) Une dépression grave
 - c) Un stress chronique

- d) Une expression psychique d'une souffrance psychique
 - e) Forme clinique de schizophrénie
9. L'accès maniaque est caractérisé par :
- a) Une hypersomnie
 - b) Euphorie et exaltation de l'humeur
 - c) Une asthénie
 - d) Un refus alimentaire
 - e) Rites de vérification
10. Le traitement de l'accès maniaque est à base de :
- a) Les antidépresseurs
 - b) Les tranquillisants
 - c) Les antipsychotiques
 - d) La psychanalyse
 - e) L'hypnose
11. Dans le trouble psychotique bref, quelle est ou quelles sont les propositions fausses :
- a) Écllosion soudaine d'un délire transitoire polymorphe
 - b) Touche le sujet âgé
 - c) Constitue une urgence psychiatrique
 - d) Non associé à des troubles de l'humeur
 - e) L'évolution non favorable
12. Le délire du trouble psychotique bref :(quelles sont la ou les réponses justes) :
- a) Il est systématisé
 - b) Il est d'intensité variable
 - c) Il est pauvre
 - d) Il est riche dans ses thèmes et ses mécanismes
 - e) Il est polymorphe
13. dans le trouble psychotique bref (cocher la ou les réponses justes) :
- a) le délire débute progressivement
 - b) le délire débute brutalement
 - c) il peut s'amender en quelques heures à quelques semaines
 - d) il s'associe à l'automatisme mental
 - e) il est associé au trouble thymique
14. quel(s) traitement(s) ne fait (font) pas partie du traitement de l'anxiété généralisée :
- a) anti dépresseurs
 - b) benzodiazépines
 - c) Thérapie cognitive
 - d) Thérapie comportementale
 - e) Thérapie interpersonnelle
15. Lequel ou lesquels de ces troubles ne fait (font) partie des trouble anxieux
- a) Trouble anxiété généralisée
 - b) Le syndrome des traumatisés du crane
 - c) Le trouble addictif
 - d) État de stress post traumatique
 - e) Trouble panique
16. Le trouble panique évolue soit : (cocher la ou les réponses justes):
- a)-Soit une atténuation puis une disparition des troubles.
 - b)) Soit une aggravation avec apparition d'une agoraphobie.
 - c)soit une rémission avec persistance d'une anxiété anticipatoire
 - d) soit une aggravation avec apparition d'une addiction
 - e)Soit une aggravation avec apparition d'un état dépressif

17. le diagnostic différentiel de l'attaque de panique se fait avec (cocher la ou les réponses justes) :
- a) L'hyperventilation
 - b) L'hyper activité
 - c) L'hypothermie
 - d) Prolapsus de la valve mitrale
 - e) Crise d'asthme
18. Le syndrome déficitaire de la schizophrénie est caractérisé par (cocher la ou les réponses fausses) :
- a) appauvrissement des affects
 - b) conduites d'évitement
 - c) pauvreté du discours
 - d) restriction des contacts sociaux
 - e) désinvestissement de la réalité.
19. Les formes productives (positives) de schizophrénie se caractérisent par tous les suivants, sauf :
- a) repli autistique
 - b) désorganisation du comportement
 - c) syndrome dissociatif
 - d) délire riche et mal systématisé
 - e) évolution par poussées.
20. Les schizophrénies à forme déficitaire (hébéphrénie) se caractérisent par tous les éléments suivants, sauf :
- a) dissociation affective
 - b) retrait social
 - c) délire paranoïde
 - d) bizarreries du comportement
 - e) émoussement affectif.

Cas Clinique

Il s'agit de Mr A-B, 45ans, divorcé, père de 03enfants, gardien dans un lycée (actuellement en invalidité), orienté à l'hôpital pour une agitation psychomotrice.

Le début des troubles remonte à l'âge de 27ans et il a été hospitalisé en psychiatrie, à la même date.

Il est scolarisé jusqu'en 9^{ème} année fondamentale. S'est marié à 26ans et est père de trois enfants, il a divorcé il ya 3ans, suite à l'exacerbation de ses troubles psychiatriques.

La symptomatologie s'est aggravée, il y a 5mois de cela, marqué par un vécu persécutoire intense, il se dit suivi par la police et surveillé par des caméras, avec une irritabilité, une angoisse importante, une insomnie. Il se dit être le président de la république, que tout le monde le connaît et qu'on parle de lui à la télé, d'où son admission. Parfois le patient nous dit : « des voix parlent dans ma tête, ce sont eux qui prennent le contrôle de mes pensée, parfois m'obligent à des actes que je désapprouve ou à dire des grossièretés ». Cela l'oblige à boire l'eau des sanitaires, car c'est le seul moyen de faire taire ces voix. Il se sent triste et malheureux. Il a fait deux tentatives de suicide antérieures.

Questions :

21. Parmi les éléments sémiologiques suivants, lequel ou lesquels peut-on retrouver chez ce patient :
 - a) Humeur dépressive
 - b) Délire bizarre
 - c) Automatisme mental
 - d) Une attaque de panique
 - e) Un syndrome dissociatif
22. Parmi ces diagnostics, lequel ou lesquels sont le ou les plus évocables chez ce patient :
 - a) Un trouble bipolaire
 - b) Une bouffé délirante
 - c) Une schizophrénie paranoïde
 - d) Un trouble anxieux
 - e) Un délire paranoïaque
23. Que faut-il faire chez ce patient :
 - a) L'hospitaliser
 - b) Lui faire des électrochocs
 - c) Lui donner des antipsychotiques atypiques
 - d) Lui donner des anxiolytiques
 - e) Lui donner des thymorégulateurs
24. En faveur d'une schizophrénie on peut retenir :
 - a) L'âge de début
 - b) L'anxiété importante
 - c) Les hallucinations
 - d) La discordance
 - e) Les tentatives de suicides antérieures
25. L'angoisse importante :
 - a) Est un facteur aggravant le risque suicidaire
 - b) Est à prendre en compte lors de la prise en charge
 - c) Peut provoquer des conduites suicidaires imprévisibles
 - d) Au contraire, c'est un facteur de bon pronostic
 - e) Est le témoin d'un syndrome de discordance

26. La citation du patient : « des voix parlent dans ma tête, ce sont eux qui prennent le contrôle de mes pensées, parfois m'obligent à faire des actes que je désapprouve ou à dire des grossièretés ». témoigne :
- D'un délire de persécution
 - De simples hallucinations acoustico-verbales
 - D'un délire de persécution avec hallucination auditives
 - D'un automatisme mental
 - D'idées obsédantes
27. Le patient se sent obligé de boire de l'eau des toilettes car selon lui « c'est le seul moyen de faire taire les voix », ceci est le signe :
- Du délire de persécution
 - Du délire mégalomane
 - D'un rationalisme morbide
 - De compulsions
 - D'un acte suicidaire
28. Le patient se sent obligé de dire des grossièretés car :
- Il l'a toujours fait, il est mal élevé
 - Son entourage ne le comprend pas et ça l'énerve
 - Il veut attirer l'attention sur lui
 - Les hallucinations impératives l'obligent à le faire
 - Se sent supérieur aux autres
29. Quel(s) est (sont) l'(les) élément(s) sémiologiques qui pourraient motiver l'admission du malade :
- L'âge jeune
 - L'évolution chronique
 - L'angoisse massive
 - L'état dépressif
 - Les antécédents de tentatives de suicides
30. Une fois stabilisé, quel(s) est (sont), d'après vous, le (s) critère de sortie de l'hôpital chez ce patient :
- Le rétablissement du sommeil
 - La régression du syndrome psychotique
 - Le redressement de l'humeur
 - Le retour de l'autocritique
 - Ses demandes incessantes de sortie



affichages

Département de Médecine de Constantine - Epreuve de Psychiatrie - A5 - R1 - *Z*

Date de l'épreuve : 12/11/2015

Page 1/1

Corrigé Type

N°	Rép.
1	D
2	ABC
3	D
4	AE
5	D
6	A
7	E
8	B
9	B
10	C
11	BDE
12	BDE
13	BCDE
14	E
15	BC
16	ACE
17	ADE
18	B
19	A
20	C
21	ABCE
22	C
23	AC
24	ACD
25	ABC
26	D
27	C
28	D
29	CDE
30	ABCD

Cher Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

Dr. A.C. SEGHIR
Maître Assistant en
Psychiatrie