

- 1/ Selon la classification de SEDDON :
- a- La neurapraxie est de bon pronostic
 - c- La repousse axonale se fait à l'ordre de 1mm/jour
- 2/ Dans les fractures de la diaphyse humérale, la paralysie radiale :
- a- Se voit dans 10 à 20 % des cas
 - b- Peut survenir secondairement
- 3/ la fracture de l'extrémité inférieure du fémur :
- a- survient souvent suite à un choc violent chez un sujet jeune
 - e- l'enclouage verrouillé du fémur, fait partie de l'arsenal thérapeutique
- 4/ Dans Les fractures du calcanéum :
- A. la récupération fonctionnelle est lente
 - E. L'incidence retro tibiale donne une image du calcanéum de face
- 5/ Dans Les fractures du calcanéum par chute d'un lieu élevé :
- B. rechercher systématiquement une fracture du rachis dorso lombaire
 - E. le fracas calcanéen se complique souvent d'un pied plat
- 6/ les orthèses sont des appareils qui visent à :
- C. corriger des déformations du tronc, du cou, ou des membres
 - E. suppléer une fonction de membre déficitaire.
- 7/ les aides techniques sont :
- D. des appareillages qui permettent la locomotion
 - E. des appareillages sans liaison avec le corps.
- 8/ les prothèses sont indiquées :
- B. En cas d'amputation des membres
- 9/ Quelles sont les avantages d'un traitement orthopédique par plâtre ?
- A. Diminution du risque infectieux
 - B. Absence d'ouverture du foyer de fracture
 - C. Respect de l'hématome fracturaire
 - E. Pas d'ablation de matériel d'ostéosynthèse
- 10/ les fractures élémentaire ou simple sont : (coche réponse Fausse).
- c- fracture en "T"
- 11/ Les panaris sous-dermiques d'une phalange distale insuffisamment ou tardivement traite peuvent se compliquer
- A- ostéite
 - B- arthrite
 - C- atteinte de la gaine des fléchisseurs
- 12/ la paroi postérieure est visible sur les radiographies suivante : (coche réponse Fausse).
- C- 3/4 alaïre.
- 13/ Une fracture verticale de la rotule :
- C/ Est une fracture sans rupture de l'appareil extenseur du genou
 - D/ A stabiliser chirurgicalement par un vissage
- 14/ Une chute latérale du même côté d'un pied bloqué en adduction peut entraîner :
- A- Une fracture bimalléolaire type I selon DUPARC ALNOT
 - B- Une fracture isolée de la malléole externe
 - C- L'équivalent d'une fracture bimalléolaire
- 15/ dans l'anatomie des deux os de l'avant bras :
- E- La membrane interosseuse s'étend à partir de 02cm au dessous de la tubérosité bicipitale jusqu'à 04cm au dessus de l'interligne articulaire du poignet.
- 16/ Les complications de fracture ouverte de jambe stabilisée par un fixateur externe sont :
- a- La thrombophlébite
 - c- Les raideurs articulaires
 - d- Le syndrome de loge
 - e- La pseudarthrose de jambe septique ou aseptique
- 17/ Les lésions traumatiques du ligament croisé antérieur du genou
- A. entraînent une entorse grave
 - B. Entraînent une hémarthrose
 - D. Un ressaut rotatoire est pathognomonique

18/une luxation congénitale de la hanche est suspectée à la naissance en présence à l'examen

Clinique:

- a- d'une limitation unilatérale de l'abduction
- b- d'une asymétrie des plis fessiers
- d- d'un torticollis
- e- d'un talus du pied

19/ le dépistage de la luxation congénitale de la hanche :

- c- est basé sur l'examen clinique à la naissance
- d- est facilité par l'échographie des hanches à la naissance
- e- impose la répétition de l'examen clinique complété si nécessaire par une échographie au 30ème jour

20/ la fracture de GERARD - MARCHANT est une

- A- fracture par compression extension
- D- fracture à bascule postérieure et translation externe et détachement de la styloïde cubitale

21/ les cals vicieux de l'humérus:

- a- Sont souvent bien tolérés
- c- Affectent la fonction du membre lorsqu'ils sont en rotation

22/ l'exploration radiographique d'un segment diaphysaire fracturé:

- a- Comprend au minimum, une incidence de face et une incidence de profil
- e- Doit contenir les articulations sous et sus-jacentes

23A propos du traitement d'un panaris péri-unguéal laquelle ou lesquelles de ces propositions est ou sont exacte

- A- les antibiotiques doivent être prescrits en l'absence de collection
- B- l'efficacité du traitement antibiotique à la phase de début se manifeste dans les 24Hrs

24/ Suite à un choc latéral violent sur le genou en appui, par un pare-choc de véhicule en mouvement

- c- une lésion cutanée associée est fréquente

25/ Dans les fractures ouvertes:

- A. Le pronostic est dominé par le risque infectieux
- D. le fixateur externe est un moyen d'ostéosynthèse utilisable dans ces fractures

26/ Après une amputation de jambe post-traumatique, le moignon doit bénéficier de:

- A. des soins particuliers et d'un bandage
- D. d'un positionnement en extension du genou
- E. de rééducation pré et post-prothétique

27/ les indications d'un traitement orthopédique par plâtre sont:

- A. Immobilisation d'une fracture après réduction
- B. Empêcher le déplacement de la fracture
- C. Immobilisation après une ostéosynthèse.
- D. Mise au repos des ligaments après une entorse

28/ Quelles sont les complications précoces (48H) au niveau d'un plâtre circulaire pour fracture diaphysaire fermée d'un membre ?

- A. Syndrome des loges
- B. Phlébite
- C. Embolie graisseuse

29/ Dans le traitement des fractures de l'enfant:

- B. Le respect des cartilages de croissance est primordial
- D. Le traitement orthopédique est préférable

30/ parmi les types de plâtres suivants lequel n'est pas un plâtre du membre inférieur:

- E. plâtre DUJARRIER

31/ Au cours de la surveillance d'un plâtre, quels sont les signes alarmants ?

- A. Sensation de chaleur et de strictions
- C. Peau violacée
- D. Fourmillements et extrémités froides

32/ Dans le traitement des fractures de l'enfant:

- B. Le respect des cartilages de croissance est primordial
- D. Le traitement orthopédique est préférable

33/ un sujet âgé de 40 ans est traité par plâtre pour une fracture bimalléolaire:

- C. L'utilisation des béquilles est obligatoire
- E. Le traitement thromboembolique passe par la surveillance et l'anticoagulation systématique

34/ Dans le syndrome d'embolie graisseuse:

- D. Il s'accompagne de troubles de la coagulation

E. Il s'observe en cas de fractures diaphysaires
35/ Quelles sont les avantages du plâtre par rapport à la résine ?

B. Toujours de première intention

C. Peu coûteux

E. Pas de réaction allergique

36/ Les complications précoces des fractures du fémur chez l'adulte sont :

c- Les complications thrombo emboliques.

e- L'état de choc.

37/ Les signes cliniques d'une fracture déplacée des 2 os de l'avant-bras chez l'enfant sont :

d- Une déformation du membre.

e- Une douleur avec œdème du membre.

38/ Les fractures diaphysaires du membre supérieur chez l'adolescent :

b- Sont souvent traitées orthopédiquement

d- Se compliquent parfois de cals vicieux.

39/ Un enfant de 6 ans qui présente un genu valgum droit minime avec raccourcissement de 2 cm et aux antécédents d'une entorse du genou il y a 1 an traitée orthopédiquement à quoi pensez vous :

D- Un décollement du cartilage de croissance fémoral inférieur type V.

40/ Chez un adolescent de 15 ans qui présente une déformation du rachis lombaire indiquez les signes qui permettent d'affirmer le diagnostic de scoliose

A - Déséquilibre du bassin

C- Gibbosité musculaire

D - Déviation du rachis lombaire.