

1<sup>er</sup> Rotation

INFSMC  
Bibliothèque Chale  
COPY SERVICE

1. L'automatisme psychomoteur est retrouvé dans :
  - A. La confusion mentale
  - B. La schizophrénie
  - C. La bouffie délirante
  - D. L'épilepsie
  - E. L'hyperthyroïdie
  
2. Un de ces syndromes n'appartient pas aux troubles mentaux des traumatismes crâniocérébraux :
  - A. Un Syndrome confusionnel post-traumatique
  - B. Un Syndrome Epileptique post-traumatique
  - C. Un Syndrome dépressif
  - D. Un syndrome subjectif post-comotionnel
  - E. Un syndrome dissociatif
  
3. Dans le myxoedème on trouve tous ces symptômes sauf un lequel :
  - A. Tachypsychie
  - B. Infiltration des téguments
  - C. Troubles confusionnels
  - D. Etat dépressif
  - E. Hébétude
  
4. Les neuroleptiques sont généralement indiqués dans :
  - A. Les troubles phobiques
  - B. Les attaques de panique
  - C. Les troubles obsessionnels compulsifs
  - D. Les psychoses aiguës ou chroniques
  - E. L'épilepsie
  
5. Quel type de psychostropes a une activité de blocage sur les systèmes centraux dopaminergiques :
  - A. Les antidépresseurs
  - B. Les anxiolytiques
  - C. Les thymorégulateurs
  - D. Les neuroleptiques
  - E. Les amphétamines
  
6. Le délire onirique est retrouvé dans :
  - A. La schizophrénie
  - B. La confusion mentale
  - C. La bouffie délirante
  - D. La dépression
  - E. L'accès maniaque
  
7. La tomodensitométrie (TDM) cérébrale est souvent négative dans :
  - A. Le syndrome subjectif post-comotionnel
  - B. L'hématome sous-dural
  - C. L'hématome extradural
  - D. Les tumeurs cérébrales
  - E. Les malformations artério-veineuses

8. Quel groupe de psychotrope provoque un syndrome malin :
  - A. Les hypnotiques
  - B. Les thymorégulateurs
  - C. Les neuroleptiques
  - D. Les antidépresseurs
  - E. Les tranquillisants
9. Cocher la réponse juste : les psychoneuroleptiques :
  - A. Provoquent des troubles de la perception
  - B. Provoquent des troubles de la conscience
  - C. Stimulent l'activité psychique
  - D. Diminuent l'activité psychique
  - E. Ont une action antipsychotique.
10. Les médicaments suivants ont une action anxiolytique sauf un, lequel :
  - A. Lorazepam
  - B. Le Diazepam
  - C. L'Halopéridol
  - D. Le Procaïmadiol
  - E. le Bromazepam
11. laquelle de ces définitions, caractérise le grand automatisme mental :
  - A. défillement d'idée, d'images dans la tête
  - B. la pensée est influencée
  - C. délire avec idées obsédantes
  - D. petit automatisme plus hallucinations auditives.
  - E. argoïse plus dépersonnalisation
12. parmi ces affections une seule fait parti du mode de début brutal de la schizophrénie :
  - A. délire paranoïaque
  - B. état dépressif
  - C. bouffé délirante
  - D. épilepsie
  - E. troubles d'anxiété généralisée
13. le quel de ces symptômes ne fait pas parti des symptômes positifs de la schizophrénie :
  - A. délire
  - B. pensée désorganisée
  - C. modification de la sensibilité
  - D. hallucination
  - E. baisse de la motivation
14. dans quelle affection psychiatrique retrouve-t-on un délire paranoïde :
  - A. confusion mentale
  - B. délire chronique
  - C. troubles de l'humeur
  - D. phobie spécifique
  - E. schizophrénie
15. laquelle de ces affections fait partie du diagnostic différentiel de la schizophrénie :
  - A. psychoses infantiles fixées
  - B. état de stress post traumatique
  - C. confusion mentale
  - D. démence
  - E. accretion mentale

16. La mélancolie est : (cocher la réponse juste)
- A. Une névrose grave
  - B. Une dépression grave
  - C. Un état de stress chronique
  - D. Une dépression réactionnelle
  - E. Une forme clinique de schizophrénie
17. La mélancolie peut évoluer vers : (cocher la réponse juste)
- A. La démence
  - B. La schizophrénie paranoïde
  - C. La confusion mentale
  - D. Le suicide
  - E. La névrose phobique
18. Le traitement de la mélancolie est essentiellement à base de : (cocher la réponse juste)
- A. tranquillisants
  - B. antidépresseurs
  - C. anti psychotique atypique
  - D. antiparkinsoniens
  - E. stimulants de la vigilance
19. L'accès maniaque est caractérisé par : (cocher la réponse juste)
- A. Une hypersomnie
  - B. Une Excitation de l'humeur
  - C. Une anémie
  - D. Un refus alimentaire
  - E. Des Rites de vérification
20. Le traitement de l'accès maniaque est à base de : (cocher la réponse juste)
- A. antidépresseurs
  - B. tranquillisants
  - C. anti psychotiques
  - D. psychanalyse
  - E. hypnose
21. La bouffée délirante est : (cocher la réponse juste)
- A. Une névrose grave
  - B. Une psychose chronique
  - C. Un déséquilibre psychopathique
  - D. Une psychose aiguë
  - E. Une forme clinique de schizophrénie
22. La désorientation temporo-spatiale se trouve dans : (cocher la réponse juste)
- A. L'hystérie
  - B. Les troubles obsessionnels compulsifs
  - C. La confusion mentale
  - D. L'hébéphrénie
  - E. La psychose maniaco-dépressive
23. Le traitement de la bouffée délirante repose sur : (cocher la réponse juste)
- A. Les antidépresseurs
  - B. Les tranquillisants
  - C. Les neuroleptiques
  - D. Les thymorégulateurs
  - E. Les antiépileptiques

24. La durée de traitement de la bouffée délirante est : (cocher la réponse juste)
- A. 08 mois
  - B. 12 à 18 mois
  - C. 03 mois
  - D. 2 à 3 ans
  - E. 5 ans
25. L'état d'agitation : (cocher la réponse fautive)
- A. Est une urgence médico-psychiatrique
  - B. Peut nécessiter une hospitalisation d'office
  - C. Nécessite d'abord un examen dans un service de psychiatrie
  - D. Désigne l'expression d'un trouble du comportement psychomoteur
  - E. Peut présenter un potentiel de dangerosité
26. L'addiction : (cocher la réponse juste)
- A. Est l'action de consommer régulièrement une substance psycho active
  - B. Est le fait d'être soumis ou sous l'emprise d'une substance ou d'un comportement qui est recherché malgré ses conséquences négatives
  - C. Est le fait de consommer plusieurs substances dont les effets se surajoutent
  - D. Est remplacée actuellement par le terme toxicomanie
  - E. Est le fait de déclarer les consommateurs de drogue à travers un registre des psychotropes
27. L'attaque de panique contient tous ces signes sauf un :
- A. Sensation d'étrangerie
  - B. Hallucination
  - C. Tachycardie, palpitation
  - D. Tremblements et vertiges
  - E. Peur de mourir, de devenir fou
28. L'examen d'un insomniaque doit comporter quatre des propositions suivantes sauf :
- A. L'électro-encéphalogramme
  - B. L'appréciation de l'hygiène de vie
  - C. L'électro-oculogramme
  - D. La formule de numération sanguine
  - E. L'électromyogramme
29. Parmi les antidépresseurs proposés lequel appartient à la famille des tricycliques :
- A. Laroxyl (amitrypiline)
  - B. Deroxat (paroxétine)
  - C. Prozac (fluoxétine)
  - D. Zoloft (sertraline)
  - E. adyvanil (miansérine)
30. Une des propositions suivantes ne constitue pas une dysonomie :
- A. une insomnie totale
  - B. une insomnie matinale
  - C. une hypersomnie
  - D. une insomnie d'endormissement
  - E. un somnambulisme

### CAS CLINIQUE 1 :

Il s'agit d'un homme de 42ans, admis en psychiatrie la veille pour une tentative de suicide par phlébotomie ; il s'agit de sa troisième tentative de suicide.

La première par déformation occasionnant des fractures aux membres inférieurs.

La deuxième par ingestion de médicaments ayant nécessité son hospitalisation aux urgences médicales.

Le patient apparaît triste, abattu, néglige ses soins corporels, cependant au cœur de l'entretien on note de longs moments durant lesquels le patient semble s'adresser à d'autres personnes. Se lève de son siège puis s'assoit, il dit qu'il ne peut pas contrôler ses actes, qu'il existe une force extérieure qui le menace et le contrôle.

Il dit aussi qu'il entend des personnes même si il se bouche les oreilles qui disent des choses malveillantes le concernant et qui en plus lui donne des ordres, il pense que la seule façon de les faire c'est de se tuer.

Le patient est connu des services de psychiatrie ou il a été hospitalisé à trois reprises.

Le début de ses troubles semble remonter à l'âge de 17ans et toutes ses hospitalisations sont dues à des rechutes suite à des arrêts thérapeutiques.

#### Questions :

31. Pourquoi l'hospitalisation de ce patient était elle nécessaire

- 1) Parce qu'il s'agit d'une tentative de suicide par phlébotomie
- 2) Parce qu'il existe des antécédents de tentative de suicide
- 3) Parce qu'il existe une symptomatologie dépressive associée
- 4) Parce que c'est un psychotique
- 5) Parce que c'est un névrotique

Rep : A=3-3, B=1-2-3, C=4, D=3-3, E=1-2-3-4

32. La cause principale de sa tentative de suicide peut être

- 1) L'état dépressif
- 2) Les hallucinations
- 3) Le sentiment d'insécurité
- 4) Le délire d'influence
- 5) L'agitation psychomotrice

Rep : A=5, B=4, C=2-4, D=1, E=1-3-3-4

33. Chez ce malade on retrouve :

- 1) Un état dépressif
- 2) Un syndrome d'autisme moral
- 3) Un délire d'influence
- 4) Un état maniaque
- 5) Une conservation du sens de la réalité

Rep : A= 1-2-3, B=3-4, C=1-5, D=2-3-5, E=1-4

34. Quel serait le meilleur traitement chez ce patient

- 1) Des antidépresseurs plus des anxiolytiques
- 2) Des anxiolytiques plus des antipsychotiques
- 3) Des neuroleptiques sédatifs
- 4) Des neuroleptiques incisifs
- 5) Des neuroleptiques sédatifs et incisifs en plus des antidépresseurs

Rep : A=1, B=1-2, C=3, D=2, E=5

35. Chez ce patient on peut évoquer le diagnostic suivant :

- 1) Une psychose hallucinatoire chronique
- 2) Une schizophrénie paranoïde
- 3) Une psychose maniaque-dépressive
- 4) Une bouffée délirante récurrente
- 5) Un trouble d'anxiété généralisée

Rep : A= 1-5, B= 2, C=5, D=2-4, E=1

### Cas clinique II :

Il s'agit d'un homme de 38ans, ramené aux urgences de psychiatrie par son épouse, qui ne comprend plus son comportement.

Elle vous raconte : « depuis un mois suite à une promotion professionnelle il est devenu très joyeux, il travaille toute les nuits sur des projets professionnels fictifs, il a quasiment cessé de dormir sans se fatiguer, bien au contraire il se sent en bonne santé et plus en forme que jamais. Il pense aussi qu'il peut tout réussir et tout entreprendre sans effort, les choses ont commencé à m'inspirer lorsqu'il a acheté une voiture de sport, il a prétendu qu'avec son nouveau salaire il pouvait désormais tout s'offrir. En plus, il s'est mis à sortir la nuit pour s'enivrer dans des bars avec des inconnus qu'il appelle ses nouveaux amis en payant leurs consommations. Fier encore il décide de racheter l'entreprise de son patron pour en être le PDG et encore plus riche, il pense aussi distribuer une partie de sa richesse à tous les mérités qu'il rencontre dans la rue ».

En écoutant ce discours de sa femme, il s'empare et hurle après elle, en disant qu'il va très bien et que c'est elle qui est folle, il sort du bureau tout en faisant des gestes obscènes envers sa femme.

Sa femme rajoute qu'avant cet épisode il se comportait normalement, il était très sociable et avait de bons rapports avec tout le monde même dans son milieu professionnel, il était régulier dans son travail, par contre son humeur est par fois changeante et cyclique.

### Questions :

36. Quel diagnostic retenez-vous :
  - A. Une confusion mentale
  - B. Un épisode maniaque d'une PMD
  - C. Une bouffée délirante
  - D. Un épisode d'allure maniaque d'une schizophrénie dysthymique
  - E. Une névrose hystérique
37. Parmi ces éléments sémiologiques quel est celui qui n'est pas en faveur de votre diagnostic :
  - A. Hyperactivité
  - B. Hypersomnie
  - C. Dépenses inconsidérées
  - D. Excitation psychique
  - E. Déchainement pulsionnel
38. Quel diagnostic différentiel pouvez-vous dresser :
  - A. Une névrose pathologique
  - B. Une bouffée délirante
  - C. Une confusion mentale
  - D. Une intoxication au kif
  - E. Une schizophrénie dysthymique
39. Quelle prise en charge thérapeutique envisagez-vous :
  - A. Un traitement en ambulatoire
  - B. Une hospitalisation en milieu psychiatrique
  - C. Un certificat de dangerosité pour un éventuel placement d'office
  - D. Un bilan préalable avant toute action thérapeutique
  - E. Orienter l'intéressé vers un centre de désintoxication
40. Quel traitement préconisez-vous :
  - A. Un traitement par voie injectable à base de neuroleptiques
  - B. Une psychothérapie de soutien
  - C. Un traitement thyroïdostimulateur
  - D. Un traitement par voie orale à base d'antipsychotiques atypiques
  - E. Un traitement par voie injectable à base de neuroleptiques plus un thyroïdostimulateur.



## Département de Médecine de Constantine - Epreuve de PSYCHIATRIE\_A5\_R2\_DEC13\*Z

Date de l'épreuve : 05/12/2013

Page 1/1

Corrigé Type

Dr. B. Dezaoui  
Président du Jury  
Dr. M. Bouhassira  
Membre du Jury  
Dr. M. Bouhassira  
Membre du Jury

N°	Rép.
1	D
2	E
3	A
4	D
5	D
6	B
7	A
8	C
9	C
10	C
11	D
12	C
13	E
14	E
15	A
16	B
17	D
18	B
19	B
20	C
21	D
22	C
23	C
24	B
25	C
26	B
27	B
28	D
29	A
30	E
31	E
32	F
33	A
34	E
35	E
36	B

N°	Rép.
37	B
38	E
39	B
40	E



Nom GEUL AIR FIALPrénom Neukaya1. Quelle(s) proposition(s) s'applique(nt) aux artères circonflexes ?

- A - elles peuvent être de type collagène  
 B - elles sont habituellement épaissies  
 C - elles succèdent habituellement au stade chronique de l'inflammation  
 D - elles contiennent une substance fondamentale anormale

2. A propos de l'athérome, il est exact que :

- A - il lève les artères de moyen et de gros calibre  
 B - il lève les veines de gros calibre à paroi musculaire épaisse  
 C - il représente le point d'appel d'une thrombose  
 D - il fragilise la paroi artérielle et donne alors naissance à un anévrysme

3. Dans les amyloses généralisées secondaires, est impliquée la réaction biochimique :

- A - Rémsie  
 B - Ractale  
 C - Gingivale  
 D - Hépatique

4. Parmi ces cellules, quelle est celle qui mérite le qualificatif de "macrophage" ?

- A. Polynucléaire neutrophile  
 B. Polynucléaire éosinophile  
 C. Lymphocyte  
 D. Histocyte

5. Une inflammation chronique est caractérisée par :

- A. Phénomènes exsudatifs abossés ou modérés  
 B. Granulome inflammatoire formé essentiellement de lymphocytes et de plasmocytes  
 C. Présence fréquente de macrophages  
 D. Importantes lésions de sclérose

6. Dans une tuberculose pulmonaire sévère, Quelle est la nature de la nécrose ?

- A - Fibrinoide  
 B - Caseuse  
 C - Ischémique  
 D - Purulente

7. Une tumeur maligne :

- A - Est bien limitée  
 B - Se caractérise par une croissance lente  
 C - possède un index mitotique élevé  
 D - Détruit les tissus de voisinage

8. Dans les adénocarcinomes endocriniens, la malignité est affirmée par :

- A - les critères cytologiques  
 B - l'effraction capsulaire  
 C - l'invasion vasculaire  
 D - l'apparition des métastases

9. Le carcinome in situ :

- A - s'accompagne de thrombose néoplasique  
 B - n'occasionne aucune rupture de la membrane basale  
 C - comporte des anomalies cytomoléculaires  
 D - ne se transforme jamais en carcinome invasif

10. Parmi ces tumeurs la ou lesquelle(s) sont dites bénignes :

- A - les condylomes  
 B - les leiomyomes  
 C - les adénomes  
 D - les lipomes