

01/ Dans la dépression majeure mélancolique, on utilise :

- a) La Sertraline en intraveineux
- b) L'Amitryptiline en intraveineux
- c) La Venlafaxine en intraveineux
- d) L'Anafranil en intraveineux.
- e) La Paroxetine en intraveineux

02/ Le trouble bipolaire type II se caractérise par :

- a) Des épisodes maniaques et des épisodes dépressifs
- b) Des épisodes mixtes et des épisodes dépressifs
- c) Des épisodes dépressifs et des périodes normo thymique
- d) Des épisodes hypomaniaques et des épisodes dépressifs.
- e) Des épisodes hypomaniaques ou des épisodes dépressifs.

03/ La structure psychotique se caractérise par :

- a) Une conscience de trouble
- b) Une inconscience des troubles
- c) La présence de délire ✓
- d) Une fausse perception de la réalité
- e) Des troubles de l'attention

04/ La schizophrénie fait partie de quel(s) trouble(s) ?

- a) Des troubles anxieux
- b) Du trouble délirant ✓
- c) Des psychoses paranoïaques
- d) Des états limites
- e) Est une entité nosographique indépendante des pathologies citées

05/ Le trouble délirant : Entraîne:

- a) Une altération du sens de la réalité.
- b) Une détérioration intellectuelle.
- c) Un syndrome de désorganisation.
- d) Où on peut croire le patient.
- e) Débute souvent à 30 ans. (non)

06/ Le trouble panique est défini par la répétition des attaques de panique chez le même sujet avec

- a) La conscience du caractère excessif ou absence de la crainte
- b) La peur d'avoir peur
- c) La recherche de l'objet contraphobique
- d) La peur des conséquences de la crise
- e) La disparition de la crise en absence de la confrontation

07/ le traitement dans la bouffée délirante BD est basé sur :

- a) des antalgiques
- b) des neuroleptiques uniquement
- c) des benzodiazépines
- d) des neuroleptiques sédatifs par voie parentérale
- e) des neuroleptiques incisifs et sédatifs

08/la confusion mentale :

- a) est une urgence médico psychiatrique
- b) caractérisée par des céphalées intenses
- c) se manifeste par une obnubilation et troubles mnésique
- d) se caractérise par une humeur dépressive
- e) est une manie agitée

09/Quel (s) est (sont) le (s) critère(s) généraux de la dangerosité :

- a) Personnalité histrionique
- b) ATCDS judiciaires
- c) Trouble du jugement
- d) Possession ou collecte d'arme
- e) La réticence pathologique

10/dans la bouffée délirante le diagnostic différentiel se fait avec :

- a) l'état maniaque
- b) la schizophrénie
- c) la confusion mentale
- d) la personnalité obsessionnelle compulsive
- e) un trouble anxieux

11/La méfiance est le trait de caractère spécifique de

- a) La personnalité histrionique
- b) La personnalité schizotypique
- c) La personnalité borderline
- d) La personnalité paranoïaque
- e) La personnalité Evitante

12/La personnalité histrionique se caractérise par :

- a) Le retrait
- b) Une vie imaginaire
- c) La méfiance
- d) La suggestibilité
- e) Des conduites addictives

13/La personnalité obsessionnelle compulsive se caractérise par :

- a) Une sensibilité au refus
- b) Evitement des contacts sociaux
- c) Une timidité
- d) Un besoin d'ordre excessif
- e) Une inhibition sociale

14/L'impulsivité est un trait de caractère spécifique des personnalités :

- a) Schizoïdes
- b) Schizotypique
- c) Obsessionnelle compulsive
- d) Borderline
- e) Antisociale

15/L'attaque de panique est une crise d'angoisse

- a) associée à une impression de mort imminente.
- b) associée à une sensation de devenir fou.
- c) associée à une peur de perte du contrôle de soi
- d) liée à une hypoglycémie
- e) liée à une hyperthyroïdie

Obsessionnelle compulsive

Schizoïde

Borderline

Paranoïaque

17/ Quelle(s) est (sont) la (les) propositions justes ?

- a) La schizophrénie est sous tendue par une Hyperdopaminergie
- b) La schizophrénie est sous tendue par une Hypodopaminergie
- c) Elle est génétiquement prédéterminée
- d) Les facteurs environnementaux sont des facteurs précipitant
- e) Les facteurs génétiques n'ont aucune influence sur la genèse de la schizophrénie

18/ l'agitation :

- a) Est un trouble du comportement
- b) N'est pas une urgence médicale
- c) Est souvent associée à la dangerosité
- d) Peut être due à une hypoglycémie
- e) Peut être permanente, isolée ou récurrente

19/ la pédopsychiatrie est la discipline médicale qui s'occupe

- a) du traitement des tb mentaux de l'enfant seulement
- b) de la prévention des tb mentaux de l'enfant seulement
- c) de la prévention des tb mentaux de l'enfant et l'adolescent
- d) du traitement des tb mentaux de l'enfant et l'adolescent
- e) du traitement et de la prévention des tb mentaux de l'enfant et l'adolescent

20/ L'addiction au cannabis entraîne :

- a) Une dépendance physique.
- b) Des attaques de panique.
- c) Un trouble délirant chronique.
- d) Une altération de la mémoire.
- e) Une altération des performances scolaires.

21/ Le délirium tremens : est un syndrome:

- a) Révélant l'intoxication à l'alcool
- b) Révélant le sevrage à l'alcool
- c) On peut trouver des hallucinations visuelles : zoopsies.
- d) On peut trouver : une hypertension, une bradycardie avec des signes de déshydratation.
- e) Où il faut donner une vitaminothérapie

22/ Parmi les anciennes thérapies abandonnées aujourd'hui :

- a) La sismothérapie
- b) La cure de sakel
- c) La micro biothérapie
- d) La psychothérapie
- e) La physiothérapie

23/ l'arriération mentale :

- a) est un état dementiel précoce
- b) est un état psychotique majeur
- c) survient chez le sujet adulte jeune
- d) est une perte des acquisitions scolaires
- e) ne permet pas les acquisitions sociales

24 / Dans la confusion mentale le(s) critère (s) de dangerosité est(sont) :

- a) La discordance
- b) Les bizarreries
- c) L'onirisme terrifiant
- d) La consommation de produit Toxique
- e) Le délire passionnel

25/ Le diagnostic de trouble somatoforme implique les critères suivants sauf un, lequel ?

- a) Une souffrance psychique
- b) altération du fonctionnement socioprofessionnel
- c) La non-imputabilité du trouble à un autre trouble mental caractérisé
- d) L'existence d'une lésion organique expliquant les plaintes
- e) Une participation psychologique à l'étiopathogénie du trouble

26/ Les benzodiazépines ont

- a) un effet diurétique
- b) un effet antiépileptique
- c) un effet hyperuricémiant
- d) un effet anti-inflammatoire
- e) un effet hypnotique

27/ Un syndrome Parkinsonien peut être provoqué par l'usage thérapeutique de :

- a) Benzodiazépines
- b) Antiépileptiques
- c) neuroleptiques
- d) Bêta-bloquants
- e) Antibiotiques

28/ Les benzodiazépines reconnaissent comme indication(s) spécifique(s) :

- a) Les délires et hallucinations de la schizophrénie
- b) L'état de mal épileptique
- c) La maladie de Parkinson
- d) Etats anxieux.
- e) L'insuffisance mentale

29/ Le sommeil est composé de :

- a) Trois stades du sommeil lent et deux stades du sommeil paradoxal
- b) Deux stades du sommeil lent et trois stades du sommeil paradoxal
- c) Trois stades du sommeil lent et trois stades du sommeil paradoxal
- d) Quatre stades du sommeil lent et trois stades du sommeil paradoxal
- e) Deux stades du sommeil lent et deux stades du sommeil paradoxal

30/ Le Syndrome de GELINEAU est composé de :

- a) Catalepsie et hallucination
- b) Epilepsie et hallucination
- c) Délire et hallucination
- d) Trouble de la mémoire et délire
- e) Trouble du comportement et délire.

## CAS CLINIQUE

Mademoiselle N.N, âgée de 22 ans, a été ramenée par ses parents dans un état d'agitation extrême elle est vêtue d'excentrique (robe de soirée sans aucun événement particulier) maquillage très marqué, des couleurs vives sur son visage. sa tenue, logorrhéique, ne cesse de parler, de chanter, de rire, de blasphémer difficilement maîtrisable avec beaucoup de séduction et de mythomanie.

A son domicile elle a agressé toutes ses sœurs et même sa mère en les accusant d'être jalouses de sa beauté je cite la patiente « je suis la plus belle femme du monde et la plus riche, je vais changer l'Algérie et éliminer tous les méchants, c'est ma véritable mission divine et c'est Dieu qui me l'a dit, on communique par télépathie et parfois je l'entends quand je suis seule ».

Le début des troubles semble remonter à quelques mois parqué par l'apparition progressive d'un état de tristesse de repli sur soi, désintérêt et perte de l'élan vital.

Trois semaines après, elle consulte chez un psychiatre qui lui a prescrit un traitement non précisé correctement pris pendant une quinzaine de jours, elle a commencé à changer complètement et devenir excitée, instable, logorrhéique et difficilement maîtrisable.

31. dans l'immédiat la patiente a reçu un traitement d'urgence, quelles sont les molécules utilisées :

- a) chlorpromazine injectable
- b) Haldol decanoas injectable
- c) Modécate injectable
- d) risperdal constat injectable
- e) diazépam injectable

32. quels sont les éléments sémiologiques retrouvés chez la patiente :

- a) Delire de filiation
- b) délire mégalomane
- c) délire mystique
- d) délire de persécution
- e) délire somatique

33. quels sont les mécanismes probables du délire

- a) interprétatif
- b) intuitif
- c) imaginatif
- d) hallucinatoire
- e) cénesthésique.

34. La patiente ressent :

- a) Des hallucinations acoustico-verbales ✓
- b) Des hallucinations psychiques ✓
- c) Des illusions
- d) Des hallucinoses
- e) Des flashes backs

35. Quel est le diagnostic du début

- a) Trouble psychotique bref
- b) Trouble conversif
- c) Trouble dépressif majeur
- d) Trouble phobique
- e) Trouble schizophréniforme

36. Quel est la diagnostic de l'accès actuel

- a) Bouffée délirante
- b) Trouble schizophréniforme
- c) Trouble anxieux
- d) Accès maniaque →
- e) Trouble délirant

agitation  
logorhée  
hétéroagressif  
délire jaloux  
persécution  
mégalo manie  
mystique  
hallucinations verbales  
automatisme

37. Ces troubles appartiennent à quelle maladie à votre avis

- a) Schizophrénie
- b) Trouble délirant
- c) Trouble bipolaire
- ~~d) Trouble délirant persécutif~~
- ~~e) Trouble de la personnalité~~

38. Selon votre avis, quel est le traitement que la patiente a pris en ambulatoire

- a) Anafranil
- b) Zyprexa
- c) Abilify
- d) Tegrétol
- e) Lamictal

39. Pour ce diagnostic, quel est le traitement qui serait contre indiqué

- a) Les thymorégulateurs
- b) Les antipsychotiques classiques
- c) Les antipsychotiques atypiques de seconde génération
- d) Les hypnotiques
- e) Les antidépresseurs

40. Quel est le traitement de l'accès actuel

- a) Les antipsychotiques atypiques
- b) Les thymorégulateurs
- c) Les antipsychotiques retardés
- d) Les psychodysléptiques
- e) Les antidépresseurs

41. Quel est le traitement idéal du début

- a) Les antipsychotiques atypiques
- ~~b) Les thymorégulateurs~~
- ~~c) Les neuroleptiques classiques~~
- ~~d) Les neuroleptiques retardés~~
- ~~e) Les psychodysléptiques~~

42. Si une personnalité pathologique est détectée, elle serait

- a) Schizoïde
- ~~b) Obsessionnelle~~
- ~~c) Histrionique~~
- ~~d) Évitante~~
- e) Paranoïaque

43. Le lendemain de la prise de traitement, la patiente a présenté une hypertonie des membres, rigidité, exoprotection du regard, torticolis sans hyperthermie, dans quel cadre classer vous ses symptômes :

- ~~a) Crise d'hystérie~~
- ~~b) Simulation~~
- c) Crise d'épilepsie
- ~~d) Syndrome extrapyramidal~~
- ~~e) Syndrome confusionnel~~

44. Quel est le traitement d'urgence

- a) Anafranil injectable
- b) Haldol injectable
- c) Diazépam injectable
- ~~d) Loxapac injectable~~
- ~~e) Modécate injectable~~

45. Quel est le traitement

- Clomipramine
- Carbamazépine
- Olanzapine
- Trihexyphénydyl
- Risperidone

46. La durée de

- a) Un mois
- b) Six mois
- c) 12 à 18 mois
- d) 05 ans
- e) 10 ans

47. Qu

- a) Les
- b) Le
- c) 1
- d)
- e)

45. Quel est le traitement adjuvant indispensable

- a) Clomipramine
- b) Carbamazépine
- c) Olanzapine
- d) Trihexyphénidyl retard
- e) Risperidone

46. La durée du traitement de l'accès actuel est de

- a) Un mois
- b) Six mois
- c) 12 à 18 mois
- d) 05 ans
- e) 10 ans

47. Quel est le traitement au long cours

- a) Les neuroleptiques
- b) Les antidépresseurs
- c) Les hypnotiques
- d) Les thymorégulateurs
- e) Les tranquillisants

48. La surveillance du traitement sera surtout à la recherche

- a) Le syndrome serotoninergique
- b) Le syndrome métabolique
- c) Le syndrome inflammatoire
- d) Le syndrome confusionnel
- e) Le syndrome convulsif

49. Les facteurs de bon pronostic sont

- a) Absence d'antécédents psychiatriques
- b) Début tardif
- c) Personnalité prémorbide
- d) Présence d'hallucinations psychiques
- e) Présence d'un délire

50. Pour prévenir les rechutes, une psychothérapie est préconisée

- a) TCC
- b) EMDR
- c) Psychoéducation
- d) Hypnose
- e) relaxation

Faculté de médecine de Constantine département de médecine  
EHS de psychiatrie M.Belamri Constantine  
Examen de Psychiatrie 2eme rotation  
2021/2022

Corrigé type

1. D	22. B
2. D	23. E
3. BCD	24. C
4. E	25. D
5. AD	26. BE
6. BD	27. C
7. E	28. BD
8. ABC	29. D
9. BD	30. A
10. AC	Cas Clinique
11. D	31.AE
12. D	32.BCD
13. D	33.ABD
14. DE	34.AB
15. ABC	35.C
16. D	36.D
17. ACD	37.C
18. ACDE	38.A
19. E	39.E
20. BDE	40.AB
21. BCE	41.B
	42.C
	43.D
	44.C
	45.D
	46.C
	47.D
	48.B
	49.ACE
	50.AC

*Leunol*

