

ÉPREUVE THÉORIQUE

1. Le délire chronique passionnel de jalousie est dit en (choisir la ou les réponses justes):

- d ✓
- a) En réseaux ✗
 - b) Polymorphe ✗
 - c) Concentrique ✗
 - d) En secteur ✓
 - e) Paranoïde ✓

2. La psychose hallucinatoire chronique est caractérisée par : (choisir la ou les réponses justes):

- be ✓
- a) Un délire paranoïaque ✗
 - b) Un automatisme mental ✓
 - c) Un délire paranoïde ✗
 - d) Un âge de début précoce ✗
 - e) Prédominance féminine ✓

3. Dans la débilité légère le QI est

- c ✓
- a. 0.3 à 0.5
 - b. 0.1 à .06
 - c) 0.65 à 0.8
 - d. Au-delà de 0.8
 - a) Ne peut être calculé

4. Les thymorégulateurs sont indiqués dans (cocher la ou les réponses justes):

- c d ✓
- a) Le traitement de la névrose ✗
 - b) La schizophrénie paranoïde ✗
 - c) L'accès maniaque ✓
 - d) La psychose maniaco-dépressive (trouble bipolaire) ✓
 - e) L'état limite ✗

5. Quels symptômes évoquent une schizophrénie ?

- abde ✓
- a) Bizarrerie ✓
 - b) Troubles du cours de la pensée ✓
 - c) Exaltation de l'humeur ✗
 - d) Négativisme ✓
 - e) Hermétisme ✓

6. Dans la forme catatonique de la schizophrénie on retrouve:

- abde ✓
- a) La Stupeur ✓
 - b) La catalepsie ✓
 - c) Un délire riche ✗
 - d) Négativisme/oppositionnisme ✓
 - e) Hyperkinesies ✓

7. la forme paranoïde de la schizophrénie est caractérisée par (cocher plusieurs réponses):

- ade ✓
- a) Délire mal systématisé ✓
 - b) Délire systématisé ✗
 - c) Délire en réseaux ✗
 - d) Un automatisme mental ✓
 - e) Une discordance comportementale ✓

ÉPREUVE THÉORIQUE

8. La narcolepsie comporte:

- a) Une hypersomnie avec somnolence diurne ✓
- b) Une hypersomnie avec insomnie diurne ✗
- c) Une insomnie avec somnolence diurne ✗
- d) des accès de cataplexie ✓
- e) des paralysies du sommeil ✓

9. le syndrome de KLEINLEVIN comprend:

- a) Le sujet de sexe féminin ✗
- b) Des épisodes de somnolence ✓
- c) Une hyperphagie compulsive ✓
- d) Une désinhibition avec hypersexualité ✓
- e) Des hallucinations ✗

10. une encéphalopathie hypoglycémique peut entraîner:

- a) un état dépressif sévère ✗
- b) une anxiété avec instabilité, nausées et sueurs ✓
- c) des convulsions ✓
- d) un état confusionnel avec agitation psychomotrice ✓
- e) aucun de ces troubles ✗

Réponse: A = a; B = e; C = b, c; D = c, d;

E = b, c, d

11. Les complications dues à la pharmacodépendance sont:

- a) La confusion mentale ✓
- b) Le syndrome démentiel ✓
- c) Psychopathie ✓
- d) L'accès délirant aigu ✗
- e) La pharmaco psychose ✓

?!

12. La dangerosité est:

- a) Le meurtre commis par un sujet saint d'esprit. ✗
- b) La pulsion dont le contrôle est incertaine. ✗
- c) La possibilité qu'a un malade mental de commettre des actes antisociaux. ✓
- d) C'est le fait de commettre des gestes violant sur autrui et qu'on continue à le faire. ✓
- e) Les manifestations agressives rapportées à des frustrations. ✓

13. Les critères de sortie d'un malade dangereux sont tout ses signes sauf un?

- a) La bonne réponse au traitement. ✓
- b) L'absence de récurrence ✓
- c) La bonne prise en charge socio-familiale. ✓
- d) La bonne autocritique. ✓
- e) L'indiscipline thérapeutique. ✓

14. Dans les troubles névrotiques on retrouve:

- a) Anorexie
- b) Hypersomnie
- c) Une créativité artistique *schizophrénie*
- d) Absence de l'anxiété
- e) Une apparence de malade mentale

3/4
✓

✓

✓

✓

1/1

EPREUVE THEORIQUE

15. 28347
16. 477225

15. Au cours de la confusion mentale le patient présente :
- a) Une tenue corporelle vestimentaire ~~excéntrique~~ X
 - b) Un visage hagard ✓
 - c) Des troubles cognitifs ✓
 - d) Une mimique triste X
 - e) Des troubles de la mémoire ✓
16. la pathologie qui présente une contre indication formelle aux benzodiazépines est (cocher la réponse juste)

- a) la maladie de parkinson.
 - b) l'épilepsie.
 - c) l'insuffisance respiratoire grave ✓
 - d) la péritonite.
 - e) la crise d'angoisse aigue.
17. les thymorégulateurs sont indiqués principalement dans ?

- a) la névrose phobique. X
 - b) la névrose d'angoisse X
 - c) la confusion mentale X
 - d) la bouffée délirante X
 - e) la psychose manico-dépressive. ✓
18. Le conflit psychique naît de : cocher la réponse juste

- a) L'opposition entre la sphère intellectuelle et affective du fonctionnement
- b) L'opposition entre les parents
- c) L'opposition entre les désirs, les pulsions et les forces qui s'opposent à leur réalisation ✓
- d) La volonté d'indépendance de l'enfant et le désir de contrôle des parents
- e) Les désirs et la réalité

19. L'adolescence : cocher la réponse fausse

- a) Maladie psychologique
- b) Caractérisé par un développement psychologique et un développement somatique rapide ✓
- c) La période de transition entre l'enfance et l'âge adulte ✓
- d) Caractérisée par le mode de pensée opérateur
- e) Est une période de fragilité psychologique et de comportement à risque ✓

20. Quels sont les éléments qui définissent le trouble panique :

- a) Une crise d'angoisse aigue X^{??}
- b) La présence d'obsession et/ou de compulsion X
- c) Une anxiété anticipatoire ✓
- d) La répétition des crises d'angoisses ✓
- e) Un état constant d'alerte X

abstrait

liberté : adolescence

Manuel
latine
6-12

CP
app
m

ÉPREUVE PRATIQUE

Cas clinique

Mme Fatima, âgée de 42 ans, mariée et mère de 3 enfants, professeur de lycée et elle n'a jamais consulté en psychiatrie, sauf dernièrement où il y a deux mois qu'elle n'en peut plus. Mme Fatima nous raconte son histoire qui remonte plus de quinze ans en faisant des consultations spécialisées en cardiologie, en pneumologie, en médecine interne et chez des généralistes pour des symptômes neurovégétatifs multiples et variés et presque durables: palpitations, tachycardie, vertiges. Tous les bilans ont été normaux et ces consultations ont été rassurantes.

Mme Fatima précise encore que ces symptômes remontaient beaucoup plus avant, et elle se rappelle même durant sa vie étudiante que ces symptômes s'exagèrent lors des examens jusqu'à avoir parfois des attaques de panique.

Mme Fatima rapporte que sa vie conjugale a commencé à se perturber, vu que son mari ne tolère plus ses questions multiples et sa dramatisation des petits soucis quotidiens sans raison apparente. A noter qu'elle a un frère qui souffre d'un trouble bipolaire. A l'examen psychiatrique, elle était très tendue et elle ne cessait de bouger ses pieds. Son humeur est triste mais sans idées de désespoir ou suicidaires, sa mimique reflète une angoisse importante. Son sommeil est conservé sauf parfois un endormissement difficile.

TAG - 1^{ère} épisode

21. Ce tableau clinique évoque en premier (2 réponses justes)

- a) Un trouble obsessionnel compulsif
- b) Une dépression anxieuse
- c) Un trouble anxieux généralisé avec une dépression
- d) Une phobie sociale avec une dépression
- e) Un trouble de phobie simple

22. Si vous envisagez une dépression anxieuse quel serait l'élément sémiologique le plus important qui manque ?

- a) Les idées suicidaires
- b) Les idées de culpabilité
- c) Les symptômes d'irritabilité et d'instabilité ou agitation
- d) Les troubles du sommeil
- e) Le ralentissement psychomoteur

23. Si vous pensez à un trouble panique quels seraient les deux éléments sémiologiques les plus spécifiques à chercher durant l'anamnèse

- a) Le début au jeune âge (20 - 30 ans)
- b) L'angoisse durant les examens
- c) La brutalité et la brièveté de la crise symptomatique
- d) La peur anticipatoire d'avoir un événement malheureux
- e) L'attente et la peur d'avoir une autre crise symptomatique

- Rappan d'au
- l' " des
- Trbl du cer

24. Parmi ces pathologies, une ne figure pas dans la liste des troubles anxieux.

- a) Le trouble obsessionnel
- b) L'état de stress post traumatique
- c) La dépression
- d) Le trouble panique
- e) La phobie spécifique.

5. - 1^{ère}
- Phob
- 100
- PTSD
- TAG

ÉPREUVE PRATIQUE

25. Si on retient le diagnostic d'une dépression, quels seraient les éléments d'endogénéité que vous pouvez remarquer chez cette patiente (une seule réponse juste) :
- a) Le fait d'avoir des consultations multiples chez des différents médecins spécialistes ✗
 - b) L'absence des antécédents psychiatriques personnels ✗
 - c) La présence d'un frère ayant un trouble bipolaire ✓
 - d) Absence des troubles manifestes de la personnalité.
 - e) Le fait de se poser beaucoup de questions
26. Finalement, quel serait votre diagnostic définitif
- a) Un trouble phobique ✗
 - b) Un état de stress post traumatique ✗
 - c) Un trouble anxiété généralisée avec une dépression ✓
 - d) Un trouble obsessionnel avec une dépression ✗
 - e) Un trouble bipolaire ✗
27. Pour votre diagnostic retenu, quel serait le traitement le plus approprié :
- a) Paroxétine 20mg/j ✓
 - b) Olanzapine 10mg/j ✗
 - c) Diazépam 15mg/j ✗
 - d) Carbamazépine 800mg/j ✗
 - e) Halopéridol 10mg/j ✗
28. Dans quel cas l'hospitalisation aurait été indiquée devant (plusieurs réponses justes) :
- a) La présence d'idées suicidaire ✓
 - b) La présence d'idées de culpabilité ✓
 - c) La présence de refus alimentaire ✓
 - d) La présence d'attaque de panique ✗
 - e) La présence d'un ralentissement psychomoteur ✗
29. Quel type de personnalité peut être évoqué chez cette patiente : (une seule réponse juste)
- a) Une personnalité antisociale ✗
 - b) Une personnalité névrotique ✓
 - c) Une personnalité paranoïaque ✗
 - d) Une personnalité schizoïde ✗
 - e) Une personnalité obsessionnelle ✗
30. Cette patiente doit bénéficier de (plusieurs réponses justes) :
- a) Accompagnement familial ✓
 - b) D'une psychothérapie ✓
 - c) D'un traitement neuroleptique ✗
 - d) D'une électroconvulsivo thérapie ✗
 - e) D'un traitement antidépresseur ✓
- Par d'agitation en délire*
- in R.*
- un peu de
- à l'impulsivité
- symptômes*

1	D
2	BE
3	C
4	CD
5	ABDE
6	ABDE
7	ADE
8	ADE
9	BCDE
10	E
11	ADE
12	C
13	E
14	ABC
15	BCE
16	C
17	E
18	C
19	X
20	CD
21	BC
22	C
23	CE
24	C
25	C
26	C
27	A
28	ABC
29	B
30	ABE

M. Dr. M. A. B. ...
M. A. B. ...
...