

Epreuve théorique

1. le Syndrome de GELINEAU est composé de :
  - a) -catalepsie et hallucination
  - b) -épilepsie et hallucination
  - c) -délire et hallucination
  - d) trouble de la mémoire et délire
  - e) -trouble du comportement et délire.
2. Selon les critères du DSM IV pour parler de schizophrénie, les troubles durent :
  - a) 01 mois
  - b) 04 mois
  - c) plus de 06 mois
  - d) plus de 02 années.
  - e) plus de 05 années.
3. Parmi les propositions suivantes, quels sont les éléments évocateurs d'un risque de passage à l'acte suicidaire devant un patient présentant des idées suicidaires ?
  - a) Projet explicité à l'entretien
  - b) La présence d'antécédents familiaux de tentatives de suicide ou de suicide
  - c) La présence d'antécédents personnels de tentatives de suicides
  - d) Isolement social et affectif
  - e) Hallucinations impératives
4. Quelle est l'affection qui comporte le plus de risques suicidaires ?
  - a) Schizophrénie de type hébéphrénique
  - b) Obsessions névrotiques
  - c) Accès mélancolique
  - d) Attaque de panique anxieuse
  - e) Psychose hallucinatoire chronique
5. Chez une jeune fille de 20 ans ayant commis un geste suicidaire dans les 24 heures, certains items parmi les suivants ont une valeur pronostique péjorative :
  - a) Pathologie schizophrénique
  - b) 2. Antécédents personnels de phobie
  - c) Préparation minutieuse du projet suicidaire
  - d) Antécédents familiaux de suicide
  - e) Annonce à l'entourage
6. Parmi les manifestations psychiatriques de l'épilepsie :
  - a) Des dreamy states en manifestations paroxystiques
  - b) des états de rêves en manifestations intercritiques
  - c) des troubles de l'humeur et du caractère
  - d) des conversions somatiques intercritiques
  - e) une comorbidité avec les arriérations mentales et la schizophrénie
7. l'agitation :
  - a) l'agitation est un trouble du comportement
  - b) l'agitation n'est pas une urgence médicale
  - c) l'agitation est souvent associée à la dangerosité
  - d) l'agitation peut être due à une hypoglycémie
  - e) l'agitation peut être permanente isolée ou récurrente

8. le site d'action des tranquillisants est :
- Dopaminergiques
  - Gabaergique
  - Serotoninergique
  - Noradrenergique
  - Muscorinique
9. la bouffée délirante
- est une psychose chronique
  - est une psychose aiguë
  - touche le sujet âgé
  - constitue une urgence psychiatrique
  - est caractérisée par un début brutal
10. La confusion mentale est caractérisée par
- une altération de la conscience
  - des troubles cognitifs, un délire onirique, des troubles somatiques
  - Des troubles a type d'hypersomnie
  - un délire chronique
  - Une évolution favorable sous traitement
11. La psychose puerpérale
- Concerne la femme enceinte
  - Se manifeste par des pleurs ou de la fatigue durant les trois premiers jours après l'accouchement
  - Le tableau clinique se caractérise par des troubles de la mémoire et de la perception
  - Absence de délire et d'hallucination
  - Le traitement consiste à séparer l'enfant de sa mère.
12. La personnalité histrionique se caractérise par le fait que le sujet :
- est mal à l'aise dans les situations où il n'est pas au centre de l'attention d'autrui.
  - considère qu'il est meilleur que tout le monde
  - présente souvent un comportement de séduction sexuelle inadaptée ou une attitude provocante.
  - utilise régulièrement son aspect physique pour attirer l'attention sur soi.
  - présente une méfiance vis-à-vis de sa famille
13. la manie est caractérisée par tous ses symptômes sauf
- L'humeur euphorique
  - Les idées mégalomaniaques
  - Une tachypsychie
  - Une hypermnésie
  - Une pensée diffuse
14. toutes ses formes cliniques appartiennent aux TB sauf
- Le trouble bipolaire type I
  - Le trouble bipolaire type II
  - La dysthymie
  - Le trouble bipolaire type III
  - La Cyclothymie

15. tous ses thymorégulateurs sont susceptibles de traiter les TB sauf
- carbamazépine
  - amisulpiride
  - valproate de Na
  - lamotrigine
  - olanzapine
16. Les médicaments psycholeptiques se répartissent en
- thymorégulateurs
  - neuroleptiques
  - tranquillisants
  - antidépresseurs
  - amphétamines
17. la complication majeure des neuroleptiques est
- Un coma
  - Une sècheresse de la bouche
  - Une anorexie
  - Un syndrome malin
  - Une anxiété
18. parmi les médicaments suivants quels sont qui font partie des anxiolytiques :
- HALDOL (Halopéridol)
  - TEMESTA (Lorazépam)
  - TRANXENE (clorazepatedipotassique)
  - NOZINAN (Lévomépromazine)
  - ANAFRANIL (Clomipramine)
19. les thymorégulateurs sont indiqués dans :
- le traitement de la névrose
  - La schizophrénie paranoïde
  - L'accès maniaque
  - La psychose maniaco-dépressive (trouble bipolaire)
  - L'état limite
20. La personnalité paranoïaque est caractérisée par le fait, que le sujet :
- s'attend sans raison suffisante à ce que les autres l'exploitent
  - est préoccupé par des doutes injustifiés concernant la loyauté de ses amis
  - présente un syndrome de dépersonnalisation
  - présente des troubles conversifs
  - garde rancune

### Cas clinique

M.B est un jeune homme de 22 ans, célibataire et qui suit ses études universitaires depuis 4 ans, sans antécédents psychiatriques particuliers, est venu aux urgences dans un état aigu d'agitation psychomotrice. L'anamnèse avec ses parents qui l'ont accompagné, a rapporté que M.B était bien inséré sur le plan social, familial et aussi au niveau de ses études. Selon la famille, il n'a jamais consommé de drogues ou eu un problème avec la police. Ses parents ont rapporté aussi un changement en 24h de son comportement et qui a eu lieu il y'a une semaine, en devenant agressif et très angoissé et proférant des propos incompréhensibles et bizarres.

A l'entretien, M.B était agité et angoissé, il ressentait comme un danger qui s'approche de lui, et en mettant les doigts sur les oreilles et en criant : « ils veulent me tuer, ils sont là, ils veulent me prendre avec eux ». Une heure plus tard, il est devenu moins agité, et moins angoissé, mais l'entretien avec le patient était pauvre sauf une histoire qu'il a racontée à propos d'une rupture amoureuse avec une jeune fille. Une fois qu'il se préparait pour une sortie des urgences pour un suivi en ambulatoire, il est redevenu agressif et agité et en parlant de certains démons qui le commandent de loin et qui lui dictent ce qu'il doit dire ou faire. A certain moment, il est devenu calme et il a commencé à parler à voix basse.

21. Tous les diagnostics sont possibles sauf deux lesquels ?
  - a) Une schizophrénie paranoïde
  - b) Un trouble panique
  - c) Une bouffée délirante aiguë
  - d) Une psychose induite
  - e) Une dépression délirante
22. Deux examens complémentaires aidant beaucoup pour étayer le diagnostic, lesquels ?
  - a) Une TDM cérébrale
  - b) Dosage de la vitamine B12
  - c) Dosage des folates
  - d) Une analyse toxicologique urinaire
  - e) Bilan thyroïdien.
23. Dans ce cas clinique, deux syndromes psychiatriques sont clairement manifestes, lesquels
  - a) Le syndrome dissociatif
  - b) Le syndrome maniaque
  - c) Le syndrome hallucinatoire
  - d) Le syndrome anxieux
  - e) Le syndrome dépressif
24. Le syndrome d'automatisme mental est constitué de tous ces éléments sémiologiques sauf
  - a) Les ordres imposés
  - b) Des hallucinations visuelles
  - c) Perte d'intimité de la pensée
  - d) Les commentaires d'actes
  - e) Le délire de grandeur.

25. Les psychoses chroniques peuvent se présenter sous forme de ces pathologies suivantes sauf une. Laquelle ?
- a) Le délire érotomane
  - b) Schizophrénie catatonique
  - c) La psychose induite
  - d) La psychose hallucinatoire chronique
  - e) La paraphrénie.
26. L'un de ces délires est connu par sa réponse généralement positive aux antidépresseurs, lequel ?
- a) Le délire sensitif de Kretschmer
  - b) Le délire paranoïaque passionnel
  - c) Le délire interprétatif de sérieux et capgras
  - d) Le délire paraphrénique
  - e) Le délire d'origine confusionnelle
27. Dans ce cas clinique, quels sont les éléments qui plaident pour un bon pronostic :
- a) l'absence d'antécédents psychiatriques
  - b) l'incohérence de ses propos
  - c) le début aigu
  - d) la bonne insertion socio-familiale avant le début de la maladie
  - e) l'histoire de la rupture amoureuse.
28. Le fait que ce patient présente des périodes d'accalmie intermittentes avec des périodes d'agitation et de délire est fortement significatif de :
- a) Troubles anxieux
  - b) la psychose induite
  - c) trouble récurrent dépressif
  - d) une bouffée délirante aiguë
  - e) un délire paranoïaque.
29. en faveur de ce diagnostic, il manque encore deux éléments sémiologiques importants, lesquels ?
- a) La labilité thymique
  - b) Les idées suicidaires
  - c) Les éléments confusionnels
  - d) Le syndrome de reviviscence
  - e) Les obsessions et les compulsions
30. Un traitement en intramusculaire pourrait être administré en urgence. Lequel ??
- a) La clomipramine = Anafranil
  - b) La Fluoxétine = Prozac
  - c) L'halopéridol = Haldol
  - d) La pipotiazine = piportil
  - e) La paroxétine = Deroxat

Corrigé type :

~~1~~ => X

2 => C

3 => A-B-C-D-E

4 => C

5 => A-C-D-E

6 => A-C-D-E

7 => A-C-D-E

8 => B

9 => B-D-E

10 => A-B-E

11 => A-B-C

12 => A-C-D

13 => E

14 => C

15 => B

16 => B-C

17 => D

18 => B-C

19 => C-D

20 => A-B-E

21 => B-C-E

22 => A-D-E

23 => C-D

24 => B-E

25 => C

26 => A

27 => A-C-D-E

28 => B-D

29 => A-C

30 => C

29 DST

21 => B-C-E → a, e

22 => A-D-E → a, e

Conservatoire  
EHS Psychologie  
Le Mans  
Mars 2014  
*[Signature]*