

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ETABLISSEMENT HOSPITALISE SPECIALISE EN PSYCHATRIE
Dr BELAMRI.M DJEBEL OUAHCH CONSTANTINE

Examen de psychiatrie 5^{eme} année 3^{eme} rotation du 29/05/16 au 19/06/16

Chez Yacine
INESSMC
 Bibliothèque Chalet
 Copy Service

1. L'automatisme psychomoteur est retrouvé dans ?
 - a) La confusion mentale
 - b) L'épilepsie
 - c) La schizophrénie
 - d) La sclérose en plaque
 - e) L'hyperthyroïdie
2. La TDM cérébrale est souvent négative, dans ?
 - a) L'hématome sous dural
 - b) l'accident vasculaire cérébral
 - c) Les tumeurs cérébrales
 - d) Le Syndrome subjectif post-commotionnel
 - e) Les malformations artériovoineuses
3. Les troubles mentaux des myxœdèmes se manifestent par tous ces symptômes sauf ?
 - a) infiltration des téguments
 - b) états confusionnels
 - c) Tachypsychie
 - d) état dépressif
 - e) hébétude
4. L'anxiété devient pathologique quand :
 - a) Elle est envahissante
 - b) Elle entraîne une souffrance significative.
 - c) Permet de réfléchir sur soi
 - d) Elle n'entraîne aucune manifestation somatique
 - e) Elle répond au traitement
5. parmi ces symptômes, lequel ou lesquels ne figurent pas dans le tableau de l'attaque de panique.
 - a) Sensation d'oppression
 - b) Vertiges
 - c) Sensation de vision troublé et altérée
 - d) Sentiment de contrôle
 - e) Sentiment de tristesse passagère
6. Le trouble phobique est :
 - a) Peur irrationnelle d'un objet
 - b) Peur irrationnelle d'une situation
 - c) Peur irrationnelle sans objet
 - d) Le sujet n'est pas conscient du caractère absurde de ses craintes
 - e) Fait partie des troubles de l'humeur
7. Le syndrome de pica est :
 - a) Un trouble de la sensibilité
 - b) L'anorexie du petit enfant
 - c) Une phobie des injections

- d) Ingestions de substances non comestibles
 - e) Ingestion rapide d'une grande quantité de nourriture
8. Les états confusionnels se caractérisent par : (cocher la ou les réponses fausses)
- a) Une altération de la conscience
 - b) Désorientation temporo-spatiale
 - c) Des hallucinations visuelles
 - d) Troubles somatiques
 - e) Mémoire conservée
9. Le confus est : (cocher la ou les réponses fausses)
- a) Présent
 - b) Souvent mutique
 - c) Absent
 - d) Vigilant
 - e) Opposant
10. Le trouble psychotique bref est : (cocher la ou les réponses fausses)
- a) Une psychose aiguë
 - b) Un trouble schizophréniforme
 - c) Touche le sujet âgé
 - d) Constitue une urgence psychiatrique
 - e) Souvent irréversible
11. Dans le trouble psychotique bref, le délire est :
- a) Riche
 - b) Polymorphe dans le thème
 - c) Peut disparaître rapidement
 - d) S'accompagne de trouble du comportement
 - e) Associé à des troubles thymiques
12. Toutes ses classes pharmacologiques sont impliquées dans le traitement en psychiatrie sauf : (Cochez la ou les réponses justes)
- a) Les anxiolytiques
 - b) Les neuroleptiques
 - c) Les thymorégulateurs
 - d) Les antidépresseurs
 - e) Les antiémétiques
13. Les psychotropes englobent tous ses groupes ~~sauf~~ (Cochez la ou les réponses justes)
- a) Psycholeptiques
 - b) Psychoanaleptiques
 - c) Psychothérapeutiques
 - d) Psychodysleptiques
 - e) Les thymo analgésiques
14. Tous ses effets indésirables sont imputables aux neuroleptiques sauf (Cochez la ou les réponses justes)
- a) Les effets cumulables .
 - b) Les effets extrapyramidaux
 - c) Les effets antalgiques
 - d) Les effets neurovégétatifs
 - e) Les effets endocriniens

15. Les neuroleptiques sont indiqués dans toutes ses pathologies sauf
(Cochez la ou les réponses justes)

- a) Le trouble schizophréniforme
- b) La schizophrénie
- c) Le trouble délirant
- d) La myasthénie
- e) L'épisode maniaque

16. Le délire onirique est retrouvé dans ?

- a) La schizophrénie
- b) L'oligophrénie
- c) La dépression
- d) La confusion mentale
- e) L'accès maniaque

17. Parmi ces symptômes lequel ou lesquels, n'appartient pas aux troubles mentaux des traumatismes cranio cérébraux ?

- a) Syndrome confusionnel post-traumatique
- b) Une bouffée délirante
- c) Epilepsie post-traumatique.
- d) Hématome tardif
- e) Un Syndrome subjectif post-commotionnel

18. La phobie sociale est :

- a) Un Trouble anxiété sociale
- b) C'est la peur de parler en public
- c) C'est la peur que les autres lui fassent du mal
- d) C'est la peur d'être atteint d'une maladie mentale
- e) C'est la peur d'avoir un cancer et que les gens le sachent

19. Le retard mental est caractérisé par tous ces symptômes sauf :

- a) Un fonctionnement intellectuel général inférieur à la moyenne
- b) Des altérations du fonctionnement adaptatif
- c) Des troubles marqués de l'interaction sociale et de la communication
- d) Des perturbations cognitives et du langage
- e) Des performances scolaires faibles

20. Le trouble psychotique bref se caractérise par :

- a) Un début progressif
- b) Un délire pauvre
- c) Des hallucinations visuelles
- d) Un sentiment d'étrangeté
- e) Une désorientation temporo spatiale

Cas clinique :

Monsieur B M, âgé de 51 ans et exerçant la profession de garçon de café, est conduit aux urgences par la police après s'être plaint au commissariat de police d'être suivi par les services secrets. Son discours est rapide, sa voix accélérée. Il ne tient pas en place, se lève plusieurs fois pendant l'entretien. Il aborde une infirmière, en lui disant qu'il la connaît bien et qu'il voudrait rendre visite à sa famille. Il vient de dépenser 2000 DA, qu'il avait sur lui en achetant des tickets de tramway et qu'il a distribués, gracieusement aux passants. Il rapporte avoir eu 10 ans auparavant, quelques épisodes de baisse de moral et une hospitalisation en psychiatrie

après avoir été piégé par les services secrets dans les mêmes circonstances qu'aujourd'hui. Par la suite, il a consulté un médecin irrégulièrement et suivi un traitement par carbamazépine (Tégréol). L'examen clinique, un ECG récent et les paramètres biologiques (NFS, glycémie, alcoolémie, bilan hépatique et rénal) sont normaux. Il refuse l'hospitalisation.

21. Quels symptômes peut-on retenir de ce tableau clinique ?

- a) Tachypsychie
- b) Logorrhée
- c) Excitation motrice
- d) Dépersonnalisation
- e) Idées délirantes

22. Parmi les hypothèses diagnostiques suivantes, laquelle vous paraît devoir être considérée comme la plus probable ?

- a) Bouffée délirante aiguë
- b) Phase processuelle d'une schizophrénie
- c) Confusion mentale
- d) Manie délirante
- e) Psychose hallucinatoire chronique

23. Quelles modalités d'hospitalisation doivent être envisagées pour ce patient ?

- a) Hospitalisation libre
- b) Hospitalisation de nuit
- c) Hospitalisation d'office
- d) Hospitalisation de jour
- e) Hospitalisation à domicile

24. En l'absence de contre-indications, quels traitements sont indiqués pour traiter l'épisode actuel ?

- a) Neuroleptique sédatif et lithiothérapie
- b) Carbamate à doses élevées
- c) Anxiolytiques à doses élevées.
- d) Neuroleptique sédatif
- e) Anti dépresseurs tricycliques

25. Après résolution de l'épisode actuel, quelle modalité thérapeutique doit être envisagée au long cours en priorité et en l'absence de contre-indications ?

- a) Benzodiazépine
- b) Lithiothérapie
- c) Neuroleptique d'action prolongée
- d) Inhibiteur calcique

e) Antidépresseur à faible posologie

26. Chez ce patient l'agitation est :

- a) Une excitation mentale
- b) Est une excitation psychomotrice
- c) C'est un fading mental
- d) C'est une dissociation
- e) Une forme de trouble de la conscience

27. Le syndrome d'automatisme mental et d'influence fait que :

- a) Le patient se sent toujours poursuivi par ses propres voix
- b) Le patient est téléguidé
- c) Le patient ne dépend plus des autres
- d) Le patient entend des voix qu'il ne connaît pas mais qui sont toujours bienveillantes
- e) le patient peut se débarrasser de ces voix, juste en y pensant plus.

28. vu l'agitation du patient, il est nécessaire de :


- a- surveiller le patient
- b- de le sédaté
- c- de le laisser voir sa famille
- d- de l'hospitaliser à temps partiel
- e- de lui faire des examens complémentaires.

29. quels sont les signes en faveur du diagnostic :

- a- la discordance affective
- b- la familiarité
- c- le rationalisme morbide
- d- les dépenses inconsidérées
- e- le délire de persécution

30- l'évolution du trouble :

- a- Aigue
- b- Continue
- c- Périodique
- d- Nécessite un stabilisateur de l'humeur
- e- Evolue vers la perte des facultés intellectuelles



Université de Constantine 3
 Faculté de Médecine Pr B. Beusmail

Dr. Yachna
INESSMC
 Bibliothèque Chalet
 Copy Service

3. 2.

Département de Médecine de Constantine - Epreuve de Psychiatrie - A5 - R3 -*LE 19/06/2016*S*

Date de l'épreuve : 16/06/2016

Page 1/1

Corrigé Type

| N° | Rép./Alternatives 1&2 | |
|----|--------------------------|---|
| 1 | B | |
| 2 | D | |
| 3 | C | |
| 4 | AB | |
| 5 | CDE | |
| 6 | AB | |
| 7 | D | |
| 8 | E | |
| 9 | AD | |
| 10 | BCE | |
| 11 | ABCDE | |
| 12 | ABCD | |
| 13 | ABD | |
| 14 | BDE | |
| 15 | ABCE | |
| 16 | D | |
| 17 | B | |
| 18 | AB | |
| 19 | C | |
| 20 | D | |
| 21 | ABCE | |
| 22 | B | D |
| 23 | C | |
| 24 | A | |
| 25 | B | |
| 26 | B | |
| 27 | B | |
| 28 | ABE | |
| 29 | BDE | |
| 30 | CD | |

Je