

- 1- Quel traitement proposez-vous à un patient qui se présente pour une leishmaniose cutanée confirmée? sachant qu'il présente deux lésions siègeant au dessus de l'arcade sourcilière gauche.
 - a- antimoniate de méglumine par voie orale
 - b- antimoniate de méglumine en injections intra-musculaires
 - c- un dermocorticoïde
 - d- amphotéricine B par voie locale
 - e- la chirurgie
- 2- La dermatite atopique:
 - a- est un eczéma constitutionnel
 - b- l'altération de la barrière cutanée n'est pas incriminée dans la pathogénie de la maladie
 - c- est une dermatose erythémato-squameuse
 - d- peut débiter à n'importe quel âge
 - e- l'hypersudation en est un facteur aggravant
- 3- Le clou de Biskra:
 - a- L'agent pathogène est leishmania donovani
 - b- La lésion élémentaire est un nodule ulcéro-croûteux
 - c- Le diagnostic positif repose sur l'étude anatomo-pathologique
 - d- L'association avec la leishmaniose viscérale est possible
 - e- Le traitement de choix est l'antimoniate de méglumine
- 4- L'érythrodermie psoriasique:
 - a- peut être inaugurale de la maladie
 - b- forme bénigne du psoriasis
 - c- le pronostic vital peut être mis en jeu
 - d- le traitement repose sur les soins locaux
 - e- l'association à une atteinte articulaire est constante
- 5- Les signes associés à l'ulcère de jambe veineux sont :
 - a- Atrophie blanche de Milian.
 - b- Douleur en position debout.
 - c- Dermite ocre ou angiodermite purpurique et pigmentée
 - d- Dermatofibrosclérose ou hypodermite sclérosante
 - e- Signes d'ischémie chronique
- 6- Parmi les facteurs suivants lequel (lesquels) est (sont) un marqueur de risque de mélanome ?
 - a- Les antécédents familiaux de mélanome
 - b- Les antécédents personnels de mélanome
 - c- La couleur foncée de la peau et des cheveux
 - d- L'infection à papillomavirus oncogène
 - e- Un nombre élevé de naevi

- 7- Parmi les lésions suivantes, indiquez celle(s) qui contient(nent) du staphylocoque :
- a- Furoncle
 - b- Zona
 - c- Exanthème scarlatiniforme
 - d- Varicelle
 - e- Erythème polymorphe
- 8- Des anticorps sériques anti-peau sont retrouvés au cours de :
- a- Pemphigus vulgaire
 - b- Zona
 - c- Pemphigoïde bulleuse
 - d- Erythème polymorphe
 - e- Porphyrie cutanée tardive
- 9- La corticothérapie locale est contre-indiquée dans :
- a- L'impétigo bulleux
 - b- L'acné
 - c- L'herpès buccal
 - d- La rosacée
 - e- L'ecthyma
- 10- Les médicaments habituellement prescrits au cours de la syphilis sont :
- a- Macrolides
 - b- Neuroleptiques
 - c- Pénicillines
 - d- Cyclines
 - e- Quinolones
- 11- L'impétigo : toutes les réponses sont justes sauf une, laquelle ?
- a- Est une maladie contagieuse de l'enfant
 - b- Impose l'éviction scolaire
 - c- Se manifeste par de lésions crouteuses péri-orificielles
 - d- Peut se compliquer de glomérulonéphrite
 - e- Est une lésion initialement nodulaire
- 12- Que proposez vous comme traitement pour une acné rétentionnelle ?
- a- Cyclines en première intention.
 - b- Isotrétinoïne en première intention
 - c- Erythromycine locale en première intention
 - d- Rétinoïdes topiques+ Mesures d'hygiène
 - e- Peroxyde de benzoyle +Mesures d'hygiène
- 13- Le carcinome épidermoïde peut survenir sur toutes ces lésions sauf une, laquelle ?
- a- Les kératoses actiniques
 - b- Les kératoses séborrhéiques
 - c- Les cicatrices de brûlures
 - d- Les radiodermites
 - e- Les plaies chroniques telles que les ulcères de jambe
- 14- L'urticaire superficielle est une :
- a- Peut être aiguë ou chronique
 - b- Papule fugace migratrice et prurigineuse
 - c- Bulle fugace migratrice et prurigineuse
 - d- Nodule fugace migrateur et prurigineux
 - e- Le diagnostic de certitude est anatomo-pathologique

- 15- Le lupus myxomateux est une forme de tuberculose cutanée qui siège préférentiellement au niveau de :
- a- Visage
 - b- Cuir chevelu
 - c- Organes génitaux
 - d- Muqueuses
 - e- Lobule de l'oreille
- 16- Quels sont les médicaments pouvant être prescrits au cours de l'urticaire chronique :
- a- Antihistaminiques H1
 - b- Antihistaminiques H2
 - c- Cyclosporine
 - d- Opiacés
 - e- Omalizumab (biothérapie anti-IgE)
- 17- Concernant le carcinome basocellulaire :
- a- Tumeur la plus fréquente après le carcinome épidermoïde
 - b- L'âge d'apparition est en moyenne entre 60 et 80 ans.
 - c- il siège électivement au niveau des zones photo-exposées et jamais sur les muqueuses
 - d- il apparait le plus souvent de novo
 - e- il touche deux fois plus d'hommes que de femmes
- 18- L'eczéma de contact :
- a- Peut se développer dès le premier contact avec l'allergène
 - b- Le prurit est constant
 - c- Le diagnostic de certitude repose sur les patch tests
 - d- Est une réaction d'hypersensibilité immédiate
 - e- Est une réaction d'hypersensibilité retardée
- 19- Les médicaments aggravants le psoriasis sont :
- a- Immunosuppresseurs
 - b- Antiviraux
 - c- Antiparasitaires
 - d- Antibiotiques
 - e- Corticoïdes par voie systémique
- 20- Au cours de l'ulcère de jambe quel est (sont) l'(les) examen(s) systématiquement demandé(s) ?
- a- Électrophorèse des protéines
 - b- Électrophorèse de l'Hb.
 - c- Dosage sérique des Ac anti-peau circulants
 - d- Ac anti DNA
 - e- Echo-Doppler vasculaire

- 1- b
- 2- a, d, e
- 3- b, d, e
- 4- a, c
- 5- a, b, c, d
- 6- a, b, e
- 7- a
- 8- a, c
- 9- a, b, c, d, e
- 10- a, c, d
- 11- e
- 12- d
- 13- b
- 14- a, b
- 15- e
- 16- a, b, c, e
- 17- c, d
- 18- b, c, e
- 19- e
- 20- e