

# PITYRIASIS VERSICOLOR

## I. DÉFINITION

Les infections à *malassezia* sont des affections superficielles fréquentes et souvent récidivantes due à des levures commensales de la peau du genre *Malassezia* : levure lipophile et kératinophile

## II. AGENTS PATHOGENES

*Malassezia sp* levure de la flore commensale de la peau.

La première fois isolée du pityriasis versicolor, par la suite plusieurs espèces ont été isolées :

- ✓ *M. furfur.*
- ✓ *M. sympodialis.*
- ✓ *M. globosa.*
- ✓ *M. restricta.*
- ✓ *M. obtusa.*

## III. ÉPIDEMIOLOGIE

Levures commensales de la peau, les *Malassezia* prolifèrent sous l'influence de différents facteurs :

- ✓ Physiologiques : peau grasse séborrhéique; transpiration.
- ✓ Climatiques : chaleur, humidité, fréquence en été.
- ✓ Vestimentaires : tq le port de vêtements occlusifs de nature synthétiques.
- ✓ Iatrogènes : corticothérapie, contraceptifs oraux, cosmétiques gras ...
- ✓ Terrain : hypercorticisme.

## IV. CLINIQUE

### 1. Pityriasis versicolor

Se manifeste par des taches (macules) chamois siégeant au niveau du dos ,du thorax peut s'étendre à tout le corps sauf les paumes et les plantes.

Les formes acromiantes atypiques peuvent se voir.

### 2. Pityriasis capitis et dermite seborrheique

La dermite séborrhéique : dermatose se caractérise par des lésions érythémato-squameuses.

Siège au niveau des territoires cutanés riche en glandes sébacées : lisière du cc et sillon naso-génien et les sourcils...)

Le pityriasis capitis : C'est un état pelliculaire du cuir chevelu traduisant l'hyperkératose non inflammatoire du cc.

### 3. Folliculites a malassezia

C'est une dermatose pustuleuse et papuleuse folliculaire ; fréquente de l'homme jeune. Elle siège au niveau du dos, s'accompagnent de prurit.

#### 4. Fongémies à malassézia

Se voit chez les prématurés ou les patients immunodéprimés perfusés par intralipides.

#### V. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Pityriasis rosé de Gibert

Vitiligo dans les formes achromiantes

#### VI. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

Lumière de Wood : Montre une fluorescence jaunâtre

Le prélèvement se fait soit par grattage des lésions au vaccinostyle ou à la curette soit par application de scotch adhésif puis le coller sur une lame porte objet.

#### VII. EXAMEN DIRECT

Il peut se faire dans une solution de potasse mais il est plus net dans du noir chlorazol, on observe des grappes de levures rondes à paroi épaisse 2 à 6 microns et des filaments courts.

Dans la dermite séborrhéique et le pityriasis capitis les levures sont ovales avec absence de filaments.

Dans les folliculites les levures sont rondes.

L'atteinte pileaire peut se voir: prélever le poil à la pince à épiler, les levures sont à l'intérieur du follicule pileux.

#### VIII. CULTURE

La culture n'est pas de pratique courante se fait sur milieu de Sabouraud additionné d'huile d'olive ou bien de milieu spécifique appelé milieu de Dixon.

#### IX. TRAITEMENT

Les antifongiques imidazolés topiques **Kétoconazole (Kétoderm)** gel moussant mono dose à 2 % avec une deuxième application une semaine après.

Le traitement arrête l'infection fongique, mais les taches blanches persistent jusqu'à une exposition au soleil.

Si les taches dépigmentées sont disgracieuses, on peut conseiller 2 à 6 séances d'exposition aux ultraviolets A pour éviter les récurrences, il convient de maîtriser les facteurs Favorisants.