

Note
20.00
16.89
13.99
10.00
11.11
17.89
14.00
13.33
15.11
13.44
14.89
12.67
13.00
18.56
5.11
7.11
17.89
15.56
14.78
14.44
13.44
14.11
14.22
16.33
8.33
17.33
11.89
11.67
12.56
13.00
15.22
12.22
13.22
13.00
17.11
15.67
ASS
15.78
9.22
15.00
10.89

1/ Que signifie une arthralgie ?

- A- Une douleur osseuse.
- B- Une douleur musculaire.
- C- Une douleur vasculaire.
- D- Une douleur articulaire.
- E- Une douleur neurologique.

2/ Lesquelles de ces propositions sont compatibles avec la définition de l'arthrose ?

- A- Une inflammation de l'articulation.
- B- Une pathologie du sujet âgé.
- C- Une infection de l'articulation.
- D- Une dégénérescence du cartilage.
- E- Une pathologie de l'enfant.

3/ Un sujet jeune se plaint d'une douleur de la région lombaire apparue en fin de journée, après un déménagement. A quoi pensez vous ?

- A- Une douleur inflammatoire.
- B- Une douleur mécanique.
- C- Une lombalgie commune.
- D- Une arthrite du dos.
- E- Une arthrose du dos.

4/ L'impotence fonctionnelle correspond à une seule de ces propositions. Laquelle ?

- A- Raideur articulaire objectivée à l'examen.
- B- Douleur rapportée par le patient.
- C- Paralysie des membres.
- D- Douleur rapportée par le patient et raideur articulaire objectivée à l'examen.
- E- Réponse a+b+c

5/ A quoi reconnaît-on une arthrite ?

- A- Une tuméfaction de l'articulation.
- B- Une douleur inflammatoire.
- C- A une douleur osseuse.
- D- A une douleur mécanique.
- E- A une dégénérescence du cartilage.
- F-

6/ La douleur de l'ulcère gastrique :

- A- Siège au niveau de l'hypochondre gauche.
- B- Est calmée par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- C- Est calmée par la prise d'aliments et d'ant. acides.
- D- Est une douleur transfixiante irradiant au dos.
- E- S'accompagne de diarrhées liquidiennes.

7/ Lesquelles de ces propositions peuvent s'appliquer à une appendicite aiguë ?

- A- Crise douloureuse paroxystique à type de colique de la fosse iliaque droite.
- B- Douleur vive de la fosse iliaque droite ou l'arrêt de toute activité.
- C- Risque de perforation.
- D- Signes généraux à type de fébricule et de tachycardie.
- E- Aucun traitement antalgique ne doit être prescrit jusqu'à confirmation du diagnostic.

8/ Parmi les causes suivantes de douleurs, laquelle (lesquelles) siège (ent) au niveau de l'hypochondre droit ?

- A- La lithiase vésiculaire.
- B- La colique néphrétique.
- C- L'angiocholite.
- D- Les tumeurs du foie.
- E- La lithiase de la voie biliaire principale.

9/ Une douleur fait suspecter un infarctus du myocarde, si :

- A- Elle est de siège épigastrique et d'installation aiguë.
- B- Il existe une notion de tabagisme chronique.
- C- Il existe des facteurs de risque cardio-vasculaire.
- D- Il existe des antécédents de gastrite.
- E- Elle s'exprime par une sensation de faim douloureuse.

10/ Au cours de la colique néphrétique, la douleur est :

- A- Déclenchée par le jeûne.
- B- Toujours de siège lombaire et est bilatérale.
- C- Soulagée par la position antalgique penchée en avant.
- D- Déclenchée par la prise d'aliments gras.
- E- Lombaire, violente, en rapport le plus souvent avec une lithiase.

11/ Lesquels des éléments cliniques suivants sont évocateurs d'une névralgie faciale essentielle ?

- A- Déclenchement de la douleur lors d'effort important.
- B- La douleur est unilatérale.
- C- La douleur est...

Note
16.78
18.11
16.78
14.56
14.11
14.44
16.33
13.11
11.22
18.44
15.22
11.11
14.78
11.56
7.67
19.78
18.11
18.56
16.33

- B- A une douleur osseuse.
- C- A une douleur mécanique.
- D- A une dégénérescence du cartilage.
- E-

- 6/ La douleur de l'ulcère gastrique :
- A- Siège au niveau de l'hypochondre gauche
 - B- Est calmée par la prise d'anti inflammatoires non stéroïdiens
 - C- Est calmée par la prise d'aliments et d'anti acides
 - D- Est une douleur transfixiante irradiant au dos
 - E- S'accompagne de diarrhées liquidiennes

- 7/ Lesquelles de ces propositions peuvent s'appliquer à une appendicite aiguë ?
- A- Crise douloureuse paroxystique à type de colique de la fosse iliaque gauche
 - B- Douleur vive de la fosse iliaque droite obligeant l'arrêt de toute activité
 - C- Risque de perforation
 - D- Signes généraux à type de fébricule et de tachycardie
 - E- Aucun traitement antalgique ne doit être prescrit jusqu'à confirmation du diagnostic

- 8/ Parmi les causes suivantes de douleurs, laquelle (lesquelles) siège (ent) au niveau de l'hypochondre droit ?
- A- La lithiase vésiculaire
 - B- La colique néphrétique
 - C- L'angiocholite
 - D- Les tumeurs du foie
 - E- La lithiase de la voie biliaire principale

- 9/ Une douleur fait suspecter un infarctus du myocarde, si :
- A- Elle est de siège épigastrique et d'installation aiguë
 - B- Il existe une notion de tabagisme chronique
 - C- Il existe des facteurs de risque cardio-vasculaire
 - D- Il existe des antécédents de gastrite
 - E- Elle s'exprime par une sensation de faim douloureuse

- 10/ Dans la colique néphrétique, la douleur est :
- A- Déclenchée par le jeûne
 - B- Toujours de siège lombaire et est bilatérale
 - C- Soulagée par la position antalgique penchée en avant
 - D- Déclenchée par la prise d'aliments gras
 - E- Lombaire, violente, en rapport le plus souvent avec une lithiase

- 11/ Lesquels des éléments cliniques suivants sont évocateurs d'une névralgie faciale essentielle ?
- A- Déclenchement de la douleur lors d'effort important
 - B- La douleur est unilatérale
 - C- La douleur est strictement localisée au territoire du trijumeau
 - D- La douleur s'associe fréquemment à des troubles visuels
 - E- Le terrain de prédilection est la femme de plus de 50 ans

- 12/ Au cours de l'hypertension intracrânienne les céphalées peuvent s'accompagner :
- A- De vomissements
 - B- De fièvre
 - C- D'une paralysie de la VIème paire crânienne
 - D- D'une diminution de l'acuité visuelle
 - E- De photophobies

- 13/ Les céphalées aiguës :
- A- surviennent brutalement
 - B- traduisent souvent une urgence neurologique
 - C- sont dans la grande majorité des cas bénignes
 - D- nécessitent un scanner cérébral
 - E- ne nécessitent aucune exploration

11.67
12.56
13.00
15.22
12.22
13.22
13.00
17.11
15.67
ABS
15.78
9.22
15.00
10.99

ACIE

Page 6/6

Note
16.78
18.11
16.78
14.53
14.11
14.44
16.33
19.11
11.22
18.44
15.22
11.11
14.78
11.56
7.67
19.78
11.11
18.56
14.67

14/ Au cours de la migraine :

- A- Les céphalées sont de siège unilatérale
- B- Les céphalées sont à type de décharge électrique
- C- Les céphalées évoluent par crises
- D- Les crises durent quelques minutes
- E- Le traitement de la crise peut faire appel aux triptans

15/ Concernant les causes des céphalées, une des propositions suivantes est juste.

Laquelle ?

- A- Elles sont exclusivement neurologiques
- B- Elles sont exclusivement vasculaires
- C- Elles sont surtout post-traumatiques
- D- Elles sont multiples
- E- Elles sont souvent inconnues

16/ L'obésité est définie par un Indice de Masse Corporelle (IMC) :

- A- $\geq 18 \text{ Kg} / \text{m}^2$
- B- $\geq 20 \text{ Kg} / \text{m}^2$
- C- $\geq 25 \text{ Kg} / \text{m}^2$
- D- $\geq 27 \text{ Kg} / \text{m}^2$
- E- $\geq 30 \text{ Kg} / \text{m}^2$

17/ L'obésité est un facteur de risque majeur associé aux maladies suivantes :

- A- l'hypertension artérielle
- B- le diabète non insulino-dépendant (ou de type 2)
- C- les maladies cardiaques
- D- l'apnée du sommeil
- E- l'arthrose

18/ Quelles sont les bonnes règles de la mesure de la pression artérielle ?

- A- Elle peut être prise immédiatement après l'effort
- B- Elle doit être mesurée en position couchée ou assise
- C- La taille du brassard doit être adaptée au bras
- D- La membrane du stéthoscope doit être placée au bon endroit
- E- Les mesures doivent être répétées 3 fois, ne retenir que les 2 dernières

19/ Parmi les facteurs de risque cardiovasculaire suivants, lesquels sont modifiables ?

- A- L'âge
- B- L'obésité
- C- Le tabagisme
- D- Le diabète
- E- L'hypertension artérielle

20/ Le diabète de type 2 doit être dépisté chez les sujets :

- A- présentant des signes cliniques évocateurs de diabète
- B- d'âge de plus de 40 ans
- C- ayant un IMC (indice de masse corporelle) $> 27 \text{ kg} / \text{m}^2$
- D- ayant des antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie fœtale
- E- ayant une hypertension artérielle