

MALADIE DE PAGET
Pr. BOUDERSA

1. DEFINITION

- ✓ Deuxième maladie osseuse après l'ostéoporose.
- ✓ Ostéite déformante
- ✓ Maladie localisée, peut-être diffuse
- ✓ Résorption osseuse augmentée + formation osseuse anarchique et accélérée
- ✓ Os anormal

2. EPIDEMIOLOGIE

- ✓ Incidence : 3 à 3.7 %
- ✓ Adulte > 40 ans
- ✓ H = F
- ✓ Fréquent chez les anglo-saxons, rare en Asie et en Scandinavie

3. EXAMEN CLINIQUE

- ✓ Découverte fortuitement = maladie longtemps asymptomatique +++
- ✓ Déformations osseuses douloureuses (bassin, rachis, membres)
- ✓ Atteinte péri-articulaire
- ✓ Atteinte nerveuse compressive (auditive, oculaire, radiculaire)
- ✓ Insuffisance cardiaque : complication rare (forme diffuse)
- ✓ Transformation sarcomateuse : rare < 1%

4. DIAGNOSTIC

- ✓ Radiologique :
 - RX : os augmenté de volume et déformé
lyse + fissures osseuse

 - scintigraphie: dgc différentiel avec les lésions dégénératives
bilan de suivi
- ✓ Biologique : phosphatases alcalines ↑

5. TRAITEMENT

- ✓ Bisphosphonates = trt de choix
Pamidronate Aredia® 60mg IV/j pour 2jours
Répète en cas de réactivation de la maladie
- ✓ Antalgiques
- ✓ AINS
- ✓ Physiothérapie