

## **1/ Définition**

Le picage est une habitude vicieuse rencontrée chez différentes espèces d'oiseaux .

Elle apparaît sans cause précise, mais à la suite de plusieurs facteurs surtout stressants.

C'est le fait qu'un oiseau se mette à piquer : crête , plumes , orteils , cloaque ou toute les autre partie du corps de ses congénères .

Généralement le picage débouche sur le cannibalisme surtout chez les poules pondeuses .

Chez certains oiseaux de volière ; le perroquet entre autres , on parle plutôt d'autopicage ; ou l'oiseau se pique lui même .

Le cannibalisme : c'est l'action pour tout être vivant de manger les membre de sa propre espèce .

## **A/ Clinique**

### **1/ Le picage des plumes**

Ou les oiseaux sont atteints à tous les âges , il se déclare souverainement et les animaux se mettent à arracher les plumes de leurs congénères et les avaler . ils commencent par les plumes du croupion puis remontent vers le cou en passant par les plumes du corps . L'évolution peut se faire vers la mise à nue de la chair qui est parfois déchiquetée jusqu'à l'os ; et c'est le cannibalisme .

A l'autopsie on peut retrouver des plumes mélangées avec l'aliment au niveau de l'appareil digestif .

### **2/ Le picage des extrémités**

il s'agit beaucoup plus de la crête , des barbillons et des doigts . ce phénomène se voit surtout chez les pondeuses en cage .

### **3/ Le picage de l'oviducte**

c'est le plus important et le plus grave des picages chez les pondeuses surtout s'il y a surpeuplement .

Juste après la ponte , il se produit un prolapsus partiel ou total de l'oviducte , normal ou du à un dépôt exagéré de graisse au niveau du cloaque . le prolapsus va attirer les autres poules qui vont donner des coups de bec jusqu'à ça saigne . la vue du sang va les attirer encore plus et elle ne lâcheront leur proie qu'après éviscération .

### **4/ Le picage des œufs**

Se rencontre surtout en élevage fermier ou les nids sont insuffisants et le ramassage des œufs est peu fréquent . cette forme de picage est très rare maintenant , vu la mécanisation du ramassage des œufs et la séparation des poules de leurs œufs .

## B / Causes et solutions

les causes du picage sont complexes et mal élucidés . il faut surtout suite à des erreurs d'élevage dont on peut citer :

- poulailler avec trop de lumière qui rend les oiseaux nerveux et agités .
- erreurs dans la densité de population ( surpeuplement ) .
- erreurs dans l'alimentation qui peut présenter des carences en protéines , en minéraux ou en cellulose .
- erreurs dans la distribution d'aliment ou d'eau de boisson .
- présence de parasites externes ( poux ) .
- L'oisiveté ou l'ennui .
- La présence de stress internes ou externes ( présence de rats , d'oiseaux , de personnes étrangères au poulailler ) .
- La présence de projecteurs de lumière près du poulailler .
- des prédispositions héréditaires .

-Face à tous ces problèmes ayant causé le picage et parfois le cannibalisme , il faut d'abords s'en assurer en se déplaçant pour mieux voir le local et toute défaillance possible et en essayant d'avoir une bonne anamnèse . Après cela on essaye de corriger toutes les erreurs sans pour autant créer d'autres stress .

- Pour ce faire , il suffit de :

- Diminuer l'intensité de la lumière par la peinture des vitres en rouge ou en bleu de façon à éviter le contraste visible sur les différentes parties du corps de l'animal . Mais faire attention à cette diminution de lumière chez les pondeuses en période de ponte .
- Distribuer des tranquillisants dans l'eau de boisson ou dans l'aliment .
- Corriger le surpeuplement en respectant les 10% pour le poulet de chair et 4 poules par cage pour les poules pondeuses .
- Chercher et corriger toute carence alimentaire .
- Respecter la distribution d'aliment en quantité , en qualité et en temps .
- Eviter l'oisiveté en augmentant les périodes de distributions d'aliment .
- Donner du sel ( qui est un excitant de la nutrition ) dans l'eau de boisson à raison de 3 à 5 gs / 1 litre d'eau pendant ½ journée , puis refaire 2 à 3 jours après .
- Pour les poules pondeuses donner de la vitamine E pour éviter tout dépôt exagéré de graisse au niveau du cloaque .
- Débequer les poulets et surtout les poulettes futures pondeuses avant l'âge de 10 jours . Pour ce faire on coupe la mandibule supérieurs à 2 mm des narines en évitant de couper très court .

Donc en conclusion essayer de respecter les normes d'élevage .