

Département de médecine Module de Sémiologie Année universitaire 2018 / 2019
1^{er} Examen de Moyenne Durée.
Cochez la ou les réponse(s) juste(s)

- 1- Un déficit pondéral stable en l'absence de signes cliniques évocateurs correspond à l'une des définitions suivantes, laquelle ?
 - a- La dénutrition
 - b- La maïnutrition
 - c- L'amaigrissement
 - d- La maigreur

- 2- En cas de déficit pondéral, quelle est parmi les propositions suivantes celle qui fait partie du panel des motifs de consultation ?
 - a- Une perte pondérale de 7%
 - b- Une aménorrhée
 - c- Des douleurs mécaniques articulaires
 - d- Une apnée du sommeil

- 3- Quel est le marqueur nutritionnel le plus utilisé dans l'évaluation de l'état nutritionnel ?
 - a- La RBP
 - b- L'albumine
 - c- La pré-albumine
 - d- La créatinine

- 4- L'obésité se définit comme étant un excès de poids néfaste pour la santé en relation avec l'une des propositions suivantes, laquelle ?
 - a- Une rétention d'eau
 - b- Une augmentation de la masse musculaire
 - c- Une augmentation de la masse grasse
 - d- Une augmentation de la masse protéique circulante

- 5- Calculez le poids d'un sujet en ayant les paramètres suivants : Poids = 123 Kg, taille = 165 cm.
 - a- 30 Kg/m²
 - b- 35 Kg/m²
 - c- 40 Kg/m²
 - d- 45 Kg/m²

- 6- Précisez à quels niveaux anatomiques il faut se référer afin de mesurer le ratio tour de taille sur tour de hanche ?
 - a- La 10^{ème} cote
 - b- La Crête iliaque
 - c- Le grand trochanter
 - d- Le petit trochanter

- 7- Parmi les propositions suivantes et en fonction de l'IMC, le profil correspondant à celui d'un sujet obèse métaboliquement sain ?
 - a- MUHNO
 - b- MHNO
 - c- MUHO
 - d- MHO

- 8- Pour un risque relatif (RR) situé entre 1 et 2, quel serait la complication de l'obésité encourir ?
 - a- Cancer du colon
 - b- Diabète
 - c- HTA
 - d- Dyslipidémie

- 9- Lorsqu'on dit qu'un malade a une dyspnée de stade III, on veut dire que le malade est essoufflé
- a- pour un effort important
 - b- pour une marche en montée
 - c- pour une marche à plat avec une personne du même âge
 - d- pour une marche à plat à son propre pas
- 10- Il a 40 ans, une expectoration chronique claire ; il a des ronchi à l'auscultation. Il n'a pas d'autre symptôme. Quel est le diagnostic le plus probable ?
- a- cancer bronchique
 - b- tuberculose
 - c- bronchite chronique
 - d- rhinite chronique
- 11- Lors de la percussion du thorax, on peut observer un son tympanique à la place du son vésiculaire dans lequel des cas suivants ?
- a- condensation parenchymateuse
 - b- pneumothorax
 - c- bronchite
 - d- épanchement liquidien de la plèvre
- 12- L'expectoration est le rejet par la bouche de sécrétions d'origine
- a- nasale
 - b- buccale
 - c- broncho-pulmonaire
 - d- digestive
- 13- Parmi les éléments suivants, lesquels appartiennent à la séméiologie clinique fonctionnelle respiratoire ?
- a- dyspnée
 - b- auscultation
 - c- expectoration
 - d- inspection
- 14- Quels sont les signes qui n'appartiennent pas au syndrome d'épanchement pleural liquidien de la plèvre ?
- a- vibrations vocales augmentées
 - b- matité de bois
 - c- opacité systématisée
 - d- murmure vésiculaire aboli
- 15- un malade de 20 ans ; vient à votre consultation parce qu'il a été réveillé la nuit dernière par une toux sèche, avec essoufflement, quelques sifflements dans la poitrine puis une expectoration claire, épaisse. A quoi pensez-vous d'abord ?
- a- bronchite aiguë
 - b- crise d'asthme
 - c- reflux gastro-œsophagien
 - d- rhinite
- 16- Vous observez un malade avec distension des veines du cou, des creux sus-claviculaires comblés, une circulation veineuse pré-thoracique. De quoi s'agit-il ?
- a- embolie pulmonaire
 - b- compression de la veine cave supérieure
 - c- insuffisance respiratoire aiguë
 - d- insuffisance ventriculaire gauche

- 17- L'hémoptysie est le rejet par la bouche de sang d'origine
- a- digestive
 - b- nasale
 - c- sous-glottique
 - d- pharyngo-laryngée
- 18- Les vibrations vocales sont augmentées en cas de
- a- pneumonie
 - b- épanchement liquidien de la plèvre
 - c- emphysème
 - d- épanchement gazeux de la plèvre
- 19- Une ponction lombaire est indiquée dans les cas suivants :
- a- Hypertension intracrânienne
 - b- Hémorragie cérébro-méningée
 - c- Syndrome méningé
 - d- Trouble de l'hémostase
- 20- Dans les méningites, la composition du liquide céphalo-rachidien est comme suit :
- a- Aspect clair ou louche
 - b- Aspect uniformément rouge et incoagulable dans l'épreuve des 3 tubes
 - c- Hypercytose, albuminorachie élevée, glycorachie abaissée
 - d- Lymphocytes $< 5/mm^3$, albumine = 0.4 G/l, glycorachie = 0.5 g/l
- 21- Chez le nourrisson, dans le syndrome méningé :
- a- La raideur de la nuque est constante
 - b- L'hypotonie axiale est absente et la fontanelle est bombante
 - c- L'hypotonie axiale est présente et la fontanelle est bombante
 - d- Les convulsions sont absentes
- 22- L'érythème scarlatiniforme s'individualise par les caractéristiques sémiologiques suivantes, lesquels ?
- a- L'érythème est rouge vif en grands placards continus
 - b- Les placards sont séparés par des intervalles de peau saine
 - c- L'érythème est confluent sans intervalles de peau saine
 - d- Exemple type : scarlatine, toxidermie
- 23- Parmi les descriptions cliniques suivantes, quelles sont celles qui sont compatibles avec le diagnostic de scarlatine ?
- a- Erythème scarlatiniforme
 - b- Papules au niveau des points d'appuis
 - c- Desquamation en grands lambeaux
 - d- Prurit exagéré la nuit
- 24- On doit mesurer la température :
- a- A l'effort
 - b- A distance d'un repas
 - c- Au niveau du creux inguinal
 - d- Au niveau du creux poplité
- 25- La température corporelle peut augmenter :
- a- Avec l'âge
 - b- Au cours du la 2ème partie du cycle menstruel
 - c- Le matin
 - d- Avec la consommation excessive d'alcool

26- Quelles sont les situations qui peuvent être responsable de fièvre :

- a- L'Hypothyroïdie
- b- Une hémorragie cérébrale
- c- Un Hyper-catabolisme protidique
- d- La déshydratation

27- La paraplégie est la paralysie :

- a- D'un hémicorps
- b- Des deux membres supérieurs
- c- Des deux membres inférieurs
- d- D'un membre inférieur

28- La parésie est une :

- a- Diminution de la motricité
- b- Absence totale de la motricité
- c- Diminution de la sensibilité
- d- Diminution des réflexes

29- Le terme d'amyotrophie signifie :

- a- Une augmentation du volume musculaire
- b- Une diminution du volume musculaire
- c- Une prolongation de la contraction musculaire
- d- Une malformation musculaire

30- Une de ces céphalées n'est pas d'origine vasculaire :

- a- Thrombose veineuse cérébrale
- b- Artérite de Horton
- c- Névralgie du trijumeau
- d- Dissection carotidienne

31- Dans l'algie vasculaire de la face on trouve :

- a- Un tic douloureux de Trousseau
- b- Une zone gâchette
- c- Des décharges électriques
- d- Un syndrome de Claude Bernard Horner

32- Dans le coma dépassé, on note :

- a- Un myosis
- b- Un ptosis
- c- Un strabisme
- d- Une mydriase

33- Les nerfs oculomoteurs sont :

- a- Le V, le VI et le VII
- b- Le IV, le V et le VI
- c- Le III, le IV et le VI
- d- Le IV, le V et le VII

34- La 11^{ème} paire crânienne est le :

- a- Spinal
- b- Le pneumogastrique
- c- Le grand hypoglosse
- d- Le glossopharyngien

35- L'hypertonie dans le syndrome pyramidal est :

- a- Plastique
- b- Spastique

- c- En roue dentée
d- Avec signe de Fromont
- 36- Les réflexes ostéotendineux dans le syndrome neurogène sont :
- Vifs, polycinétiques
 - Pendulaires
 - Diffusés
 - Abolis
- 37- La réponse du réflexe tricipital est une :
- Extension de l'avant-bras sur le bras
 - Flexion de l'avant-bras sur le bras
 - Flexion du poignet sur l'avant-bras
 - Extension de la jambe sur la cuisse
- 38- La démarche talonnante est en faveur d'une atteinte :
- Pyramidale
 - Neurogène périphérique
 - Cordonaire postérieure
 - Cérébelleuse
- 39- Dans l'atteinte cérébelleuse, la démarche est :
- Fauchante
 - Ebrieuse
 - Dandinante
 - Steppante
- 40- Lors de l'examen de la sensibilité profonde, on teste :
- La sensibilité algésique
 - La sensibilité thermique
 - La kinesthésie
 - La sensibilité extra-lemniscate
- 41- L'atteinte du nerf moteur oculaire externe se manifeste par :
- Un strabisme convergent
 - Un ptosis
 - Un strabisme divergent
 - Un nystagmus
- 42- L'examen de la force musculaire aux membres inférieurs fait appel entre autre à :
- L'épreuve doigt-nez
 - L'épreuve de Mingazzini
 - L'épreuve de Steward-Holmes
 - L'épreuve des marionnettes
- 43- l'épreuve talon-genou aide à tester :
- la sensibilité superficielle
 - la sensibilité profonde
 - la station debout et la marche
 - la coordination motrice
- 44- Le diabète sucré est défini par une glycémie veineuse à jeun
- < 1 g/l
 - ≥ 1.10 g/l
 - > 1.40 g/l
 - ≥ 1.26 g/l

- 45- Le diabète de type 2 est une maladie :
- a- Aiguë
 - b- Subaiguë
 - c- Chronique
 - d- Transmissible
- 46- La notion de l'hypoglycémie repose sur :
- a- La constatation synchrone de signes de neuroglycopenie et d'une glycémie basse
 - b- La non correction des symptômes après resucrage
 - c- Le seuil de glycémie de 0,50 g/l
 - d- Une sécrétion appropriée de l'insuline
- 47- Parmi les symptômes ci-dessous, quels sont ceux qui définissent l'hypothyroïdie ?
- a- Asthénie
 - b- Hypothermie
 - c- Thermophobie
 - d- Amyotrophie
- 48- L'hyperthyroïdie se caractérise par :
- a- Une prise de poids
 - b- Un myxoedème
 - c- Une constipation
 - d- Une tachycardie sinusale
- 49- Devant un goitre, quel est l'examen paraclinique à réaliser en 1^{ère} intention ?
- a- Echographie thyroïdienne
 - b- Scintigraphie thyroïdienne
 - c- Radiographie thoracique
 - d- Examen du cou
- 50- L'insuffisance surrénalienne est caractérisée par :
- a- Un excès de cortisol
 - b- Une hypotension artérielle
 - c- Un amaigrissement
 - d- Une frilosité

CORRIGE TYPE SEMIOLOGIE 1EMD 2018/2019

SUJET 3

1-D	21-C	41-A
2-AB/A	22-ACD	42-B
3-B	23-AC	43-D
4-C	24-B	44-D
5-D	25-B	45-C
6-ABC	26-BD	46-AC
7-D	27-C	47-AB
8-A	28-A	48-D
9-C	29-B	49-A
10-C	30-C	50-BC
11-B	31-D	
12-C	32-D	
13-AC	33-C	
14-AC	34-A	
15-B	35-B	
16-B	36-D	
17-C	37-A	
18-A	38-C	
19-BC	39-B	
20-AC	40-C	

PR H.MAHDJOUR