

## CONTRÔLE DE RATRAPAGE DE NEUROLOGIE

1/ L'apraxie constructive :

- A- Consiste à dessiner une forme géométrique
- B- Consiste à dessiner une image choisie par le malade
- C- Fait partie du test de FOLSTEIN
- D- Fait partie du CODEX test
- E- Explorée par le test de l'horloge

2/ Les absences typique sont des crises épileptiques caractérisées par :

- A- Une altération de l'état de conscience de brève durée
- B- A début et fin brusque
- C- Peuvent s'accompagner des clonies palpébrales
- D- EEG: Décharge bilatérale, synchrone et symétrique de pointes-ondes de fréquence >> 3 Hz
- E- De bon pronostic

3/ Les médicaments qui aggravent les crises myocloniques sont :

- A- Carbamazépine
- B- Valproate de sodium
- C- Gabapentine
- D- Vigabatrin
- E- Ethosuximide

4/ Les critères d'inclusion de la myasthénie gravis sont :

- A- Un ptosis bilatéral asymétrique
- B- Une atteinte de la musculature oculaire intrinsèque
- C- Incrément à l'ENMG
- D- Un décrément à l'ENMG
- E- Une positivité des anticorps anti muscle strié

5/ La gravité du syndrome de GUILLAIN BARRÉ est liée à :

- A- Une paralysie des quatre membres à prédominance proximale
- B- L'existence de troubles sensitifs
- C- Des troubles végétatifs
- D- Une hyperalbuminorachie
- E- Une phase d'extension supérieure à 04 semaines

6/ Le traitement corticoïde de la sclérose en plaques :

- A- Doit être continué en permanence
- B- Doit être réservé aux poussées
- C- Ne doit être jamais mis en œuvre
- D- Est capable de prévenir les récurrences
- E- Peut comporter des doses massives de manière transitoire

7/ Quel est le symptôme clinique évocateur d'une HEP

- A- Céphalée aigue
- B- Hémicrânie pulsatile
- C- Crise d'épilepsie généralisée
- D- Coma
- E- Hémiplégie massive

8/ L'accident ischémique transitoire (AIT) est à différencier de

- A- L'hémorragie méningée
- B- La migraine avec aura
- C- La crise épileptique partielle
- D- L'ictus amnésique
- E- Syndrome confusionnel

9/ La confusion mentale récurrente peut constituer :

- A- Une complication du syndrome démentiel
- B- Une forme clinique de l'état de mal épileptique
- C- Un diagnostic différentiel de la démence
- D- Une complication d'un traitement anticholinergique
- E- Une complication d'un traitement anticholinestérasiques

10/ Une démence associée à des myoclonies évoque :

- A- Une maladie d'ALZHEIMER
- B- Une maladie de PARKINSON
- C- Une maladie à prion
- D- Une épilepsie myoclonique
- E- Une démence à corps de LEWY



11/ Chez un parkinsonien de 65 ans, le traitement de choix repose sur :

- A- Les anti cholinergiques
- B- Les agonistes dopaminergiques
- C- La stimulation cérébrale profonde
- D- La L dopa associée
- E- La L-dopa à dose minimale efficace

12/ Les critères de la migraine sans aura sont :

- A- La survenue d'au moins cinq crises de céphalées migraineuses
- B- La survenue d'au moins deux crises de céphalées migraineuses
- C- Durant la céphalée au moins deux des caractères suivants :  
Nausées, vomissements, photophobie, phono phobie
- D- La crise de céphalées dure de 4 à 72 heures sans traitement
- E- La crise de céphalée dure de 4 à 48 heures sans traitement

13/ La maladie de FRIEDREICH

- A- Est à transmission autosomique dominante
- B- S'accompagne d'une cardiomyopathie hypertrophique
- C- S'accompagne d'une aréflexie ostéo tendineuse aux membres inférieurs
- D- Débute le plus souvent après l'âge de 25 ans
- E- Touche uniquement les garçons

14/ Quel est l'examen complémentaire le plus fiable pour le diagnostic d'une myopathie inflammatoire :

- A- Electromyogramme (EMG)
- B- Dosage des enzymes musculaires
- C- Biopsie musculaire
- D- Bilan immunologique
- E- Bilan inflammatoire

15/ Dans la SLA, les lésions touchent :

- A- La corne antérieure et postérieure de la moelle
- B- Le motoneurone périphérique au niveau du tronc cérébral
- C- Les cordons postérieurs de la moelle
- D- La fibre musculaire des membres supérieurs
- E- La fibre musculaire des membres inférieurs

## QUESTIONS DE NEUROCHIRURGIE

Q15-Le diagnostic le plus probable chez un patient de 30 ans présentant 06Heures après un traumatisme crânien une mydriase à gauche+hémiplégie droite, est un :

- A- Hématome sous dural aigu pariétal gauche.
- B- Hématome extradural pariétal gauche.
- C- Hématome sous dural aigu pariétal droit.
- D- Hématome extradural pariétal droit.
- E- Hématome sous dural chronique pariétal droit.

Q16- lequel des signes suivants n'est pas retrouvé dans une tumeur de l'angle pontocérébelleux :

- A- Les signes d'HIC.
- B- Le syndrome cérébelleux.
- C- Les troubles endocriniens.
- D- Les troubles auditifs.
- E- Les troubles visuels.

Q17-la ligne de Chamberlain permet le diagnostic d' :

- A- Une syringomyélie.
- B- Un syndrome de Klippel Feil.
- C- Une impression basilaire.
- D- Une malformation de DANDY-WALKER.
- E- Une malformation d'Arnold Chiari.

Q18-En cas d'une tumeur de la fosse cérébrale postérieure, on a :

- A- Des ventricules de taille normale.
- B- Une dilatation kystique du quatrième ventricule.
- C- Une hydrocéphalie biventriculaire.
- D- Une hydrocéphalie triventriculaire.
- E- Une hydrocéphalie tetraventriculaire.

Q19-un patient présentant : une ouverture des yeux à la douleur+confusion+localise la douleur, est scolaré selon l'échelle de GLASCOW à :

- A- 08/15.
- B- 09/15.
- C- 10/15.
- D- 11/15.
- E- 12/15.

Q20 - un patient atteint d'une fracture de l'étage moyen de la base du crane peut présenter :

- A- Des otoliquorrhées.
- B- Des rhinorrhées.
- C- Une atteinte du nerf facial.
- D- Une atteinte du nerf optique.
- E- Une atteinte de la huitième paire crânienne.

Compte Type

Recherche individuelle - 1 question par question

N°	Resp.
1	A, C, D
2	A, B, C, D
3	A, C, D
4	A, B, C
5	A
6	B
7	A
8	B, C, D
9	A, B, C
10	C
11	B
12	A, C, D
13	B, C
14	C
15	B
16	C
17	C
18	B
19	D
20	A, E

Copie Service