

1) le diagnostic à évoquer devant une surdité de perception endocochléaire est

- a) Une otite moyenne aigue
- b) Maladie de meniere
- c) Neurinome de l'acoustique
- d) Corps étranger du conduit auditif externe
- e) Une otite externe aigue

B

INESSMC
Bibliothèque C. J. et
Copy Service

2) une surdité de transmission peut être due à

- a) Une otite moyenne aigue
- b) Maladie de meniere
- c) Neurinome de l'acoustique
- d) Corps étranger du conduit auditif externe
- e) Otite externe aigue

A . D . E

3) l'épistaxis peut être due à

- a) Un cancer de l'ethmoïde
- b) Un cancer du cavum
- c) une hémophilie
- d) Une déviation de la cloison nasale
- e) Un fibrome naso-pharyngien

ABCE

4) le cancer du larynx

- a) est fréquent chez les hommes
- b) se manifeste par une dysphonie, une dysphagie et une dyspnée
- c) le tabac est un facteur prédisposant
- d) son étiologie est étroitement liée à l'EBV (le virus Epstein-Barr)
- e) le type histologique le plus fréquent est le carcinome épidermoïde

ABCE

5) L'évolution spontanée d'un cholestéatome de l'oreille moyenne :

- a) Se fait vers la guérison
- b) Peut donner des complications
- c) Peut mettre en jeu le pronostic vital
- d) Peut entraîner une extériorisation rétro-auriculaire
- e) Peut se faire vers l'installation d'une paralysie faciale

BCDE

6) Une dyspnée aigue dans les suites immédiates d'une thyroïdectomie totale doit faire craindre

- a) Un cancer du larynx
- b) Un cancer de la thyroïde
- c) Un stridor laryngé congénital
- d) Une paralysie bilatérale des cordes vocales
- e) Une laryngite réactionnelle

D

7) la forme topographique la plus fréquente des sinusites de l'enfant est

- a) la sinusite frontale
- b) la sinusite maxillaire
- c) l'ethmoïdite aigue
- d) la sinusite sphénoïdale
- e) la pan sinusite

C

8) L'obstruction nasale peut être causée par

- a) Une polypose naso-sinusienne
- b) Cancer du cavum
- c) une tumeur bénigne du cavum
- d) Une déviation de la cloison nasale
- e) Une imperforation des choanes

ABCDE

9) quels sont les critères qu'on doit rechercher pour identifier l'épistaxis grave

- a) L'abondance
- b) La bilatéralité du saignement (saignement par les deux narines)
- c) L'association épistaxis antérieure et postérieure
- d) La répétition
- e) La fragilité du terrain

ADE

10) Un syndrome de pénétration chez un enfant impose

- a) Un traitement médical et un suivi en ambulatoire
- b) Une bronchoscopie exploratrice
- c) Une hospitalisation en urgence
- d) Une hospitalisation, si persistance des symptômes après traitement médical en ambulatoire
- e) Une radiographie thoracique

BCE

11) Le diagnostic de certitude d'une angine bactérienne repose sur :

- a) Les signes fonctionnels
- b) L'examen de l'oropharynx
- c) FNS
- d) La sérologie
- e) Le prélèvement de gorge avec examen bactériologique.

E

12) Les critères de gravité d'une dyspnée laryngée sont :

- a) La durée au-delà d'une heure
- b) L'installation de troubles de la conscience
- c) L'apparition d'irrégularités du rythme respiratoire
- d) L'apparition de sueurs
- e) L'hypertension artérielle

ABCDE

13) Le syndrome vestibulaire périphérique traduit

- a) Une hyperpression du liquide exolymphatique.
- b) Une hyperpression du liquide endolymphatique.
- c) Une fistule labyrinthique
- d) Un neurinome de l'acoustique.
- e) La maladie de meniere

bcde

14) la surdité de transmission traduit une atteinte de

- a) oreille externe
- b) l'oreille interne
- c) le nerf auditif
- d) l'oreille moyenne
- e) le tympan

ADE

INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

15) Le tabac est un facteur de risque de

- a) Cancer du larynx
- b) Cancer du cavum
- c) Cancer de l'ethmoïde
- d) Paralysie des deux cordes vocales
- e) Les laryngites chroniques

A-E

16) les diagnostics à évoquer devant une dysphonie, sont

- a) Papillomatose laryngée
- b) Cancer du larynx
- c) Paralysie d'une corde vocale
- d) Polype de la corde vocale
- e) Laryngite chronique

ABCDE

17) les diagnostics à éliminer pour poser le diagnostic d'une épistaxis sont

- a) Un saignement en provenance du cavum
- b) Un saignement en provenance des sinus
- c) Une hémoptysie
- d) Une hématomérose
- e) Toutes les réponses sont justes

CD

18) La biopsie est contre-indiquée dans

- a) le cancer du cavum
- b) le cancer du larynx
- c) les tumeurs bénignes du larynx
- d) le fibrome nasopharyngien
- e) le cancer de la langue

D

19) la diphtérie :

- a) se manifeste par une angine érythémateuse
- b) se manifeste par une angine vésiculeuse
- c) se manifeste par une angine pseudomembraneuse
- d) c'est une urgence médicale
- e) impose l'hospitalisation

CDE

20) le diagnostic de certitude de cancer du cavum est posé par

- a) TDM
- b) IRM
- c) sérologie d'EBV (Epstein Barr virus)
- d) la biopsie
- e) la nasofibroscopie

D.