

1. un homme âgé de 54 ans alcoolo-tabagique qui présente une dysphonie depuis 03 mois quels sont les deux premiers diagnostiques à évoquer:
 - a) sarcoïdose laryngée
 - b) polype de la corde vocale
 - c) Dysplasie laryngée
 - d) papillomatose laryngée juvénile
 - e) Cancer du larynx

2. La surdité est endocochléaire dans :
 - a) L'otite moyenne aiguë
 - b) L'otite sero muqueuse
 - c) L'otite externe
 - d) L'hydrops endolymphatique
 - e) Le neurinome de l'acoustique

3. Devant une obstruction nasale unilatérale, avec rhinorrhée fétide homolatérale chez un enfant de 4 ans, le diagnostic le plus probable :
 - a) Déviation de la cloison nasale
 - b) Atrésie des choanes
 - c) Un corps étranger intra-nasal
 - d) Fracture des os propres du nez
 - e) Une polypose nasale

4. Pour le cancer du cavum :
 - a) Le type histologique le plus fréquent est le lymphome
 - b) Le tabac est le facteur de risque le plus important
 - c) Ce cancer a une relation évidente avec l'EBV
 - d) Les métastases sont rares
 - e) Est fréquent surtout dans les pays occidentaux

5. Les fausses membranes de la diphtérie sont :
 - a) Détachables
 - b) Respectant la luette
 - c) Hémorragique
 - d) Non confluyente
 - e) Adhérente

6. L'otite externe maligne nécrosante :
- Est plus fréquente chez les sujets âgés
 - Est un cancer de l'oreille externe
 - Touche surtout les diabétiques
 - Peut aussi évoluer sur tous les terrains immunodéficients
 - Le germe le plus souvent en cause est le *Pseudomonas aeruginosa*
7. L'otite moyenne chronique cholésteatomateuse :
- Elle est dite dangereuse
 - Elle peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel
 - Elle peut mettre en jeu le pronostic vital
 - Elle expose inévitablement à la survenue de complications
 - Elle peut guérir spontanément
8. On doit hospitaliser en urgence :
- La dyspnée laryngée
 - L'angine diphtérique
 - L'épistaxis grave.
 - L'angine syphilitique
 - Le corps étranger intra bronchique
9. Dans les sinusites maxillaires aiguës :
- La douleur est sous orbitaire
 - La rhinoscopie montre du pus au niveau du méat moyen
 - La TDM est systématique
 - Est toujours d'origine dentaire
 - Est toujours bilatérale
10. Devant une tuméfaction cervicale chronique on doit éliminer les fausses tuméfactions suivantes :
- L'apophyse transverse de l'atlas
 - La grande corne de l'os hyoïde
 - Kyste du tractus thyroïdien
 - Nodule thyroïdien
 - Kyste amygdaloïde.
11. La paralysie laryngée bilatérale en fermeture :
- On a une dyspnée et une aphonie
 - On a une dyspnée et une voix normale
 - On a une dysphonie sans dyspnée
 - C'est une urgence
 - C'est le syndrome de Ziemssen

12. L'otospongiose :

- a) Est une ankylose de l'articulation incudo-stapedienne
- b) Réalise une surdité de transmission à tympan fermé
- c) Fréquente chez l'homme
- d) Le traitement est médical
- e) L'audition s'améliore lors des grossesses

13. L'hyperlaxité excessive des structures du larynx avec aspiration de la margelle laryngée lors de l'inspiration est :

- a) Une papillomatose laryngée
- b) Un stridor laryngé congénital essentiel
- c) Une laryngomalacie
- d) Une laryngite sous glottique
- e) Une paralysie des dilatateurs du larynx

14. Une fracture des os propres du nez OPN non déplacée qui remonte à 10 jours nécessite

- a) Une réduction sous anesthésie locale
- b) Une réduction sous anesthésie générale
- c) Une septoplastie
- d) Une rhinoplastie
- e) Une abstention thérapeutique

15. La dyspnée laryngée

- a) Est une bradypnée inspiratoire
- b) Est une polypnée
- c) Est une bradypnée expiratoire
- d) Peut se voir dans un stade avancé du cancer du larynx
- e) Peut se voir dans l'asthme mal équilibré

16. la papillomatose laryngée de l'enfant :

- a) Est une tumeur maligne
- b) Se manifeste par une dysphonie
- c) Se manifeste par une dyspnée
- d) Le traitement repose sur la radiothérapie
- e) Son diagnostic est radiologique

17. Phlegmon péri amygdalien (PPA)

- a) Se manifeste par la triade : tuméfaction (voussure) du voile du palais, œdème de la luette et trismus
- b) Souvent secondaire à une prise d'AINS.
- c) Son traitement est médical : antibiotique et arrêt des AINS.
- d) Son traitement est médical : antibiotique et des AINS.
- e) Son traitement est medico chirurgical

18. Herpangine :

- a) Infection par le virus COXSACKIE du groupe A
- b) Touche surtout l'adulte jeune et les adolescents à état général médiocre
- c) Un herpès labial et narinaire est souvent associé
- d) Due au virus herpès simplex VHS
- e) Elle est souvent virale (EBV, oreillons, grippe, rougeole, rubéole....)

19. L'otite moyenne aigue

- a) Est virale dans 80 % des cas
- b) Se manifeste par une otalgie reflex
- c) L'otalgie est plus importante après la perforation
- d) L'otalgie peut manquer
- e) L'otoscopie montre toujours une perforation punctiforme du tympan

20. Dans le vertige paroxystique positionnel bénin VPPB

- a) La surdit  est unilat rale
- b) Le vertige est spontané durant 30 minutes
- c) Du a un hydrops
- d) Le vertige est provoqué par une position d termin e de la t te
- e) Le vertige est d clench  par un stress intense

Un homme de 75 ans fumeur et alcoolique vient vous voir, pour une tuméfaction cervicale latérale et indolore, qui évolue depuis 4 mois. Le malade est dysphonique, et rapporte la notion d'une dysphagie avec une perte de 10 kg dans les 4 derniers mois.

A l'inspection cette masse est à peau de recouvrement normale, sans cicatrice ni fistule, et à la palpation elle est ferme et indolore.

21) Devant une tuméfaction cervicale chronique et latérale, on doit évoquer :

- a) Une adénopathie
- b) Une tumeur du corpuscule carotidien
- c) Un kyste du tractus thyroïdien
- d) Un goitre
- e) Une tumeur de la parotide

22) Parmi ces diagnostics quels sont les plus probables :

- a) Cancer du larynx avec une métastase ganglionnaire
- b) Cancer du pharynx avec une métastase ganglionnaire
- c) Cancer du cavum avec une métastase ganglionnaire
- d) Cancer de l'ethmoïde avec une métastase ganglionnaire
- e) une métastase ganglionnaire d'un cancer des VADS.

23) Pour ce malade, vous allez demander :

- a) Un scanner cervico-facial.
- b) Une pan-endoscopie avec biopsie
- c) Une échographie de la thyroïde
- d) Un scanner du cavum
- e) Une cavoscopie

Vous avez confirmé votre diagnostic, et vous avez proposé un traitement à votre patient, ce dernier a refusé votre option thérapeutique. Mais 2 mois après, il revient la nuit aux urgences, pour une dyspnée grave.

24) Parmi ces signes lesquels sont en faveur d'une dyspnée grave

- a) Pause respiratoire
- b) Cyanose
- c) Somnolence
- d) tachycardie
- e) Sueur

25) le geste à faire en urgence est :

- a) Intubation en urgence
- b) Intubation après échec de la corticothérapie
- c) Une trachéotomie en urgence
- d) Une trachéotomie après échec de l'intubation
- e) Une trachéotomie après échec de la corticothérapie.

Un garçon de 12 ans vient vous voir, pour une obstruction nasale droite qui dure depuis 3 mois, une otalgie droite, une hypoacousie droite, épistaxis du même côté et des céphalées

26. L'examen doit comporter :

- a) Une otoscopie
- b) Une rhinoscopie antérieure
- c) Une rhinoscopie postérieure
- d) Une palpation du cou
- e) Une audiométrie

27. Quelles sont les deux diagnostics les plus probables

- a) Fibrome nasopharyngien
- b) Cancer de l'éthmoïde
- c) Cancer du cavum
- d) Déviation de la cloison nasale
- e) Un corps étranger intranasal

L'otoscopie de l'oreille droite montre un tympan rétracté et l'audiométrie une surdité de transmission à droite avec une courbe droite à l'impédancemétrie. L'échographie cervicale a montré des adénopathies cervicales à droite de 3 cm de diamètre, une cytoponction de ces adénopathies est revenue en faveur d'une métastase d'un carcinome.

28. L'aspect otoscopique et l'audiométrie sont en faveur de :

- a) Otite moyenne aigue droite
- b) Otite externe droite
- c) Otite moyenne chronique droite
- d) Otalgie reflex
- e) Otite moyenne sero-muqueuse droite.

29. Parmi ces diagnostics, quel est le diagnostic le plus probable

- a) Un fibrome nasopharyngien
- b) Un cancer du cavum type UCNT
- c) Un lymphome malin
- d) Un cancer de la thyroïde avec métastase ganglionnaire
- e) Un cancer du cavum type sarcome

30. ce diagnostic (q 29) est étroitement lié à un virus, le quel ?

- a) VIH
- b) EBV
- c) COXSACKIE virus A
- d) Rétrovirus
- e) Papilloma virus

Corrigé Type

N°	Rép.
1	CE
2	D
3	C
4	C
5	CE
6	ACDE
7	ABCD
8	ABCE
9	AB
10	AB
11	BD
12	AB
13	BC
14	E
15	AD
16	BC
17	ABE
18	A
19	AD
20	D
21	X
22	X
23	X
24	X
25	X
26	X
27	X
28	X
29	X
30	X

Chez Yacine
BIBLIOTHÈQUE Chalet
Copy Service

N°	Rép.
1	X
2	X
3	X
4	X
5	X
6	X
7	X
8	X
9	X
10	X
11	X
12	X
13	X
14	X
15	X
16	X
17	X
18	X
19	X
20	X
21	ABE
22	ABE
23	AB
24	ABCDE
25	C
26	ABCDE
27	AC
28	E
29	B
30	B

Chez Yacine
NESSMC
 Bibliothèque Chalet
 Copy Service