

Examen de rattrapage

- 1- Les IM deviennent fréquentes parce que :
- a- Il ya poly pathologie
 - b- Les molécules sont plus puissantes
 - c- Les combinaisons médicamenteuses plus fréquentes
 - d- Les malades sont plus âgés
 - e- Il ya automédication
- 2- Les ultraviolets interagissent avec :
- a- Les médicaments d'anesthésie
 - b- Les corticoïdes injectables
 - c- Avec l'Isuprel
 - d- Avec les antibiotiques
 - e- Avec les tétracyclines
- 3- L'Association d'un AINS avec antidiabétique sulfamide entraine :
- a- Un effet anti inflammatoire augmenté
 - b- Une inhibition de l'effet anti diabétique
 - c- Une fraction libre du Sulfamidé augmentée
 - d- Une hypoglycémie
 - e- Une hémorragie digestive
- 4- Le SINTROM est un anticoagulant qui interagit avec :
- a- Les AINS
 - b- Les corticoïdes
 - c- Les antibiotiques
 - d- La vitamine C
 - e- L'Aspirine
- 5- L'interaction au niveau du rein se fait par compétition
- a- Les diurétiques sont préférentiellement éliminés
 - b- L'élimination de l'acide urique est retardé
 - c- Il se produit une hyper uricémie
 - d- Parfois apparition d'une goutte
 - e- Les pénicillines peuvent précipiter une goutte

Dr. A. BOUGUERBA

SPÉCIALISTE

Médecine Interne

6- Parmi ces erreurs citez celles qui relèvent des erreurs de fond d'une ordonnance :

- a- Oubli du nom et prénom
- b- Oubli de la signature
- c- Prescription de 02 médicaments de la même famille
- d- L'oubli de l'âge du malade
- e- Les interactions médicamenteuses

7- Parmi les cinq médicaments suivants quels sont ceux qui sont responsables d'IM

- a- Le Sintrom
- b- La digoxine
- c- L'allopurinol
- d- La rifampicine
- e- Le phénobarbital

8- L'ostéomalacie post gardénal est due à : (cochez (la) ou (les) réponses justes)

- a- Le gardénal inhibe l'absorption du calcium
- b- Le gardénal avec l'élimination urinaire du calcium
- c- Il accélère l'élimination du phosphore
- d- Le gardénal est un inducteur de la vitamine D
- e- Il (gardénal) compétitif antagoniste de la vitamine D

9- Avant toute chimiothérapie 03 examens sont indispensables, lesquelles ?

- a- Une FNS
- b- Une créatinémie plasmatique
- c- Une scintigraphie osseuse
- d- La recherche des marqueurs tumoraux
- e- Un ECG

10- Dans une compression médiastinale le tableau clinique est fait : (cochez (la) ou (les) réponses justes)

- a- Une dyspnée
- b- Un œdème de la face
- c- Télangiectasies
- d- troubles sensitifs des membres supérieurs
- e- Troubles moteurs des membres supérieurs

11- Le phénobarbital inhibe l'action de la pilule parce-que :

- a- Il inhibe son absorption digestive
- b- Il bloque son action au niveau du récepteur
- c- Il est antagoniste
- d- Il est inducteur hépatique
- e- Il stimule la sécrétion de FSH

- 12- La prise en charge d'un sujet âgé est difficile parce que :
- a- Il est âgé
 - b- Il est caractérisé par une sémiologie particulière
 - c- La pharmacocinétique est différente de celle de l'adulte
 - d- Il présente un déclin des principales fonctions physiologiques
 - e- Parce que le risque d'accident est difficile à évaluer
- 13- La prescription d'un antalgique est régie par trois règles lesquelles :
- a- Le bon antalgique
 - b- Le bon dosage
 - c- Le bon moment
 - d- La bonne diffusion
 - e- Le bon prix
- 14- Parmi les accidents des diurétiques chez le sujet âgé, quels sont les 02 pl
- a- L'hypokaliémie
 - b- L'asthénie
 - c- La déshydratation
 - d- L'hyper-uricémie
 - e- L'anorexie
- 15- L'excès de nociception se voit dans : (cochez (la) ou (les) réponses fausses)
- a- Les traumatismes
 - b- L'inflammation
 - c- Les tumeurs
 - d- Le zona
 - e- L'hystérie
- 16- Citez les 02 effets secondaires les plus fréquents en matière de corticothérapie
- a- l'ostéoporose
 - b- l'ostéomalacie
 - c- les effets gastro-intestinaux
 - d- les infections
 - e- l'hypokaliémie
- 17- quelle est l'échelle d'appréciation probable de l'intensité de la douleur le plus
- a- Echelle visuelle analogique
 - b- Echelle verbale simple
 - c- Echelle numérique
 - d- Echelle de sédation
 - e- Echelle de comportement

- 18- Les interactions médicamenteuses sont nocives dans les situations suivantes sauf une :
- a- Dans le traitement des cardiopathies
 - b- Dans le traitement du diabète
 - c- Dans le traitement neuropsychiatrique
 - d- Dans le traitement de la syphilis
 - e- En matière d'antibiothérapie

- 19- Parmi les effets secondaires suivants quels sont ceux des AINS :
- a- Ostéoporose
 - b- Néphropathie
 - c- hémorragies digestives
 - d- Allergie
 - e- Mycose buccale

- 20- Parmi les effets secondaires suivants quels sont ceux du cyclophosphamide :
- a- Cystite hémorragique
 - b- Alopécie
 - c- Aplasie médullaire
 - d- Insuffisance rénale
 - e- Réaction idiosyncrasique

Dr. A. BOUGUERBA

SPESIALISTE

Médecine Interne