

Contrôle de rattrapage
Durée de l'épreuve 30 minutes
(Cet examen comprend 20 QCM)

- 1- Parmi les propositions suivantes une seule est pathognomonique du glaucome congénital la quelle ?
- A- la buphtalmie ;
 - B- le larmoiement purulent ;
 - C- la douleur ;
 - D- la rougeur ;
 - E- l'hémorragie sous conjonctivale.
- 2- Parmi les signes suivants un seul est présent dans le glaucome chronique à angle ouvert lequel ?
- A- une élévation de la pression intra oculaire ;
 - B- un œdème papillaire ;
 - C- des douleurs oculaires ;
 - D- une baisse précoce de l'acuité visuelle ;
 - E- des anomalies de l'angle iridocornéen à la gonioscopie.
- 3- Quelle est la proposition erronée parmi les assertions suivantes ?
- A- le traitement du glaucome congénital est médical ;
 - B- le traitement du glaucome congénital est exclusivement chirurgical ;
 - C- le glaucome congénital touche le nourrisson ;
 - D- dans le glaucome congénital le diamètre cornéen est augmenté ;
 - E- le pronostic visuel dans le glaucome congénital est mauvais.
- 4- La valeur normale de la pression intra-oculaire chez l'adulte est comprise entre :
- A- 10 et 20 mmHg ;
 - B- 20 et 30 mmHg ;
 - C- 5 et 10 mmHg ;
 - D- 25 et 35 mmHg ;
 - E- supérieure à 30 mmHg.
- 5- Quel est le médicament susceptible de déclencher une crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle ?
- A- parasymphaticomimétique ;
 - B- hypotenseur ;
 - C- sympathicomimétique ;
 - D- sympathicolytique ;
 - E- bétabloquant.
- 6- Parmi les signes suivants un ne caractérise pas le traumatisme oculaire contusif lequel ?
- A- l'hyphéma ;
 - B- la subluxation cristallinienne ;
 - C- le décollement de rétine ;
 - D- l'iridodialyse ;
 - E- l'endophtalmie.

- 7- Le grade 4 de la classification pronostique des brûlures chimiques de Ropper-hall correspond à :
- A- une désépithélialisation cornéenne isolée.
 - B- une opacité cornéenne mais détails de l'iris visibles.
 - C- une désépithélialisation cornéenne totale.
 - D- ischémie affectant entre un tiers et la moitié de la circonférence limbique.
 - E- ischémie affectant plus de la moitié de la circonférence limbique.

8- Parmi les assertions suivantes une seule est erronée laquelle ?

- A- le trachome est une kératoconjonctivite contagieuse ;
- B- la bactérie qui en est responsable est sensible aux cyclines et aux bêta-lactamines ;
- C- le trachome est caractérisé par la formation de follicules et d'une hyperplasie papillaire ;
- D- l'opacité cornéenne est parmi les complications de cette maladie ;
- E- l'entropion trichiasis secondaire au trachome nécessite une cure chirurgicale.

9- Quelle est la proposition correcte parmi les assertions suivantes ?

- A- le rétinoblastome est une tumeur maligne de la rétine neurosensorielle ;
- B- cette tumeur est l'apanage de l'adulte jeune ;
- C- le rétinoblastome est une tumeur bénigne ;
- D- l'évolution du rétinoblastome est favorable ;
- E- le rétinoblastome est une tumeur de la choroïde.

10- Désignez la proposition erronée parmi les assertions suivantes :

- A- le mélanome malin de la choroïde est la tumeur endoculaire la plus fréquente de l'adulte ;
- B- c'est une tumeur hormonosensible ;
- C- c'est une tumeur radiosensible ;
- D- l'échographie abdominale fait partie de son bilan d'extension ;
- E- c'est une tumeur hautement métastatique.

11- Parmi les assertions suivantes concernant la crise de glaucome par fermeture de l'angle iridocornéen (GFA), quelle est celle qui est erronée ?

- A- l'angle est toujours fermé ;
- B- l'œil est prédisposé anatomiquement ;
- C- l'œil est myope ;
- D- il constitue une urgence médicale ;
- E- le traitement comporte entre autres un myotique.

12- Un œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle peut révéler :

- A- un glaucome primitif à angle ouvert ;
- B- une uvéite antérieure ;
- C- une conjonctivite bactérienne ;
- D- une épisclérite ;
- E- ou une conjonctivite printanière.

13- Parmi les signes suivants quel est celui qui ne caractérise pas La rétinopathie diabétique non proliférante ?

- A- des croisements artério-veineux pathologiques ;
- B- des exsudats rétinien ;
- C- des nodules cotonneux ;
- D- des hémorragies rétinien superficielles et profondes ;
- E- des microanévrismes.

14- Parmi les propositions suivantes une seule définit la rétinopathie diabétique proliférante laquelle ?

- A- les follicules ;
- B- les vaisseaux rétinien anormaux hyperfluorescents à l'angiographie ;
- C- le panus ;

- D- la diplopie ;
- E- les exsudats maculaires.

15- Parmi les signes suivants quel est celui qu'on n'observe pas en cas de rétinopathie hypertensive ?

- A- un œdème papillaire ;
- B- des artères grêles filiformes ;
- C- des hémorragies rétiniques ;
- D- des exsudats circonfusés ;
- E- une mydriase aréflexique.

16- Quel est l'élément qui ne constitue pas l'uvéa, parmi les propositions suivantes ?

- A- rétine ;
- B- choroïde ;
- C- corps ciliaire ;
- D- iris ;
- E- procès ciliaires.

17- Quel est le signe qui définit la paralysie oculomotrice ?

- A- la diplopie monoculaire ;
- B- la diplopie binoculaire ;
- C- l'iridodialyse ;
- D- l'iridodonesis ;
- E- la douleur oculaire.

18- Quel signe recherchez-vous pour étayer le diagnostic d'une conjonctivite à adénovirus ?

- A- l'apparition sporadique ;
- B- l'hyphéma ;
- C- la douleur ;
- D- les sécrétions purulentes ;
- E- la présence d'une adéno-pathie pré-auriculaire.

19- Quel est l'effet secondaire oculaire des corticoïdes locaux et généraux ?

- A- l'uvéite ;
- B- le larmoiement ;
- C- l'hyphéma ;
- D- l'hypertonie oculaire ;
- E- l'hypertrophie des glandes lacrymales.

20- Parmi les critères réfractifs suivants quel est celui qui définit l'œil myope ?

- A- la longueur axiale est inférieure à 23 mm ;
- B- la longueur axiale est supérieure à 23 mm ;
- C- la vision de loin est nette ;
- D- la vision de près est perturbée ;
- E- la correction optique se fait par des verres convexes.