

DERMA1b

Université de Constantine

Faculté de médecine

Année universitaire 2012/2013

Module de Dermatologie, 1<sup>ère</sup> rotation, le 08 Octobre 2012

- 1- La dermatite atopique :
  - a- Débute le plus souvent chez le nourrisson
  - b- Peut débiter à l'âge adulte
  - c- la guérison se voit à l'âge adulte
  - d- a+b
  - e- b+c
- 2- La dermatite atopique
  - a- Est une réaction d'hypersensibilité de type IV
  - b- Siège aux plis
  - c- Les émoullients sont indiqués pour lutter contre la xérose cutanée
  - d- a+c
  - e- b+c
- 3- Que préconisez vous à un patient hospitalisé pour une lésion de leishmaniose cutanée de la joue, venant de terminer une cure de Glucantime \* avec persistance de la symptomatologie?
  - a- Refaire avant sa sortie un prélèvement pour examen direct
  - b- Refaire un prélèvement pour examen direct dans 2 semaines
  - c- Continuer de lui administrer du Glucantime\* jusqu'à affaïssement de la lésion
  - d- Effectuer des infiltrations intralésionnelles de Glucantime\*
  - e- Faire un bilan hépatique et rénal
- 4- L'eczéma de contact :
  - a- Peut se voir dès le premier contact avec l'allergène
  - b- Peut se voir après 20 contacts avec le l'allergène
  - c- Est une réaction d'hypersensibilité de type immédiate
  - d- Les ultraviolets jouent un rôle dans sa pathogénie
  - e- Aucune réponse est juste
- 5- Le carcinome basocellulaire :
  - a- Est le plus fréquent des carcinomes cutanés
  - b- Siège le plus souvent sur les zones photoprotégées
  - c- Se présente le plus souvent sous la forme d'une tumeur ulcérée ou végétante
  - d- A une malignité strictement locale
  - e- Donne des métastases dans 30% des cas
- 6- Le carcinome épidermoïde :
  - a- Est une tumeur maligne d'origine kératinocytaire
  - b- A une malignité strictement locale
  - c- Ne siège jamais sur les muqueuses
  - d- Est le plus fréquent des carcinomes cutanés après 50 ans
  - e- Peut être strictement intra épidermique

- 7- La prévention du mélanome nécessite :
- a- La surveillance régulière des sujets à haut risque
  - b- L'éviction des expositions solaires intenses et répétées
  - c- L'exercice préventive des naevi communs
  - d- L'éducation des patients à l'auto surveillance
  - e- L'utilisation d'une protection vestimentaire adaptée lorsque l'exposition ne peut être évitée
- 8- La peau assure à l'organisme une protection:
- a- mécanique
  - b- contre le rayonnement solaire
  - c- contre l'hyperthermie
  - d- contre l'hypothermie
  - e- antimicrobienne
- 9- Chez une patiente chez qui on suspecte un psoriasis des plis sous-mammaires, quels sont les territoires à examiner à la recherche d'autres lésions psoriasiques afin de conforter votre diagnostic ?
- a- Cuir chevelu
  - b- Omphalique
  - c- Ongles
  - d- Sillon interfessier
  - e- Paumes des mains et plantes des pieds
- 10- Une dermatophytie de la peau glabre se caractérise par :
- a- Extension centrifuge
  - b- Pourtour vésiculeux
  - c- Plaque érythémateuse
  - d- Pourtour émiété
  - e- Squames épaisses
- 11- Les levures du genre Candida peuvent être responsables des affections suivantes :
- a- Vaginite
  - b- Muguet du nourrisson
  - c- Teigne du cuir chevelu
  - d- Perleche
  - e- Intertrigo
- 12- Le chancre syphilitique est caractérisé par une ulcération :
- a- Profonde
  - b- Infiltrée
  - c- Suintante
  - d- Bien limitée
  - e- Ulcérations multiples
- 13- Au sujet de l'urticaire chronique :
- a- Dermatose papuleuse
  - b- Evolution de plus de 6 mois
  - c- Le plus souvent idiopathique
  - d- Plus douloureux que prurigineux
  - e- Ne répond jamais aux antihistaminiques (anti H1)
- 14- Les dermocorticoïdes sont contre indiqués dans le traitement de :
- a- Psoriasis
  - b- Pemphigoïde bulleuse
  - c- Impétigo
  - d- Rosacée
  - e- Gâle

- 15- Quelles sont les dermatoses d'origine virale :
- a- La gâle
  - b- La leishmaniose cutanée
  - c- Les verrues vulgaires
  - d- La gingivostomatite herpétique
  - e- L'exanthème subit du nourrisson
- 16- L'ulcère de jambe d'origine artérielle :
- a- Est toujours précédé par une claudication intermittente des membres inférieurs
  - b- Souvent profond
  - c- Souvent douloureux
  - d- Nécessite une prise en charge multidisciplinaire
  - e- Peut être associé à un ulcère veineux
- 17- Des anticorps sériques anti-peau sont retrouvés au cours de :
- a- Zona
  - b- Pemphigoïde bulleuse
  - c- Erythème polymorphe bulleux
  - d- Pemphigus vulgaire
  - e- Porphyrie cutanée tardive
- 18- Parmi les lésions cutanées suivantes, indiquez celle(s) qui contient(nent) du staphylocoque :
- a- Furoncle
  - b- Ecthyma
  - c- Exanthème scarlatine
  - d- Impétigo
  - e- Erythème polymorphe
- 19- Parmi les définitions suivantes indiquez celle qui correspond à l'érysipèle :
- a- Dermatose bulleuse aiguë
  - b- Dermo-épidermite aiguë
  - c- Nécroépidermolyse aiguë
  - d- Dermo-hypodermite aiguë
  - e- Aucune des définitions précédentes
- 20- Le syndrome de Sézary est une érythrodermie chronique sèche secondaire à :
- a- Un lymphome cutané T
  - b- Une leucémie
  - c- Une maladie de Hodgkin
  - d- Une toxicité médicamenteuse
  - e- Une infection bactérienne

FIM

*2 inc*  
= Corrigé Typ

N°	Réponse
1	D
2	C
3	B
4	B
5	AD
6	AE
7	ABDE
8	ABCDE
9	ABCDE
10	AB
11	ABDE
12	BCDE
13	AC
14	CDE
15	CDE
16	BCDE
17	BD
18	AD
19	D
20	A