

1. Au cours de la gale humaine, deux des cinq régions suivantes ne sont pas prurigineuses
- a) Le cuir chevelu
 - b) Les coudes (face postérieure)
 - c) Le dos
 - d) L'ombilic
 - e) Les poignets
2. Les cellules de Langerhans :
- a) Constituent la grande majorité des cellules épidermiques
 - b) Présentes dans l'épiderme et le derme
 - c) Sont mobiles et libres
 - + d) Ont une fonction de présentation antigénique aux lymphocytes
 - e) Ont une fonction neuro-sécrétoire
3. Les zones de prédilection des lésions de dermatite atopique chez le nourrisson sont :
- > a) Joues
 - b) Pointe du nez
 - c) Fesses
 - d) Plante des pieds
 - e) Pouce sucé
4. Concernant les pédiculoses, quelles sont les propositions justes :
- a) La transmission interhumaine
 - b) Les localisations au cuir chevelu peuvent se surinfecter
 - c) Les localisations pubiennes se transmettent souvent par contact sexuel
 - d) Le traitement des lésions du cuir chevelu n'est pas efficace si les cheveux sont rasés
 - e) Les poux et les lentes sont invisibles à l'œil nu
5. Le vecteur des leishmanies est :
- a) Un moustique
 - b) Une tique
 - c) Une mouche
 - d) Un phlébotome.
 - e) Une punaise
6. Parmi ces formes cliniques de mélanome, celle qui touche uniquement préférentiellement chez le sujet âgé est :
- a) Le mélanome à extension superficielle
 - b) Le mélanome de Dubreuil
 - c) Le mélanome nodulaire
 - d) Le mélanome muqueux
 - e) Le mélanome acro-lentiginéux

7. L'urticaire cholinergique :
- a) Peut être déclenché par la sudation
 - b) Déclenché par le froid
 - c) Se présente cliniquement par des petites papules oedémateuses
 - d) Associée à des signes de vascularite
 - e) Traitée par des antihistaminiques.
8. Le pronostic des mélanomes est conditionné par :
- a) L'indice de Clark
 - b) La taille de la tumeur
 - c) L'indice de Breslow
 - d) Présence de petites ulcérations en surface
 - e) L'ancienneté de la tumeur
9. Les végétations sont :
- a) Excroissances papillomateuses de consistance molle
 - b) Excroissances papillomateuses de consistance dure hyper kératosique
 - c) Lésions sèches plus larges qu'épaisses
 - d) Épaississement de la peau avec exagération de ses sillons cutanés
 - e) Toutes les réponses sont fausses.
10. La sclérose dermique est :
- a) Une diminution de l'épaisseur globale du derme
 - b) Un épaississement de la couche cornée
 - c) Un épaississement du collagène qui devient très horizontal
 - d) Une exagération du dessin des papilles et des crêtes inter papillaires
 - e) Une augmentation de l'épaisseur globale de l'épiderme
11. Le diagnostic différentiel des furoncles se fait avec :
- a) Les folliculites à BGN - superficielles - à étiologie bactérienne
 - b) L'impétigo
 - c) L'acné pustuleuse à microbes
 - d) Le zona
 - e) La rosacée
12. L'antibiothérapie lors d'un premier épisode d'érysipèle fait appel à :
- a) La pénicilline G
 - b) L'oxacilline
 - c) La doxycycline
 - d) L'extencilline
 - e) L'acide fucidique en topique
13. Que doit-on faire devant un VDRL positif et un TPHA négatif :
- a) Refaire une deuxième sérologie
 - b) Débuter un traitement par extencilline à la dose de 2.4 MUI
 - c) Rechercher un contexte d'infection générale ou de maladie du système.
 - d) Considérer ce résultat comme une séquelle sérologique d'une syphilis ancienne
 - e) Toutes les réponses sont justes

12. Le port de chaussures qui agit normalement sur la peau :

- a) Une à deux chaussures qui ont un effet normal sur la peau
- b) Psoriasis
- c) Trauma d'emblée par voie orale
- d) Récalcitrante
- e) Ne nécessitant pas de mesures d'éviction

13. A propos des teignes tondantes trichophytiques :

- a) La lésion élémentaire est une plaque érosivo-croûteuse
- b) Les lésions sont nombreuses
- c) L'agent responsable est le *Microsporum canis*
- d) L'éviction scolaire est préconisée
- e) Les cheveux cassés réalisent un aspect en brosse

16. Les facteurs favorisant l'intertrigo inter-orteils sont :

- a) La grande fréquentation des piscines
- b) L'érysipèle
- c) La macération
- d) L'exposition solaire
- e) La transpiration

17. Les médicaments qui ont un effet comédolytique dans l'acné sont :

- a) Isotrétinoïne systémique
- b) Isotrétinoïne topique
- c) Acide azélaïque
- d) Gluconate de Zinc
- e) Clindamycine topique

18. La couche granuleuse épidermique est également appelée :

- a) Germinative ou compartiment de prolifération
- b) Épineuse ou compartiment de maturation
- c) Compartiment de différenciation préterminale
- d) Compartiment de différenciation terminale
- e) Compartiment de desquamation

19. Les formes modérées de psoriasis sont traitées en première ligne par :

- a) Acitretine
- b) Méthotrexate
- c) Biothérapie
- d) Calcipotriol
- e) Corticoïdes topiques

20. Parmi les traitements suivants, lesquels sont utilisés au cours de l'acné :

- a) Retinoïdes topiques
- b) Corticoïdes
- c) Ac fucidique
- d) B-lactamines systémiques
- e) acitrétine

12. Le port de chaussures qui vit normalement sur la peau
a) Cause à champignons
b) Pyostomatose
c) Trauma d'emblée par voie orale
d) Récalcitrante
e) Né nécessitant pas de mesures d'éviction

13. A propos des teignes tondantes trichophytiques :
a) La lésion élémentaire est une plaque érosivo-croûteuse
b) Les lésions sont nombreuses
c) L'agent responsable est le *Microsporum canis*
d) L'éviction scolaire est préconisée
e) Les cheveux cassés réalisent un aspect en brosse

16. Les facteurs favorisant l'intertrigo inter-orteils sont :
a) La grande fréquentation des piscines
b) L'érysipèle
c) La macération
d) L'exposition solaire
e) La transpiration

17. Les médicaments qui ont un effet comédolytique dans l'acné sont :
a) Isotrétinoïne systémique
b) Isotrétinoïne topique
c) Acide azélaïque
d) Gluconate de Zinc
e) Clindamycine topique

18. La couche granuleuse épidermique est également appelée :
a) Germinative ou compartiment de prolifération
b) Épineuse ou compartiment de maturation
c) Compartiment de différenciation préterminale
d) Compartiment de différenciation terminale
e) Compartiment de desquamation

19. Les formes modérées de psoriasis sont traitées en première ligne par :
a) Acitretine
b) Méthotrexate
c) Biothérapie
d) Calcipotriol
e) Corticoïdes topiques

20. Parmi les traitements suivants, lesquels sont utilisés au cours de l'acné :
a) Retinoïdes topiques
b) Corticoïdes
c) Ac fucidique
d) B-lactamines systémiques
e) acitrétine

Corrigé Type

N°	Rép.
1	AC
2	BCD
3	ACE
4	ABCE
5	D
6	B
7	ACE
8	ABCD
9	A
10	C
11	AC
12	A
13	AC
14	ADE
15	BD
16	ACE
17	ABC
18	C
19	DE
20	A
21	ACE
22	CDE
23	A
24	E
25	C
26	A
27	AB
28	A
29	E
30	BCD

Handwritten signature and date
 16/11/2014