

Contrôle d'ophtalmologie 1^{ère} rotation
Durée de l'épreuve 45 minutes
{Cet examen comprend 20 QCM}

1- Le III ou nerf moteur oculaire commun innerve les muscles?

- A- droit supérieur ;
- B- droit médial ;
- C- droit inférieur ;
- D- le petit oblique ;
- E- releveur de la paupière supérieure.

2- Le glaucome congénital associé?

- A- larmolement sale;
- B- photophobie; ✓
- C- buphtalmie; ✓
- D- PIO à 10 mmHg;
- E- PIO à 20 mmHg. ✓

3- Le traitement du glaucome congenital consiste en?

- A- une goniectomie ou ; ✓
- B- une trabéculotomie ou ; ✓
- C- une trabéculectomie ou ; ✓
- D- une phakoémulsification ou;
- E- une extraction de la cataracte.

4- Le traitement de l'œdème maculaire diabétique consiste en:

- A- l'équilibration stricte de tous les facteurs de risque;
- B- les injections intravitréennes d'anti VEGF;
- C- le laser focal;
- D- les injections intravitréennes d'antibiotiques;
- E- les collyres anti inflammatoires.

5- La règle des 421 définit?

- A- la rétinopathie diabétique proliférante sévère ;
- B- la rétinopathie diabétique non proliférante sévère;
- C- la rétinopathie diabétique proliférante modérée;
- D- la rétinopathie diabétique non proliférante minime;
- E- la rétinopathie diabétique non proliférante modérée.

Le stade III de l'HTA dans la classification de Kirkendall regroupe?

- A- Rétrécissement artériel diffus;
- B- Exsudats Cotonneux;
- C- Hémorragies;
- D- Edème papillaire;
- E- microanévrismes.

14- La presbytie est :

- A. Une baisse de l'acuité visuelle de près ;
- B. Une baisse de l'acuité visuelle de loin ;
- C. Mesurée par l'échelle de PARINAUD ;
- D. Mesurée par l'échelle de MONOYER ;
- E. Nécessite une distance de présentation de 5m.

15- La myopie simple est corrigée par :

- A. Des verres concaves ;
- B. Des verres convexes ;
- C. Des sphères ;
- D. Des cylindres ;
- E. Des verres progressifs.

16- Les effets secondaires oculaires des corticoides locaux et généraux sont :

- A. L'hypertonie ;
- B. La cataracte ;
- C. Une maculopathie irréversible gravissime ✗
- D. Des dépôts épithéliaux cornéens ; ✗
- E. Une mydriase. ✓

17- Les effets secondaires systémiques des collyres beta bloqueurs sont :

- A. Le ralentissement de la fréquence cardiaque ;
- B. Une tachycardie ;
- C. Un spasme coronarien ;
- D. Un bronchospasme ✗
- E. Arythmie

18- Les collures sympathomimétiques sont contre indiquées en cas de :

- A. Diabète ;
- B. Atteinte cardiaque ✓
- C. Hypotension artérielle ;
- D. Hypertension artérielle sévère ; ✓
- E. Artériosclérose avancée ✓

19- Qui sont œil rouge non douloureux parmi ces diagnostics

- A. Hémorragie sous conjonctivale ;
- B. Kératite ;
- C. Episclérite ;
- D. Conjonctivite virale ;
- E. Trachome.

20- La conjonctivite bactérienne est :

- A. Bilatérale ;
- B. Symétrique ;
- C. Larmolement ;
- D. Secrétions stériles ;
- E. Un prurit.

Département de Médecine - OPHTALMOLOGIE
F.Z

Date de l'épreuve : 16/11/2014

Corrigé Type

N°	Rép.
1	ABCDE
2	BCE
3	ABC
4	ABC
5	B
6	ABCD
7	ACE
8	BCD
9	E
10	ABC
11	CDE
12	BD
13	AC
14	AC
15	A
16	AB
17	ADE
18	BDE
19	ADE
20	ABC

Chor Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chal
Copy Service