

1. La maladie psychosomatique se traduit par toutes ces manifestations sauf :
  - a) Manifestations émotionnelles
  - b) Troubles fonctionnels
  - c) conduites suicidaires
  - d) Troubles lésionnels
  - e) Une personnalité psychosomatique
  
2. Un placebo :
  - a) agit sur des signes objectifs
  - b) Peut agir sur des paramètres mesurables
  - c) Est une substance pharmacologiquement active
  - d) Est une substance à usage systématique
  - e) Est utilisé essentiellement dans les essais cliniques
  
3. Parmi les bases théoriques de l'effet placebo
  - a) la suggestion
  - b) la recommandation
  - c) la démonstration
  - d) l'obligation
  - e) la soumission
  
4. La position schizo-paranoïde est une des théories psychanalytique de :
  - a) Freud
  - b) Bettelheim
  - c) Mélanie Klein
  - d) Winnicott
  - e) Spitz
  
5. Dans l'effet placebo
  - a) la personnalité du médecin joue un rôle
  - b) la personnalité du malade joue un rôle
  - c) la personnalité du médecin ne joue aucun rôle
  - d) le placebo est indépendant de la personnalité
  - e) la personnalité du malade ne joue aucun rôle
  
6. Ces différents moyens permettent de mieux évaluer la douleur sauf :
  - a) La détermination de la sensation de douleur
  - b) La détermination du type de douleur
  - c) La détermination de l'heure de la douleur
  - d) La détermination de l'importance de la douleur
  - e) La détermination de la localisation de la douleur
  
7. la maladie chez l'enfant n'entraîne pas :
  - a) des modifications dans la perception du corps
  - b) de l'angoisse en rapport avec l'idée que se font les parents et la famille de la maladie
  - c) une adaptation du système familial dans son ensemble à la maladie
  - d) des perturbations du développement chez l'enfant

e) de l'anxiété chez l'enfant proportionnelle à la gravité de la maladie

8. Toutes ces réponses sont justes sauf :

- a) La douleur est une expérience sensorielle
- b) Elle est désagréable
- c) Elle est associée à une lésion tissulaire réelle
- d) Elle est décrite en termes évoquant une telle lésion
- e) Elle est parfois agréable

9. Le placebo est une substance

- a) sans action pharmacodynamique
- b) avec une action psychodynamique
- c) avec une action pharmacodynamique
- d) active
- e) non active

10. Tous ces types de douleur sont justes sauf

- a) Douleur aiguë et chronique
- b) Douleurs par excès de nociception
- c) Douleur myogène
- d) Douleur psychogène
- e) Douleurs neurogènes

11. Toutes ses émotions sont vécues avec la douleur sauf

- a) Euphorie
- b) Attention
- c) Peur
- d) Anxiété
- e) Colère

12. Les réactions de la famille à la maladie de l'enfant :

- a) sont proportionnelles à la gravité de la maladie
- b) dépendent de l'investissement des parents envers l'enfant et des représentations de la maladie
- c) sont conscientes et individuelles à chaque parent
- d) sont toujours cachées à l'enfant
- e) participent toujours à la guérison de la maladie

13. Toutes ces affections sont d'origine psychosomatique sauf :

- a) l'asthme
- b) l'HTA
- c) l'ulcère gastrique
- d) la trisomie 21 d'origine psychologique
- e) l'eczéma

14. Tous ses traitements antidouleur sont justes sauf :

- a) Antalgiques non opioïde
- b) Neuroleptiques mais atypiques
- c) Antalgiques opioïdes faibles
- d) Antalgiques opioïdes forts



e) Antidépresseurs

15. La personnalité est le résultat de l'interaction dynamique d'aspect(s):

- a) Intellectuels.
- b) Affectifs
- c) Génétique
- d) Physiologiques
- e) Morphologiques

16. La personnalité selon Freud possède une structure qui évolue avec le temps.

Et il la définit en :

- a) Une composante
- b) Deux composantes
- c) trois composantes
- d) Quatre composantes
- e) Cinq composantes

17. La théorie expliquant le développement de l'intelligence est celle(s) de :

- a) Wallon
- b) Lacan
- c) Freud
- d) Piaget
- e) Pavlov

18. Quand on parle d'impuissance primaire :

- a) il n'y a jamais eu de rapports satisfaisants.
- b) C'est blocage dû à la religion, et non à la morale
- c) Un père trop abusif
- d) Il y a des phénomènes d'homosexualité plus ou moins assumée.
- e) C'est un blocage plus dû à la religion qu'à la morale

19. Le stade œdipien se situe entre

- a) 1 à 2 ans
- b) 6 à 8 mois
- c) 4 à 6 ans
- d) La puberté
- e) Juste avant la puberté

20. Les réactions de l'adolescent à la maladie sont influencées par :

- a) Les changements rapides au niveau de son corps
- b) L'apparition des caractères sexuels secondaires et maturation des organes génitaux
- c) L'image qu'il a de son propre corps
- d) Son niveau intellectuel
- e) La volonté d'indépendance envers la famille

21. La dysorgasmie est :

- a) un trouble du désir, mais pas du plaisir et de l'orgasme
- b) L'absence de désir peut être vis à vis de la sexualité.
- c) l'orgasme, auto-érotique, est absent
- d) il ne s'agira jamais de patientes hystériques.
- e) C'est un trouble du désir, du plaisir et de l'orgasme

22. La gériatrie est la discipline médicale

- a) Qui est plus définie par le fait de soigner des personnes âgées que par la façon dont on le fait
- b) Qui a pour objectif les pathologies du sujet âgés
- c) Elle étudie le vieillissement dans ses aspects bio psycho sociaux
- d) L'âgisme en est un bon contre-exemple
- e) La gérontophobie, en est une autre définition

23. Parmi les antidépresseurs dans les douleurs psychogènes on compte :

- a) Les antidépresseurs sérotoninergiques.
- b) Les antidépresseurs noradrénergiques.
- c) Les antidépresseurs mixtes.
- d) Les antidépresseurs anxiolytiques.
- e) Les antidépresseurs antis cholinergiques

24. Dans les maladies psychosomatiques :

- a) Les causes sont exclusivement ou partiellement psychologiques
- b) Les causes sont toujours psychologiques
- c) L'esprit n'est pas lié au corps
- d) Les émotions ne peuvent en aucun cas altérer l'immunité
- e) Le système immunitaire influence le psychisme

25. La maladie psychosomatique au niveau de l'appareil digestif s'exprime par tous ces signes émotionnels sauf :

- a) Anorexie
- b) Diarrhée fébrile d'origine psychologique
- c) Pertes de connaissance
- d) Nausées
- e) Diabète non insulino dépendant

26. La douleur psychogène

- a) a une origine somatique mais une étiologie psychologique
- b) elle provient d'un retentissement psychologique
- c) elle a une description très précise
- d) elle peut relever d'une conversion hystérique
- e) est une douleur facilement évaluable

27. L'évaluation de la douleur, se fait à travers l'appréhension de ces niveaux sauf :

- a) La détermination de la sensation et du type de douleur ressenti
- b) La détermination de l'importance de la douleur.
- c) La détermination de la localisation de la douleur.
- d) La détermination du ressenti de la douleur par la famille
- e) A travers la détermination de la qualité relation médecin malade

28. Le vieillissement correspond à :

- a) l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques
- b) à l'ensemble des processus psychiatriques
- c) L'ensemble des processus qui modifient les fonctions de l'organisme à partir de l'âge **111111**



- d) Elle n'est pas le résultat des effets intriqués de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux
- e) Il s'agit d'un processus qui peut être rapide et progressif à la fois

29. Concernant le ressenti personnel de la douleur :

- a) La douleur est ressentie en fonction de l'expérience personnelle.
- b) la douleur est subjective
- c) elle est perçue parfois de la même façon dans des cultures différentes
- d) elle est perçue différemment selon l'éducation, mais pas le sexe.
- e) elle dépend d'un certain nombre de paramètres économiques

30. Les douleurs par excès de nociception sont traitées par quelques types d'antidouleurs, sauf :

- a) Les antalgiques non opioïde de niveau 1
- b) Les antalgiques opioïdes faibles de niveau 2
- c) Les antalgiques opioïdes forts de niveau 3
- d) Les anesthésiques opioïde de niveau 5
- e) Les anesthésiques opioïdes faibles de niveau 4

31. La douleur a un rôle à différents niveaux sauf :

- a) Dans le dégagement d'une situation de danger
- b) Dans le maintien d'une situation traumatique
- c) Dans le maintien d'une convalescence forcée
- d) Dans l'apprentissage afin d'éviter une situation délétère
- e) Dans la dépression, ou elle est évité le ressenti

32. tous ces traitements sont fortement indiqués dans maladie psychosomatique sauf :

- a) cure psychanalytique classique.
- b) Thérapeutique brève
- c) cure de sommeil.
- d) relaxation.
- e) Thymorégulateurs

33. Selon la théorie psychanalytique, le principe de plaisir s'oppose au :

- a. principe de réalité
- b. principe de déplaisir
- c. pulsion libidinale
- d. au moi
- e. au surmoi

34. Le garçon entre 5-6 ans perçoit le père comme un rival qui accapare la mère et a à son attitude séductrice, selon Freud, il va éprouver l'angoisse de castration, cette étape est dite

- a. Le complexe du père.
- b. le complexe d'œdipe.
- c. L'anti-œdipe.
- d. Le stade phallique.
- e. La phase de latence.

35. Le dépassement de l'œdipe permet :

- a. D'instaurer des relations interpersonnelles saines à l'âge adulte.
- b. De s'adapter aux normes sociales en les internalisant.
- c. De maîtriser progressivement ses sphincters.
- d. De se développer intellectuellement.
- e. La fixation à un stade antérieur, plus gratifiant et vers lequel on régresse en cas de conflit.

36. Selon Bandura, l'apprentissage peut résulter :

- a. D'un conditionnement classique, Pavlovien.
- b. D'un conditionnement opérant, Skinnerien.
- c. D'un apprentissage par observation.
- d. D'un apprentissage par imitation d'un modèle perçu comme positivement renforçant.
- e. De la capacité de la personne à analyser, organiser et emmagasiner les informations.

37. Le caractère est déterminé par :

- a) L'apprentissage social
- b) L'apprentissage cognitif
- c) Les facteurs héréditaires
- d) Les facteurs héréditaires et environnementaux
- e) L'apprentissage opérant, décrit par Skinner.

38. le ou les mouvements psychologiques vécu(s) par le patient est ou sont :

- a. Inquiétude
- b. Indifférence
- c. Angoisse
- d. Satisfaction mais anxieuse
- e. Culpabilité

39. Le(s) mécanismes de défense est ou sont :

- a. La régression
- b. Prise de conscience
- c. L'acceptation
- d. Le dénigrement
- e. L'isolation

40. les défenses habituellement considérés comme les plus pathologiques sont :

- a. psychotiques et matures
- b. psychotiques et névrotiques
- c. matures et immatures
- d. psychotiques et immatures
- e. névrotiques et immatures



Faculté de médecine de Constantine département de médecine  
EHS de psychiatrie M.Belamri Constantine

examen de psychologie

du 27/11 au 15/12/2016

Corrige type

1. C
2. E
3. A
4. C
5. A-B
6. C
7. E
8. E
9. A.E
10. C
11. A
12. B
13. D
14. B
15. A.B.D.E
16. C
17. D
18. A
19. C
20. D --> **ABCE**
21. B.C.E --> **BE**

- B
23. A.B --> ABC
24. A
25. B.C.E
26. B.D
27. D.E
28. C --> AC
29. A.B
30. A.B.C --> DE
31. B.E
32. A.E
33. A
34. B
35. A.B
36. C.D
37. A.B.E
38. A.C.E
39. A.C.E
40. D
- 