

Cochez la ou les bonnes réponses.

Q.1. Concernant l'interaction pharmaceutique, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) juste(s) ?

- A. L'interaction se situe au niveau des récepteurs des médicaments ;
- B. L'interaction médicamenteuse est liée au devenir du médicament ;
- C. C'est une incompatibilité physico-chimique de 2 molécules par voie orale ;
- D. Le récepteur étant occupé, le neuromédiateur n'est plus libéré ;
- E. C'est une incompatibilité physico-chimique de 2 molécules par voie veineuse.

C

Q.2. Un patient porteur d'une valve mécanique reçoit des anti vitamines K (AVK) depuis 5 ans, suite à une mycose cutanée, il a pris en automédication un antifongique, Miconazole, quelle est la condition de prescription de ces 2 molécules ? C'est une :

- A. Association déconseillée ;
- B. Contre-indication ;
- C. Précaution d'emploi ;
- D. Interaction pharmaceutique ;
- E. Association à prendre en compte.

B

Q.3. Quel est le risque encouru chez ce patient ?

- A. Une rhabdomyolyse ;
- B. Une thrombose veineuse ;
- C. Une hyperkaliémie ;
- D. Un ulcère gastroduodéal ;
- E. Une hémorragie imprévisible.

E

Q.4. Quelle doit être votre conduite à tenir devant cette interaction médicamenteuse ?

- A. Ne pas traiter la mycose pour ne pas avoir d'interaction ;
- B. Il faudrait changer l'antifongique ;
- C. Maintenir le Miconazole et arrêter l'AVK pendant une semaine ;
- D. Maintenir le Miconazole et espacer la prise de l'AVK ;
- E. Maintenir le Miconazole avec un contrôle plus fréquent de l'INR.

B

Q.5. Patient âgé de 75 ans, suivi pour HTA sévère et traité par : IEC, Inhibiteur Calcique et diurétiques, se présente à votre consultation pour une poussée aigüe d'arthrose des genoux, vous prescrivez :

- A. Un antalgique associé à un AINS local : Paracétamol, Voltarène emulgel 1 % ;
- B. Un antalgique associé à un AINS : Paracétamol et kétofrofène ;
- C. Deux AINS associés : Kétoprofène et Diclofénac ;
- D. Un AINS à libération prolongée : Kétofrofène LP ;
- E. Bandage alcoolisé.

A

Q.6. Patiente âgée de 62 ans, consulte pour une douleur invalidante de l'épaule, vous diagnostiquez une tendinite de la coiffe des rotateurs, elle vous apprend qu'elle prend du Sintrom pour un problème de battements de cœurs irréguliers, vous prescrivez :

- A. Célecoxib ;
- B. Naproxène ;
- C. Aspirine ;
- D. Paracétamol ;
- E. Infiltration locale par corticoïdes.

D

Q.7. Au cours de la grossesse, les AINS sont contre indiqués, car il y a le risque :

- A. D'ulcère gastroduodéal ;
- B. Fermeture prématurée du canal artériel ;
- C. Insuffisance rénale fœtale ;
- D. D'hypertension artérielle ;
- E. D'agranulocytose.

B.C

Q.8. Parmi les effets secondaires des anti estrogènes, on retrouve :

- A. L'effet antagoniste sur la cellule cancéreuse ;
- B. L'effet estrogène-like ;
- C. L'effet tératogène ;
- D. L'effet inducteur de l'ovulation ;
- E. Ostéoporose.

C

Q.9. Qu'elle est l'hormonothérapie la plus adaptée en adjuvant pour une femme de 55 ans en activité génitale, présentant un carcinome du sein droit classé T2N0M0, RH+ ?

- A. Anti estrogène pur ;
- B. Antiaromatase stéroïdien ;
- C. Analogue de la LH-RH ;
- D. Anti estrogène type SERM ;
- E. Antiaromatase non stéroïdien.

D

Q.10. Quel(s) est (sont) le (s) facteur (s) favorisant l'iatrogénie lié (s) à la personne âgée ?

- A. Les troubles de la fonction rénale ;
- B. Les comorbidités ;
- C. Nomadisme médical ;
- D. Les interactions médicamenteuses ;
- E. La polymédication.

A.B

Q.11. Quels sont les effets métaboliques des corticoïdes ?

- A. Modification de la répartition des graisses ;
- B. Effet hypoprotidémique ;
- C. Augmentation de la masse musculaire ;
- D. Effet hypoglycémiant par la diminution de la synthèse hépatique ;
- E. Toutes les réponses sont justes.

A.B

Q.12. Quelles règles à suivre lors de la prescription médicamenteuse chez le patient âgé ?

- A. Évaluer et réévaluer régulièrement ;
- B. Arrêter le traitement si effets secondaires ;
- C. Établir un diagnostic ;
- D. Connaître les médicaments contre indiqués chez le sujet âgé ;
- E. Choisir le médicament ayant le meilleur rapport bénéfice/ risque.

E

Q.13. Un enfant correctement vacciné jusqu'au 03 mois, depuis la maman ne s'est pas présentée à la PMI jusqu'au 9^{ème} mois de la naissance. Selon le calendrier national de vaccination actuel (24 avril 2016) quelles sont les associations vaccinales préconisées ?

- A. DTC-Hib HVB + VPO + anti pneumococcique ;
- B. ROR ;
- C. BCG-VPO-HVB ;
- D. DTC + VPO ;
- E. ROUVAX.

A

Q.14. Le BCG (B.de Calmette et Guérin) est un vaccin :

- A. Bactérien vivant atténué ;
- B. Bactérien vivant tué ;
- C. Polysaccharide capsulaire ;
- D. Viral vivant atténué ;
- E. Viral vivant inactivé.

A

Q.15. Quelles sont les facteurs de risque d'une atteinte rénale liés au patient ?

- A. IRA fonctionnelle ;
- B. IRC ;
- C. Diabète ;
- D. Age < 40 ans ;
- E. Posologies élevées ou cumulées du médicament.

A.B.C.E

Q.16. Les Opiïdes :

- A. Se fixent sur la récepteurs μ pré- et post-synaptiques ;
- B. Entraînent une réduction de la transmission du message douloureux via les récepteurs opioïdes pré-synaptiques ;
- C. Entraînent une hyperpolarisation post-synaptique rendant la transmission de message douloureux plus difficile ;
- D. Indiqués dans le traitement de la douleur neuropathique ;
- E. Prescrit à partir d'une EVA >4.

A.B.C

Q.17. Le Tramadol :

- A. Est un antalgique et modulateur des contrôles inhibiteurs descendants ;
- B. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine ;
- C. Agit sur les récepteurs μ et delta ;
- D. Appartient au troisième palier de l'OMS ;
- E. Peut être associé à la morphine en cas de douleur intense.

A.B

Q.18. En cas de douleurs très aiguës et intenses :

- A. L'association de morphiniques est recommandée ;
- B. Les paliers 3 peuvent être utilisés en première intention ;
- C. Il est possible de faire la titration de la morphine par voie injectable SC voir IV ;
- D. Il faut éviter les voies transmuqueuse et nasale ;
- E. Il faut toujours tenir compte des rapports d'équianalgésie.

A.C.E 18 → BCE

Q.19. L'EMDR est recommandée par l'OMS comme thérapie de choix dans :

- A. Le trouble panique ;
- B. Le trouble obsessionnel ;
- C. L'état de stress post-traumatique ;
- D. Les schizophrénies ;
- E. Les démences.

C

Q.20. La psychothérapie institutionnelle :

- A. Met l'accent sur la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés ;
- B. Met l'accent sur la relation entre le malade et sa famille ;
- C. Ne s'intéresse qu'au malade ;
- D. Met l'accent sur la relation entre les malades ;
- E. S'intéresse au fonctionnement de l'institution.

A