

20
30

Contrôle d'ORL (2ème rotation) le 08/12/2013

Les juvéniles et le adolescent.

- Rx CT par association avec amygdales
- TRT = chirurgie après une embolisation.

1- Parmi les propositions suivantes concernant le fibrome nasopharyngien, lesquelles sont exactes ?

ABCD
?

- (a) Il s'agit d'une tumeur bénigne et rare *juvénile et adolescent*
- (b) L'endoscopie nasale met en évidence une formation tumorale antérieure *contu indiquis le visage de per. Goral*
- (c) Seul le scanner du massif facial permet de poser le diagnostic ✓
- (d) Il survient surtout chez l'adolescent en période pubère ✓ *(cde)*
- e- L'épistaxis est souvent de très grande abondance ✓

2- Concernant la conduite à tenir devant une épistaxis moyenne ou sévère, quelles sont les propositions exactes ?

b c d e

- a- Le méchage antéropostérieur est indiqué d'emblé *m'est par système*
- (b) Un tamponnement antérieur est réalisé après un méchage avec de la xylocaïne naphazoline *curant*
- (c) Il est indispensable de rechercher des signes de choc hypovolémique ✓
- d- La pose d'une voie veineuse est systématique X
- (e) L'angioembolisation de l'artère éthmoïdale antérieure est réalisée ✓
Après échec de la ligature de l'artère sphéno-palatine ✓ *SI*

3- Que retrouve t-on parmi les causes possibles de l'épistaxis ?

A B c d e

✓

- (a) L'insuffisance hépatique ✓
- (b) Les traitements anticoagulants ou antiagrégants ✓
- (c) L'hypertension artérielle ✓
- (d) La maladie de Willbrant ✓
- (e) La chirurgie nasosinusienne par voie endoscopique ✓

4- Le cancer du cavum

ABCD

- (a) Est un problème de santé publique au Maghreb ✓
- (b) Est de diagnostic facile ✓
- (c) Est connu depuis l'antiquité ✓
- (d) Est peu fréquent en Europe, au Japon et aux Etats-Unis d'Amérique ✓
- e- Est de diagnostic précoce *l'antid*

5- Quels sont les facteurs favorisants le cancer du cavum ?

- a- Le virus d'Epstein-Bar ✓
- b- L'association tabac-alcool
- c- La consommation de viânes et de poissons séchés ✓
- d- Les infections rhinopharyngées répétées ✓
- e- La carbonisation des aliments ✓

6- Quels sont les signes d'appel du cancer du cavum ?

- a- Obstruction nasale, épistaxis ✓
- b- Hypoacousie, épanchement dans l'oreille moyenne ✓
- c- Céphalées, névralgie du v, diplopie ✓
- d- Association de tous ces signes ✓
- e- Dysphonie et dysphagie

7- Parmi ces diagnostics, lesquels se manifestent par une surdité de perception endocochléaire ?

- a- La maladie de Ménière ✓
- b- L'otite moyenne aigue ST
- c- La presbyacousie ✓
- d- Le neurinome de l'acoustique *ne*
- e- La surdité brusque ✓

8- La Diphtérie :

- a- Donne une angine vésiculeuse
- b- Nécessite une hospitalisation d'urgence ✓
- c- Est souvent virale IB
- d- Est une maladie à déclaration obligatoire ✓
- e- A contamination interhumaine aérienne ✓

9- Parmi ces angines, lesquels sont virales :

- a- Angine érythémateuse ✓
- b- Angine érythémato-pultacée ✓
- c- Angine herpétique ✓
- d- Mononucléose infectieuse ✓

e- Angine pseudomembraneuse

? Bot V.

10- L'émission vocale fait intervenir les organes suivants :

ABCd

✓

- a- La langue ✓
- b- Le cavum ✓
- c- Le poumon ✓
- d- Le larynx ✓
- e- L'œsophage

App. des paroliers

11- Les examens complémentaires qui peuvent être demandés dans le cadre de l'exploration d'une dysphonie sont :

ABde

✓

- a- IRM cérébrale ✓
- b- TDM thoracique ✓
- c- La laryngoscopie indirecte ✓
- d- EMG des cordes vocales ✓
- e- La stroboscopie ✓

laryngoscopie

12- La dysphonie chronique chez l'adulte peut être en rapport avec :

bde

✓

- a- Une laryngite aigue
- b- Un cancer du larynx ✓
- c- Une aphonie psychogène aigue ?
- d- Une laryngite dysplasique ✓
- e- Une tuberculose laryngée ✓

d'origine psychogène

13- Un neurinome de l'acoustique se manifeste par :

ABC

✓

- a- Un vertige, acouphène unilatérale, surdité du même coté ?
- b- Un vertige, acouphène unilatérale, surdité controlatérale
- c- Une surdité rétro cochléaire aux potentiels évoqués auditifs ✓
- d- Une surdité rétro cochléaire en audiométrie tonale
- e- Un nystagmus multidirectionnel unidirectionnel

EST
ASP

14- La maladie de Ménière :

AE

- a- Est une pathologie héréditaire ✓
- b- L'évolution se fait vers un vertige invalidant ?

c- L'otoscopie montre une perforation laissant sourdre du LCR de faible abondance ✗

d- Se traduit par une hypertension artérielle

e- Le Tangail est un traitement de la crise vertigineuse ✓

15- L'otite moyenne aiguë :

a- Est une infection à point de départ otitique (pharyngé).

b- L'hypertrophie adénoïdienne est un facteur favorisant \rightarrow *réservoir des germes*

c- Une trompe d'Eustache béante favorise cette infection ✓

d- Le traitement est toujours médico-chirurgical

e- Survient surtout chez l'adulte jeune

16- Dans l'otite externe :

a- La TDM de l'oreille est l'examen clé du diagnostic

b- Le diagnostic positif est clinique ✓

c- L'hospitalisation s'impose chez l'enfant

d- L'extension osseuse est fréquente chez le diabétique ✓

e- Le port d'une prothèse auditive peut être la cause ✓

17- L'otomycose :

a- Se traduit par un feutrage noirâtre ✓

b- Se traduit par des lésions crouteuses \Rightarrow OMCC ✓

c- Se traduit par la présence d'un furoncle percé

d- Le traitement antimycosique se fait par voie locale ✓

e- Le traitement antimycosique se fait par voie générale

18- Le vertige :

a- Est une pathologie fréquente ✓

b- Est bref dans la névrite vestibulaire

c- Dure quelques minutes dans la maladie de Ménière ✓

d- Peut évoquer une sclérose en plaque ✓

e- Peut évoquer une épilepsie chez l'enfant ✓

19- La labyrinthite :

la labyrinthite

- a- Se manifeste par un vertige, nystagmus et hyperpression endolymphatique *mbr*
- b- Conséquence d'une toxicité par la streptomycine ✓
- c- Conséquence d'une toxicité par les barbituriques *central*
- d- Complique souvent une otite moyenne chronique cholestéatomateuse
- e- Complique souvent otite externe chez le diabétique

20- Chez le nouveau né l'obstruction nasale est essentiellement due à :

- a- Une imperforation choanale unilatérale
- b- Une rhinite vasomotrice
- c- Une cause tumorale
- d- Une imperforation choanale bilatérale
- e- Une rhinite inflammatoire *mais non*

21- Dans un contexte traumatique, l'obstruction nasale entraîne par :

- a- Un abcès de la cloison nasale
- b- Une déviation de la cloison nasale avec épistaxis ✓
- c- Une sinusite aigue
- d- Une polyposie nasosinusienne
- e- Un hématome de la cloison nasale

22- L'otite moyenne chronique cholestéatomateuse :

- a- se traduit par une migration de l'épiderme dans la caisse du tympan *peut*
- b- l'otoscopie montre une perforation subtotale du tympan (*total*)
- c- l'otoscopie montre une perforation de la pars-tensa marginale ✓
- d- l'otoscopie montre une perforation de la pars flacida ✓
- e- l'otoscopie montre une perforation polycyclique du cadran postéro-inferieur *OMA*

23- la nasofibroscopie permet de :

- a- visualiser le méat moyen ✓
- b- le cornet moyen
- c- le larynx
- d- la muqueuse du sinus maxillaire

e- le rinopharynx

24- le test de weber consiste à :

- * A ✓
- a- mettre le diapason sur le front pour rechercher le coté de la surdité ✓
 - b- mettre le diapason sur la mastoïde pour tester la conduction osseuse ✓
 - c- mettre le diapason devant le pavillon de l'oreille pour tester la conduction aérienne ✗
 - d- mettre le diapason sur le front pour tester la conduction aérienne
 - e- mettre le diapason sur les deux mastoïdes pour tester le coté le plus sourd

25- la rhinoscopie antérieure permet de :

- Ad ✓
- a- diagnostiquer une déviation de la cloison nasale ✓
 - b- diagnostiquer un cancer du cavum (post) (il faut un endoscope post)
 - c- diagnostiquer une atrésie choanale (par le bord souple)
 - d- visualiser du pus au niveau du méat moyen lors de la sinusite maxillaire ✓
 - e- voir les orifices de la trompe d'Eustache (post) (ce sont les orifices)

26- un patient âgé de 65 ans, fumeur, consulte pour une dysphonie et chez qui en effectue une laryngoscopie indirecte, que peut-on voir :

- wyng LSS
- base de la larynx
- stropharynx
- ventricule
- mobilité
- Abe
- a- une masse bourgeonnante glottique ✓
 - b- une paralysie des deux cordes vocales paralyse bilatérale de CV de la base de la larynx
 - c- une sténose serrée sous-glottique
 - d- un processus de la bouche œsophagienne (dysphagie)
 - e- un processus de l'hémi larynx droit (to dy & pharynx)

27- la laryngoscopie indirecte :

- Acc ✓
- a- est l'examen clinique qui permet de voir la base de langue -
 - b- est le premier examen complémentaire à demander lors d'une dysphonie (clinique)
 - c- permet de poser le diagnostic d'une diplégie laryngée (mobilité de la base de la larynx)
 - d- permet de réaliser une biopsie laryngée
 - e- permet de voir l'hypopharynx (si... de pharynx) = larynx pharynx

28- une perforation de la membrane de shrapnell :

- a- ne peut être vu que sous microscope
- b- est objectivé par une simple otoscopie ✗
- c- est mieux vu sous microscope ✓
- d- évoque une otite moyenne chronique cholestéatomateuse ✓
- e- évoque une otite moyenne chronique simple ✓

29- Une jeune patiente âgée de 30 ans présentant un goitre multi nodulaire, opérée (thyroïdectomie totale) et qui présente une dyspnée laryngée dans les heures qui suivent, un hématome post opératoire est écarté :

- a- Une paralysie récurrentielle unilatérale est la cause
- b- Une paralysie récurrentielle bilatérale peut être la cause ✓
- c- Une laryngoscopie indirecte permet de poser le diagnostic → ?
- d- Une laryngoscopie directe s'impose → ?
- e- Un cancer du larynx est évoqué (pas de l'ontex b) ✓

30- Lors d'une otite externe :

- a- Le conduit auditif externe peut être complètement sténosé ✓
- b- Le conduit auditif externe peut être partiellement sténosé ✓
- c- Le tympan peut se perforer
- d- Une perforation pinctiforme peut se voir
- e- Otorrhée purulente est la règle