

## V. Clinique :

Faculté de médecine de Constantine

Année 2021/2022

Épreuve d'ORL

3ème rotation

1- Le kyste du tractus thyroïdienne se caractérise par :

- a) Son siège : cervical médian, ad ou sous hyoïdien.
- b) Son ascension à la protrusion de la langue.
- c) Sa sensibilité à la palpation.
- d) Sa fréquence élevée chez l'adulte.
- e) Son origine congénitale.

2- Chez un sujet jeune de 30 ans, en bon état général présentant une adénopathie cervicale latérale chronique isolée, avec examen ORL normal, il faut systématiquement pratiquer dans le cadre d'un bilan de base :

- a) Numération formule sanguine
- b) Téléthorax
- c) Radiographie cervicale
- d) TDM cervicale
- e) IDR à la tuberculine

3- Parmi les propositions suivantes concernant le diagnostic de l'otite cholestéatomateuse, lesquelles sont vraies ? :

- a) l'otite chronique cholestéatomateuse est une otite chronique potentiellement dangereuse
- b) elle est caractérisée par la présence d'une matrice épidermique au sein de l'oreille moyenne
- c) la matrice cholestéatomateuse a un pouvoir ostéolytique source de complications
- d) elle est exceptionnelle chez l'enfant
- e) elle peut être asymptomatique

4- Dans le cancer du cavum, à propos de l'anatomopathologie :

- a) la classification est basée sur le degré de différenciation
- b) le type histologique est corrélé à l'incidence
- c) 5 types histologiques sont décrits.
- d) la kératinisation est toujours absente
- e) les carcinomes épidermoïdes sont les seuls types histologiques retrouvés

5- La radiothérapie externe dans le cancer du cavum :

- a) est la seule thérapeutique indiquée
- b) a connu des progrès technologiques permettant de limiter les effets secondaires
- c) est associée à la chimiothérapie dans le même temps pour une meilleure efficacité
- d) peut être associée à une curiethérapie
- e) garantit l'absence de récurrence

6- Tous ces pièges anatomiques, sont des diagnostics différentiels d'une masse cervicale, sauf un lequel ?

- a) L'apophyse transverse de C1 saillante ✓
- b) La grande corne de l'os hyoïde saillante. ✓
- c) L'apophyse transverse de C7 saillante. ✓
- d) L'apophyse transverse de C2 saillante.
- e) Tubercule de Chassaignac saillant. ✓

7- L'angine mononucléose se manifeste par :

- a) des fausses membranes empiétant sur la luette
- b) une discrète splénohépatomégalie
- c) des pétéchies du voile du palais
- d) une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile
- e) une sérologie de Wright positive

8- Le diagnostic positif d'une otite moyenne aigue repose sur :

- a) l'examen otoscopique
- b) la TDM du rocher
- c) l'impédancemétrie
- d) la radiographie en incidence de Schuller
- e) le prélèvement bactériologique des otorrhées

9- Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui constituent un moyen thérapeutique au cours d'une épistaxis :

- a) Ligature de la carotide interne
- b) L'application de l'eau oxygénée
- c) L'application du nitrate d'argent
- d) La cautérisation électrique
- e) L'embolisation veineuse

10- Dans le cancer du cavum, le dépistage :

- a) est systématique
- b) s'adresse aux sujets à risque
- c) fait partie du programme de santé de tous les pays
- d) utilise la nasofibroskopie
- e) utilise la sérologie EBV ou mieux la PCR-EBV

11- Le cancer du cavum :

- a) est un cancer de la vie moderne
- b) se voit uniquement chez l'adulte
- c) est fortement corrélé à un alcoolisme marqué
- d) est diagnostiqué tardivement.
- e) est traité chirurgicalement quelque soit le stade

12- Parmi les affections suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être responsables d'une épistaxis

- a) L'hypertension artérielle,
- b) Les tumeurs malignes des sinus
- c) La leucémie aiguë
- d) L'hypertrophie adénoïdienne
- e) Le fibrome nasopharyngien

13- Quel est(sont) le(s) signe(s) clinique(s) retrouvé(s) au cours d'une sinusite éthmoïdale aigue dans sa phase non extériorisée :

- a) céphalée fronto-orbitaire
- b) œdème palpébral  $\times$
- c) exophtalmie  $\times$
- d) chémosis  $\times$
- e) ophtalmoplégie  $\times$

14- La sinusite maxillaire aigue :

- a) se voit chez l'enfant de moins de 5 ans
- b) l'endoscopie retrouve du pus au méat supérieur  $\times$
- c) l'endoscopie retrouve un œdème du méat moyen
- d) peut être d'origine fongique
- e) peut être secondaire à un abcès de la 2ème molaire supérieure

15- La ponction du sinus maxillaire est indiquée devant :

- a) une sinusite hyperalgique
- b) un échec du traitement médical
- c) une sinusite d'origine dentaire
- d) une sinusite postopératoire
- e) un épaississement en cadre au scanner

16. Un patient âgé de 50 ans, qui consulte pour une symptomatologie faite de la triade suivante : Acouphène, Vertige rotatoire qui dure 2 heures, surdité au moment de la crise, quel est le diagnostic le plus probable :

- a) Vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB)
- b) Maladie de Ménière
- c) Névrite vestibulaire
- d) Neurinome de l'acoustique
- e) Accident vasculaire cérébelleux

17. L'imperforation choanale néo-natale : *Ni ne*

- a) Est une obstruction de la partie antérieure des fosses nasales.
- b) N'est jamais bilatérale.
- c) Peut occasionner une détresse respiratoire néo-natale.
- d) Doit être systématiquement recherchée lors du premier examen du nouveau-né.
- e) Elle s'aggrave lors des pleurs.

18- L'hypertrophie des végétations adénoïdes :

- a) Est une étiologie rare d'obstruction nasale chez l'enfant.  $\times$
- b) Peut se manifester par une dyspnée nocturne.
- c) Son diagnostic repose sur la rhinoscopie antérieure.
- d) Peut occasionner des complications broncho-pulmonaires. *OM, + la, la*
- e) Son traitement est l'adénoïdectomie.

19. Les corps étrangers des VAS :

- a) peuvent se manifester par une simple toux  $\times$
- b) une auscultation libre à l'examen clinique
- c) une dysphonie si le CE est trachéal
- d) un emphysème à la radiographie du thorax
- e) la TDM thoracique est systématique pour le diagnostic.

20. Le diagnostic différentiel d'une sinusite frontale aigue non compliquée est :

- a) un kyste de la glabelle surinfecté
- b) une névralgie du V3
- c) une staphylococcie maligne de la face
- d) un glaucome à angle fermé
- e) un cancer du cavum

21. A l'examen otoscopique :

- a) La membrane tympanique se situe au fond de la caisse du tympan
- b) C'est une membrane blanchâtre transparente
- c) Le triangle lumineux se situe dans le quadrant postéro-inférieur
- d) La pars tensa représente la partie supérieure de la membrane tympanique
- e) L'ombilic fait partie de ces reliefs *a reliefs P*

22. La surdité de perception :

- a) le Weber est latéralisé vers le côté sain
- b) le Rinne est latéralisé vers le côté sain
- c) la conduction osseuse est supérieure à la conduction aérienne  $\times$
- d) se rencontre dans les atteintes cochléaires
- e) se rencontre dans les atteintes du VIII  $\frac{9}{3}$

23. L'épreuve du Rinne :

- a) est une acoumétrie vocale  $\times$
- b) elle compare la conduction aérienne et la conduction conchale
- c) le diapason vibrant est placé sur le vertex  $\times$
- d) le bouchon de cérumen contre indique la réalisation de l'épreuve.
- e) elle doit être réalisée dans un lieu calme

24. Quels sont les examens qui explorent l'audition :

- a) L'acoumétrie vocale
- b) L'acoumétrie instrumentale
- c) L'otoscopie  $\times$
- d) L'audiométrie
- e) Les potentiels évoqués auditifs

25. La rhinoscopie postérieure au miroir explore :

- a) la base de langue
- b) les choanes
- c) le cavum
- d) le larynx
- e) les 2/3 antérieures des fosses nasales  $\times$

atteinte hépatique  
sion et com-

xic

ase,

ur

me

ju

it

ia

te

26. L'examen de la fonction vestibulo-spinale au cours des vertiges se fait :

- a) A l'épreuve de Romberg
- b) L'épreuve du piétinement aveugle
- c) A la manœuvre de Dix et Hallpike
- d) A l'épreuve de Babinski Weil
- e) A la manœuvre de la torsion du tronc

2/3

27. La rhinoscopie antérieure permet de visualiser :

- a) Le 2/3 antérieurs de la cloison nasale
- b) Les choanes
- c) Le sinus maxillaire
- d) Le sinus éthmoïdal
- e) Le corné inférieur

1

28. Dans le syndrome vestibulaire périphérique :

- a) le nystagmus est horizonto-rotatoire
- b) le nystagmus disparaît à la suppression de la fixation
- c) apparaît à la fermeture des yeux
- d) reste inchangé à la fermeture des yeux
- e) les signes neurovégétatifs sont fréquents

2/3

29. Le nystagmus :

- a) Est un mouvement conjugué rythmé involontaire de la tête
- b) son sens est celui de la secousse rapide
- c) son sens est celui de la secousse lente
- d) sa direction peut être verticale dans le syndrome vestibulaire périphérique
- e) il disparaît à la fixation dans le syndrome vestibulaire central

0

30. quel(s) est (sont) le(s) moyen(s) qui fait (font) partie de l'exploration du larynx :

- a) La laryngoscopie directe en suspension
- b) La TDM
- c) La scintigraphie au Tc99
- d) le test de Hilger
- e) la cytoponction

1/2

Bon courage

# Département de Médecine de Constantine-Epreuve d'ORL-A6-R3-(théorie+pratique) le 28-02-2022

Date de l'épreuve : 27/02/2022

Corrigé Type

Barème par question : 0,666667

N°	Rép./Alternatives 1&2	
1	ABE	
2	ABE	
3	ABCE	
4	AB	
5	BCD	
6	D	
7	BC	
8	A	
9	CD	
10	BDE	
11	D	
12	ABCE	
13	A	
14	CD	
15	ABD	
16	B	
17	CD	
18	BDE	
19	ABD	
20	D	
21	E	
22	ADE	
23	E	
24	ABDE	
25	BC	
26	ABD	AB
27	AE	
28	ACE	
29	B	
30	AB	

Dr. Wassime MEDIC  
Spécialiste O.R.