

Université Constantine 3

Faculté de Médecine Pr Belkacem Bensmail
Contrôle Thérapeutique 6^{ème} Année (2^{ème} Rotation)
Le 20 Mars 2014 à 10 heures

Cochez la ou les bonnes réponses.

Q.1. La classification actuelle des médicaments de la douleur est:

- A. Les antalgiques non morphiniques
- B. Les antalgiques morphiniques
- C. Les non antalgiques
- D. Les opioïdes faibles
- E. Les opioïdes forts.

A B C

Q.2. 90 mg de Morphine équivaut :

- A. 100 gamma/ h
- B. 75 gamma/ h
- C. 50 gamma/ h
- D. 25 gamma/ h
- E. 10 gamma/ h.

D

Q.3. Le Durogésic (le Fentanyl en patch) existe sous forme de :

- A. 400 gamma/ h
- B. 200 gamma/ h
- C. 100 gamma/ h
- D. 50 gamma/ h
- E. 25 gamma/ h.

C D E

Q.4. Le choix de prescription d'un antalgique est régit par trois règles, lesquelles ?

- A. Le bon antalgique
- B. Le bon moment
- C. Le bon dosage
- D. Le bon prix
- E. La bonne diffusion.

A B C

Q.5.60 mg de morphine équivaut :

- A. 1.2 mg de Temgésic
- B. 0.8 mg de Temgésic
- C. 0.6 mg de Temgésic
- D. 0.3 mg de Temgésic
- E. 0.2 mg de Temgésic.

A

Q.6. Quels sont les mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'altération du métabolisme cérébral chez le sujet âgé ?

- A. Dégénérescence primitive du tissu cérébral
- B. Hypoperfusion due à l'artériosclérose diffuse
- C. Maladie d'Alzheimer
- D. Ischémie cérébrale due à un accident vasculaire cérébral
- E. Toutes les réponses sont justes.

A B

Q.7. Chez le sujet âgé, les diurétiques :

- A. Forment une classe thérapeutique homogène
- B. Peuvent tous être prescrits en cas d'insuffisance rénale
- C. Peuvent entraîner une déshydratation
- D. Peuvent entraîner une hyperkaliémie
- E. Peuvent entraîner une hypokaliémie.

C E

Q.8. Citez les 5 classes médicamenteuses à visée cardiovasculaire et métabolique dont la prescription impose une surveillance particulière chez le sujet âgé :

- A. Diurétiques
- B. Antidiabétiques oraux
- C. Neuroleptiques
- D. Antibiotiques
- E. Antihistaminiques.

A B C

Q.9. Le déclin de la fonction digestive:

- A. Est due à la fibrose intestinale
- B. Est à l'origine d'une malabsorption de certains médicaments
- C. Peut altérer l'efficacité de certains médicaments
- D. Entraîne des troubles ioniques
- E. Se traduit par une achlorhydrie.

C E

Q.10. Quels sont les facteurs favorisant l'intoxication digitalique chez le sujet âgé ?

- A. Insuffisance hépatique
- B. Interactions médicamenteuses
- C. Hypokaliémie
- D. Hyponatrémie
- E. Insuffisance rénale

A B C E

Q.11. La chimiothérapie a un effet antiprolifératif sur:

- A. La moelle osseuse
- B. Le tube digestif
- C. Les gonades
- D. La Peau
- E. Les phanères.

A B C D E

Q.12. Parmi les complications suivantes, la (les) quelle (s) impose (ent) l'arrêt immédiat d'une chimiothérapie anticancéreuse :

- A. Les complications cardiaques
- B. Les complications infectieuses
- C. Les complications neurologiques
- D. Les complications pulmonaires
- E. Les complications hématologiques.

A C D

Q.13. Parmi les complications suivantes la (les) quelle (s) nécessite (ent) l'hospitalisation du patient:

- A. Les vomissements
- B. La neutropénie fébrile
- C. L'extravasation du produit
- D. Un taux de plaquettes $< 30.000/mm^3$
- E. Une alopecie.

B D

Q.14. Les psychotropes sont des substances pharmacologiques qui agissent :

- A. Sur le comportement, l'anxiété, l'affectivité
- B. Sur l'affectivité, la cognition, la personnalité
- C. Le comportement, l'affectivité et la cognition
- D. La personnalité, la cognition et les relations sociales
- E. Sur la qualité ou la quantité de certains neurotransmetteurs.

A E

Q.15. Les dyskinésies sont représentées par:

- A. Des crises oculogyres
- B. Un Plafonnement du regard

- C. Un fourmillement des extrémités
- D. Des crises de panique
- E. Une confusion mentale.

A B

Q.16. Lesquels de ces signes ne font pas partie des signes cliniques du syndrome malin des neuroleptiques :

- A. Troubles de la conscience
- B. Des troubles cutanés
- C. Une polypnée
- D. Hyperthermie
- E. Une hyperactivité

A E

Q.17. Les tranquillisants ou anxiolytiques n'ont pas de propriétés :

- A. Anti convulsivantes
- B. Incisives
- C. Myorelaxantes
- D. Amnésiantes
- E. Anti cholinergiques.

B E

Q.18. Parmi ces médicaments, lesquels sont des neuroleptiques ?

- A. Haloperidol
- B. Zuclopenthixol
- C. Paroxetine
- D. Sertraline
- E. Fluoxetine.

A B

Q.19. Dans l'épanchement péricardique le diagnostic peut être évoqué :

- A. Sur échocardiographie ou radiographie pulmonaire
- B. Devant un tableau clinique d'une insuffisance cardiaque gauche
- C. Devant un tableau clinique d'une insuffisance cardiaque droite
- D. Devant une récurrence locorégionale
- E. Devant une réaction inflammatoire en rapport avec une nécrose localisée.

A C

Q.20. Les signes cliniques d'une hypercalcémie sont :

- A. Une léthargie associée à une faiblesse musculaire
- B. Une polyurie et une déshydratation intracellulaire
- C. D'une insuffisance cardiaque associée à une déshydratation
- D. Une constipation, des nausées et vomissements
- E. Une constipation associée à une insuffisance cardiaque.

A D

Q.21 On trouve dans le syndrome de lyse tumorale :

- A. des produits extracellulaires à la suite de la mort cellulaire
- B. une hyperkaliémie, une hyperphosphatémie et hypocalcémie
- C. une hyperkaliémie, une hypophosphatémie et hypercalcémie
- D. se voit dans les cancers ayant une croissance tumorale moyenne
- E. nécessite une hyperhydratation associé un inhibiteur de la formation d'acide urique.

B

Q.22. Dans le carcinome différencié de la thyroïde, après thyroïdectomie, l'hormonothérapie suppressive est administrée pour obtenir un taux sanguin de TSH.

- A. Compris entre 0.3 et 2 mu/l
- B. Compris entre 0.1 et 0.5 mu/l
- C. Compris entre 0.5 et 2 mu/l
- D. Inférieur à 0.1 mu/l
- E. Supérieur à 2 mu/l

B D

Q.23. Une femme âgée de 27 ans, présente un carcinome canalaire infiltrant localisé du sein droit, récepteurs hormonaux positifs (RH⁺), traitée par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Quelle (s) hormonothérapie(s) doit prescrire?

- A. Antiestrogènes type Nolvadex
- B. Antiestrogènes type Fulvestrant
- C. Antiaromatase
- D. Analogue de la LH-RH
- E. Analogue de la LH-RH ET Antiestrogènes.

A

Q.24. Femme âgée de 78 ans, présentant un carcinome mammaire localement avancé, récepteurs hormonaux positifs (RH⁺) et des antécédents qui contre-indiquent la chimiothérapie. L'hormonothérapie est prescrite en :

- A. Adjuvant
- B. Post adjuvant
- C. Neoadjuvant
- D. Concomitant
- E. Sandwich.

C

Q.25. Un homme âgé de 65 ans, présentant un adénocarcinome de la prostate de bas risque. Quelle ordonnance ?

- A. Zoladex injectable à 3.6 mg
- B. Décapeptyl injectable à 3-7.5 mg
- C. Zoladex avec Nolvadex
- D. Décapeptyl avec Casodex
- E. Aucune hormonothérapie.

E



Université de Constantine 3

Faculté de Médecine Pr B. Bensmail

**Département de Médecine de Constantine - Epreuve de
Thérapeutique - A6 - R1 - RE:07/04/14 *Z.F***

Page 1/1

Date de l'épreuve : 20/03/2014

Corrigé Type

Barème uniforme : 0.8 point(s) par question

N°	Rép.
1	ABC
2	D
3	CDE
4	ABC
5	A
6	AB
7	CE
8	AB
9	CE
10	ABCE
11	ABCDE
12	ACD
13	BD
14	AE
15	AB
16	BE
17	BE
18	AB
19	AC
20	AD
21	B
22	BD
23	A
24	C
25	E

Dr A. FERDI KHelifa
Oncologie Thérapeutique