

Q.17. Une association déconseillée est une condition de prescription : Comment la définir ?

- A. Elle revêt un caractère absolu, elle ne doit pas être transgressée ;
- B. Elle doit être le plus souvent évitée ;
- C. Elle nécessite une surveillance étroite du patient ;
- D. Elle correspond à une addition des effets indésirables ;
- E. Elle n'impose aucune recommandation.

B,C

Q.18. Les cytochromes P450 sont des enzymes, Quel (s) est (sont) leur (s) caractéristique (s) ?

- A. Peu de médicaments sont métabolisés par les cytochromes ;
- B. Le CYP3A4 est le plus important quantitativement ;
- C. L'alcool diminue l'action des cytochromes ;
- D. Ils sont essentiellement hépatiques ;
- E. Au moment de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, ils doivent être identifiés.

B,D,E

Q.19. Le syndrome de lyse tumorale est caractérisé par :

- A. Des produits extracellulaires à la suite de la mort cellulaire;
- B. Une hyperkaliémie, une hypophosphatémie et une hypercalcémie;
- C. Une croissance tumorale moyenne;
- D. Une hyperkaliémie, une hyperphosphatémie et une hypocalcémie;
- E. Une diminution d'acide urique.

D

Q.20. Dans le carcinome différencié de la thyroïde, après thyroïdectomie, l'hormonothérapie suppressive est administrée pour obtenir un taux sanguin de TSH.

- A. Compris entre 0.3 et 2 mU/l
- B. Compris entre 0.1 et 0.5 mU/l
- C. Compris entre 0.5 et 2 mU/l
- D. Inférieur à 0.1 mU/l
- E. Supérieur à 2 mU/l

B,D